

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar hasil dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Ada hubungan Antara preeklamsia pada ibu bersalin dengan BBLR di RSUD Wonosari
2. Sebagian besar ibu bersalin dengan preeklamsia di RSUD Wonosari memiliki usia tidak berisiko, Paritas berisiko, dan tidak mempunyai riwayat penyakit hipertensi.
3. Ibu bersalin dengan preeklamsia lebih banyak melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu bersalin tidak dengan preeklamsia
4. Ibu bersalin dengan preeklamsia berpeluang 27,368 kali mengalami BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami preeklamsia.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasar hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bidan Pelaksana di RSUD Wonosari

Bidan diharapkan dapat membuat sarana edukasi bisa berupa leaflet atau poster mengenai tanda, gejala, serta dampak preeklamsia. Melakukan pemantauan lebih ketat terhadap ibu bersalin preeklamsia dengan memberikan asuhan yang tepat sehingga mengurangi angka mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi.

2. Bagi RSUD Wonosari

Diharapkan peningkatan sarana prasaran dan mutu SDM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada ibu bersalin bersalin preeklamsia dan BBLR

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumber informasi. Serta diharapkan dapat mengidentifikasi faktor risiko lain yang disebabkan oleh preeklamsia atau faktor risiko lain yang menyebabkan BBLR