

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Karakteristik balita usia 24-59 bulan yang mengalami *stunting* di Puskesmas Gondokusuman II Kota Yogyakarta tahun 2021 sebagian besar tidak mengalami riwayat BBLR.
2. Karakteristik balita usia 24-59 bulan yang mengalami *stunting* di Puskesmas Gondokusuman II Kota Yogyakarta tahun 2021 sebagian besar tidak ASI eksklusif.
3. Karakteristik balita usia 24-59 bulan yang mengalami *stunting* di Puskesmas Gondokusuman II Kota Yogyakarta tahun 2021 sebagian besar memiliki tinggi badan ≥ 150 cm.
4. Karakteristik balita usia 24-59 bulan yang mengalami *stunting* di Puskesmas Gondokusuman II Kota Yogyakarta tahun 2021 sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah (SD/SMP).
5. Karakteristik balita usia 24-59 bulan yang mengalami *stunting* di Puskesmas Gondokusuman II Kota Yogyakarta tahun 2021 sebagian besar memiliki status ekonomi rendah (<Rp 2.153.970,00).

B. Saran

1. Bagi Bidan Puskesmas Gondokusuman II

Saran untuk bidan puskesmas yaitu diharapkan lebih aktif dan melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat, terutama kepada ibu balita untuk memberikan informasi. Bidan dapat merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan program-program, memantau serta menilai program yang dilaksanakan di puskesmas, melakukan pelatihan terhadap kader-kader untuk kegiatan gizi di desa, melakukan penyuluhan kepada ibu balita guna pencegahan *stunting* dan perbaikan status gizi balita. Dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan kemudian dilakukan evaluasi untuk penurunan angka *stunting*.

2. Bagi Kepala Puskesmas Gondokusuman II

Saran untuk kepala puskesmas yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi sehingga dapat menentukan program-program puskesmas dalam mensukseskan program penurunan *stunting* dan melakukan evaluasi program pada tahun sebelumnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau meneliti faktor lain, seperti menggunakan data balita yang mengalami *stunting* dan tidak mengalami *stunting*, dalam penelitian ini bersifat menyempurnakan penelitian ini.