

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN  
ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ambar Wahyuningrum, Joko Susilo, Dwiana Estiwidani

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Jl Mangkuyudan MJ III, Yogyakarta

**ABSTRAK**

Latar Belakang: Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu masalah kesehatan nasional. Akibat yang dapat terjadi karena anemia adalah perdarahan serta risiko berat badan lahir rendah. Keadaan ini dapat meningkatkan morbiditas maupun mortalitas bagi ibu dan anak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil adalah pengetahuan tentang anemia, LILA , umur ibu dan paritas. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III

Metode: Penelitian ini menggunakan *survey analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tembarak Kabupaten Temanggung Populasi penelitian ini adalah Semua ibu hamil trimester III dengan menggunakan teknik *total sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 107 responden. Analisa data menggunakan menggunakan uji *chi square*.

Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara umur dengan kejadian anemia, tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian anemia, ada hubungan signifikan antara LILA dengan kejadian anemia, ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia

Kesimpulan: Umur, LILA dan tingkat pengetahuan berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III

Kata Kunci : Umur; Paritas; LILA; Pengetahuan; Anemia

**FACTORS ASSOCIATED WITH THE INCIDENCE OF ANEMIA IN THIRD TRIMESTER PREGNANT WOMEN IN THE WORKING AREA OF THE TEMBARAK HEALTH CENTER, TEMANGGUNG REGENCY**

Ambar Wahyuningrum, Joko Susilo, Dwiana Estiwidani

*Department of Midwifery Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*

*Jl Mangkuyudan MJ III, Yogyakarta*

**ABSTRACT**

*Background: Anemia in pregnant women is one of the national health problems. The consequences that can occur due to anemia are bleeding and the risk of low birth weight. This situation can increase morbidity and mortality for mothers and children. Several factors that can cause anemia in pregnant women are knowledge about anemia, LILA, maternal age and parity.*

*Objective: To determine the factors associated with the incidence of anemia in third trimester pregnant women*

*Methods: This study uses an analytical survey with a cross sectional approach. This research was conducted in the working area of the Tembarak Health Center, Temanggung Regency. The population of this study were all pregnant women in the third trimester using a total sampling technique with a total sample of 107 respondents. Analysis of the data using the chi square test.*

*Results: The study showed that there was a significant relationship between age and the incidence of anemia, there was no relationship between parity and the incidence of anemia, there was a significant relationship between LILA and the incidence of anemia, there was a significant relationship between the level of knowledge and the incidence of anemia.*

*Conclusion: Age, LILA and level of knowledge are related to the incidence of anemia in third trimester pregnant women*

*Key Words : Age; Parity; LILA; Knowledge; Anemia*