

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsentrasi campuran umbi gadung dan buah bintaro yang paling efektif sebagai rodentisida nabati adalah konsentrasi sebesar 25% dengan angka kematian tikus hingga 75%
2. Tingkat kematian tikus pada konsentrasi campuran umbi gadung dan buah bintaro 25% sebesar 75%
3. Tingkat kematian tikus pada konsentrasi campuran umbi gadung dan buah bintaro 30% sebesar 53%
4. Tingkat kematian tikus pada konsentrasi campuran umbi gadung dan buah bintaro 40% sebesar 67%

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian dengan melakukan pengulangan yang lebih banyak (lebih dari 3 kali) sehingga hasil yang didapatkan lebih detail
 - b. Penggunaan alat pembuat pellet yang lebih baik akan menghasilkan tekstur pellet yang lebih baik dan pellet tidak mudah hancur
2. Bagi masyarakat

Perlu dilakukan penelitian lanjutan langsung di masyarakat sebelum diterapkan di masyarakat setelah itu masyarakat baru bisa mengaplikasikan rodentisida nabati campuran umbi gadung dan buah bintaro dengan konsentrasi 25% untuk membunuh hama tikus di daerahnya