

TUGAS AKHIR

**ASUHAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. F
USIA 31 TAHUN G2P1AB0AH1 DENGAN ANEMIA SEDANG
DI PUSKESMAS IMOGIRI 1 BANTUL**



**MAYSYITHOH
P07124522152**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
2023**

TUGAS AKHIR

**ASUHAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. F
USIA 31 TAHUN G2P1AB0AH1 DENGAN ANEMIA SEDANG
DI PUSKESMAS IMOGIRI 1 BANTUL**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Profesi Bidan



**MAYSYITHOH
P07124522152**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MAYSYITHOH

NIM : P07124522152

Tanda Tangan :



Tanggal : 3 Mei 2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**“ASUHAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. F USIA 31 TAHUN
G2PIAB0AH1 DENGAN ANEMIA SEDANG DI PUSKESMAS IMOIRI 1
BANTUL”**

Disusun Oleh

**MAYSYITHOH
P07124522152**

Telah dipertahankan dalam seminar di depan Penguji
Pada tanggal. 03 Mei 2023



SUSUNAN PENGUJI

Penguji Akademik,
Nurul Hidayati Hariningtyas, S.Tr.Keb., Bdn (*tygr*)

Penguji Klinik,
Bian Fusanawati, A.Md.Keb
NIP. 198012032019052002)



Yogyakarta, 03 Mei 2023
Ketua Jurusan *A*



Dr. Henri Puji Wahyuningsih, S.SiT, M.Keb
NIP. 197511232002122002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan laporan *Continuity of Care* (COC) ini yang berjudul “Asuhan Berkesinambungan pada Ny. F Usia 31 Tahun G2P1Ab0Ah1 dengan Anemia Sedang di Puskesmas Imogiri 1 Bantul”. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Iswanto, S.Pd., M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.
2. Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.Si.T., M.Keb selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
3. Munica Rita Heryanti, S.Si.T., M.Kes selaku Ketua Prodi Profesi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
4. Nurul Hidayati Hariningtyas, S.Tr.Keb., Bdn selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan laporan COC ini.
5. Bian Fusanawati, A.Md.Keb selaku Pembimbing Lahan yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan laporan COC ini.
6. Orang tua peneliti Bapak Sutrisno dan Ibu Yati Handayani serta keluarga penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan baik material dan moral dalam penulisan laporan ini.
7. Teman-teman seperjuangan (Pendidikan Profesi Bidan Angkatan 6) di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang telah memberikan dukungan.

Laporan *Continuity of Care* (COC) ini disusun untuk memenuhi tugas Tugas Praktik Kebidanan Komunitas BD 7012. Dalam penyusunan tugas laporan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Namun, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi

perbaikan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa kebidanan pada khususnya.

Yogyakarta, Desember 2022

Penulis

Asuhan Berkesinambungan Pada Ny. F Usia 31 Tahun G2P1Ab0Ah1 dengan Anemia Sedang di Puskesmas Imogiri 1 Bantul

“SINOPSIS”

Asuhan antenatal yang kurang optimal atau paripurna dapat menimbulkan dampak atau komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana sehingga sangat penting untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, karena dengan begitu perkembangan kondisi setiap saat akan terpantau dengan baik. Sehingga untuk menghindari dampak pada komplikasi tersebut perlunya asuhan yang berkesinambungan pada ibu hamil risiko tinggi yang berada di Puskesmas Imogiri 1 Bantul salah satunya adalah Ny F.⁴ Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ny. F Umur 31 tahun G2P1AB0AH1 dengan Anemia Sedang dilakukan sejak tanggal 12 Desember 2022 jam 13.30 WIB bidan datang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan *informed consent*. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Hari Pertama Haid Terakhir tanggal 18 April 2022, sehingga Hari Perkiraan Lahirnya 25 Januari 2023. Umur kehamilannya saat ini adalah 33 minggu 6 hari dengan anemia sedang (Hb: 9,7 gr/dl). Kunjungan ANC sebanyak 2 kali. Ny. F melahirkan di RS MK pada tanggal 18 Januari 2023, bayi lahir spontan tanpa komplikasi pukul 22.00 WIB dan plasenta lahir lengkap pukul 22.10 WIB. Kunjungan PNC 4 kali dengan keluhan-keluhan fisiologis masa nifas dan kunjungan neonatus 4 kali normal tanpa adanya kelainan maupun komplikasi.

Kesimpulan dari asuhan ini adalah ibu hamil perlu asuhan yang berkesinambungan guna menghindari dampak komplikasi yang dapat terjadi pada setiap tahap baik dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, maupun tahap neonatal. Saran untuk bidan dipelayanan agar dapat meningkatkan asuhan berkesinambungan dengan cara memantau secara ketat ibu dan janin sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi dan ketika ditemukan komplikasi dapat dilakukan tindakan tepat sesuai prosedur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
“SINOPSIS”	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Manfaat.....	4
BAB II KAJIAN KASUS DAN TEORI.....	5
A. Kajian Kasus.....	5
B. Kajian Teori.....	25
BAB III PEMBAHASAN	89
A. Asuhan Masa Kehamilan.....	89
B. Asuhan Masa Persalinan.....	95
C. Asuhan Bayi Baru Lahir	96
D. Asuhan Masa Nifas dan Keluarga Berencana	97
E. Asuhan Masa Neonatus	102
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perubahan-Perubahan Normal pada Uterus selama Postpartum.. 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kategori IMT Kehamilan	32
Gambar 2.2 Posisi Berbaring Miring	51
Gambar 2.3 Posisi Jongkok dan Berdiri	51
Gambar 2.4 Posisi Merangkak	52
Gambar 2.5 Posisi Duduk.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SOAP Kebidanan	113
Lampiran 2. <i>Informed Consent</i>	144
Lampiran 3. Pernyataan telah selesai CoC	145
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan.....	146
Lampiran 5. Jurnal.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Makin tinggi angka kematian ibu disuatu negara maka dapat dipastikan bahwa derajat kesehatan negara tersebut buruk, karena ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas merupakan kelompok rentan yang memerlukan pelayanan maksimal.¹ Data WHO (*World Health Organization*) AKI secara global yang terjadi pada tahun 2015 adalah 216 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) sedangkan AKB 19 per 1000 KH. Angka ini masih cukup jauh dari target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang menargetkan pada tahun 2030 AKI turun menjadi 70 per 100.000 KH dan AKB 12 per 1000 kelahiran hidup.² Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didapati AKI DIY tahun 2020 sebesar 64.14 dari sebanyak 3.118 KH dengan 2 kasus terbanyak yaitu perdarahan dan penyakit jantung.³ Perdarahan menempati posisi tertinggi penyebab kematian ibu. Anemia adalah salah satu penyebab tidak langsung munculnya perdarahan terbanyak pada ibu bersalin. Anemia kehamilan adalah kondisi tubuh dengan kadar hemoglobin dalam darah <11 gr% pada trimester I dan III atau kadar Hb <10,5 gr% pada trimester II. Anemia akan menyebabkan komplikasi pada saat persalinan seperti gangguan his, kekuatan mengejan, kala pertama dapat berlangsung lama, kala uri yang dapat diikuti retensio plasenta serta perdarahan post partum dan atonia uteri.⁴

AKI Puskesmas Imogiri 1 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ada 1 kasus di wilayah Kalurahan Wukirsari. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus kematian ibu terjadi pada tahun 2018 ada 1 kasus dan tahun 2020 ada 1 kasus serta tahun 2021 ada 1 kasus. Sedangkan AKB tahun 2021 tercatat ada 1 kasus kematian bayi. Kasus kematian bayi ini dikarenakan berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) dan usia kehamilan ibu baru 22 minggu. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya informasi keluarga sehingga proses merujuk

mengalami keterlambatan.⁵ Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti pelayanan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.⁶ Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu mulai dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga.⁷ Upaya lainnya yaitu melakukan asuhan kebidanan secara berkesinambungan (*Continuity of Care*) merupakan asuhan yang diberikan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, atau neonatus, serta pemilihan metode kontrasepsi atau KB secara komprehensif sehingga mampu untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).⁸ Asuhan kebidanan secara berkesinambungan antara lain yaitu asuhan antenatal, yang dimana bertujuan memberikan asuhan yang efektif dan menyeluruh (holistik) bagi ibu, bayi dan keluarganya melalui tindakan skrining, pencegahan dan penanganan yang tepat. Demikian pula, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, melakukan kunjungan nifas, melakukan kunjungan neonatus serta ibu pasca salin memakai alat kontrasepsi yang sesuai pilihan klien.⁹

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* (COC) dengan komprehensif pada ibu hamil risiko tinggi, bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan menggunakan pola pikir manajemen kebidanan serta mendokumentasikan hasil asuhannya dalam bentuk SOAP.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan asuhan berkesinambungan pada ibu hamil trimester III Ny. F usia 31 tahun G2P1Ab0Ah1 dengan anemia sedang di Puskesmas

Imogiri 1 Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan.

- b. Melakukan asuhan berkesinambungan pada ibu bersalin Ny. F usia 31 tahun G2P1Ab0Ah1 dengan anemia sedang di Puskesmas Imogiri 1 Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan.
- c. Melakukan asuhan berkesinambungan pada ibu nifas Ny. F usia 31 tahun G2P1Ab0Ah1 dengan anemia sedang di Puskesmas Imogiri 1 Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan.
- d. Melakukan asuhan berkesinambungan pada neonatus By. Ny. F cukup bulan sesuai masa kehamilan normal di Puskesmas Imogiri 1 Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan.
- e. Melakukan asuhan berkesinambungan pada keluarga berencana Ny. F usia 31 tahun akseptor KB MAL di Puskesmas Imogiri 1 Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan *Continuity of Care* ini adalah pelaksanaan pelayanan asuhan kebidanan yang berkesinambungan yang berfokus pada asuhan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, neonatus dan keluarga berencana.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil laporan ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang asuhan kebidanan berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk laporan *Continuity of Care* selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pasien dan keluarga

Untuk memberikan informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, neonatus dan keluarga berencana serta ibu mendapat pelayanan kebidanan secara *Continuity of Care* mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, neonatus dan keluarga berencana.

b. Bagi Dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Sebagai masukan untuk pengembangan materi yang telah diberikan baik dalam perkuliahan maupun praktik lapangan agar dapat menerapkan secara langsung dan berkesinambungan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas dan keluarga berencana dengan pendekatan manajemen kebidanan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

c. Bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan

Sebagai penerapan mata kuliah asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan keluarga berencana yang telah didapatkan saat perkuliahan.

d. Bagi Bidan di Puskesmas Imogiri I Bantul

Dapat meningkatkan mutu pelayanan dalam pemberian asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas dan keluarga berencana.

BAB II

KAJIAN KASUS DAN TEORI

A. Kajian Kasus

Pengkajian data pada kasus Ny. F tidak hanya dilakukan di Puskesmas Imogiri I Bantul tetapi juga dilakukan melalui kunjungan rumah ke Dusun Kerten RT 007, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul sebagai pengkajian awal pada Ny. F usia 31 tahun seorang ibu hamil berstatus pekerjaan sebagai guru honorer dan wirausaha, berpendidikan D4, memiliki suami bernama Tn. N sebagai ketua RT berpendidikan D4 ilmu pemerintahan. Pengkajian data juga dilakukan secara *online* menggunakan *Whatsapp*, mengambil data primer melalui anamnesa dan pemeriksaan langsung, mengambil data sekunder di rekam medis dan buku KIA pasien. Pengkajian data mulai dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022 hingga 15 Februari 2023.

1. Asuhan Kebidanan Kehamilan

Asuhan Kebidanan pada Ny F Umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1
UK 33 Minggu 6 Hari dengan dengan Anemia Sedang

Antenatal Care kunjungan rumah pertama tanggal 13 Desember 2022 Jam 08.30 WIB

DATA SUBJEKTIF

Bidan datang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan *informed consent*. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Riwayat perkawinan ibu yaitu kawin 1 kali, awal kawin umur 23 tahun, dengan suami sudah 8 tahun. Riwayat menstruasi ibu yaitu Menarche umur 14 tahun. Siklus 28 hari, tidak teratur. Lama 7 hari. Sifat Darah: Encer. Flour Albus: tidak. Dysmenorhoe: tidak. Banyak Darah ganti pembalut 2-3 kali sehari. Ibu mengatakan Hari Pertama Haid Terakhirnya tanggal 18 April 2022, sehingga Hari Perkiraan Lahirnya 25 Januari 2023. Umur Kehamilannya saat ini adalah 33 minggu 6 hari. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu yaitu ini merupakan kehamilan keduanya,

dan ibu mengatakan tidak pernah keguguran. Anak pertama lahir tahun 2015 di tolong oleh Dokter di RSKIA secara spontan dan di induksi atas indikasi KPD, BB lahir: 3500 gram, perempuan, tidak ada komplikasi dan ASI eksklusif. Riwayat kehamilan ini yaitu sejauh ini ibu telah melakukan ANC sebanyak 7 kali (ANC di Klinik MN, dan Puskesmas Imogiri 1, melakukan ANC terpadu di Puskesmas Imogiri 1 saat trimester II), dimana kunjungan awal ibu untuk ANC pada umur kehamilan 7 minggu, status imunisasi TT ibu saat ini TT5. Ibu tidak ada keluhan yang dialami di trimester I dan II. Sedangkan pada trimester III ini ibu mengatakan nyeri pinggang. Riwayat Kunjungan ANC Trimester I: 2 kali, Trimester 2: 4 kali, Trimester 3: 1 kali.

Riwayat alat kontrasepsi, ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun karena program hamil anak kedua terhitung lama yaitu 7 tahun. Ibu mengatakan riwayat kesehatan ibu tidak pernah dan tidak sedang menderita penyakit seperti jantung, hipertensi, DM, hepatitis, HIV, TBC, asma. Tetapi ayahnya pernah menderita penyakit DM. Riwayat pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ibu mengatakan makan sehari 3 kali (terdiri dari nasi, sayur, lauk, telur, ayam/daging/ikan), ibu mengatakan minum air putih 7-8 gelas/hari dan teh 1 gelas/hari, tidak memiliki alergi. Ibu mengatakan saat ini kegiatan sehari-harinya yaitu membersihkan rumah, memasak dan mengajar (fleksibel). Ibu mengatakan mandi teratur pada pagi dan sore hari, selalu keramas setiap 2 hari, mengganti pakaian setiap selesai mandi atau jika merasa tidak nyaman. Ibu mengatakan dirinya dan suami setiap kali cuci tangan selalu pakai sabun, tidak pernah merokok maupun minum-minuman keras. Ibu mengatakan bahwa kehamilan ini sangat diinginkan oleh dirinya dan suami, selama masa kehamilan ini ibu beraktivitas normal, dan tidak melakukan aktivitas yang berat, sosial disekeliling ibu juga baik dan banyak menasehati. Ibu

mengatakan bahwa disekitar lingkungan ibu tidak ada mitos seputar kehamilan/budaya seputar kehamilan.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu tekanan darah saat ini 110/70 mmHg, N: 86 kali/menit, R: 20 kali/menit, S: 36,6 °C, TB: 155 cm, Lila: 254 cm, BB: 60 kg, BB sebelum hamil 49 kg, IMT: 20,39 kg/m (normal). Hasil pemeriksaan didapatkan kondisi mata ibu simetris, sklera putih, konjungtiva merah muda, pandangan ibu tidak kabur, hidung ibu simetris, tidak ada secret, tidak ada cuping hidung, untuk keadaan gigi dan mulut ibu simetris, bibir lembab, tidak ada stomatitis, tidak ada caries, tidak ada gingivitis, leher ibu tidak ada pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, dada simetris, bunyi ronchi tidak ada dan tidak ada wheezing. Payudara dengan hasil simetris, bersih, payudara menggantung, puting menonjol, ada hiperpigmentasi areola, nyeri tekan tidak ada, ASI sedikit. Keadaan abdomen ibu: TFU 3 jari diatas pusat (27 cm), bagian atas bokong, punggung kiri, presentasi kepala, konvergen, kepala masih dapat digoyangkan (belum masuk panggul), TBJ: (27-12) x 155 gram = 2.325 gr, DJJ: 140 kali/menit. Pemeriksaan laboratorium pada awal ANC terpadu di TM II (17/08/2022 di Puskesmas Imogiri 1) yaitu Hb: 9,7 gr/dl, HbSAg/HIV/TPHA: Negatif, GDS: 85 mg/dl, Protein Urine: Negatif. Pemeriksaan lainnya (09/12/2022 di RSKIA S) hasil USG: usia kehamilan 32 minggu 3 hari, Janin hidup, tunggal, intrauterine, presentasi kepala, berat janin : 1,908 gram, plasenta: normal/tidak posterior, ketuban: cukup/ 4,73 cm.

ANALISA

Ny F Umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 UK 33 Minggu 6 Hari dengan Anemia Sedang. Janin tunggal, hidup, intrauterine, presentasi kepala.

PENATALAKSANAAN

Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kondisi ibu dan janin baik yaitu TTV dalam batas normal dan Denyut Jantung Janin 140x/ menit serta usia kehamilan ibu saat ini 33 minggu 6 hari semakin mendekati aterm. Melakukan *informed consent* atas ketersediaan ibu untuk didampingi selama masa kehamilan hingga berKB. Memberikan KIE mengenai pengertian anemia, faktor risiko anemia, komplikasi anemia, gejala anemia, pencegahan atau pengobatan untuk anemia, pola konsumsi tablet tambah darah ibu hamil dan peran suami dalam mengatasi anemia dengan menggunakan media leaflet. Menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi tablet Fe 60 mg 2x sehari bersamaan dengan Vitamin C 25 mg 2x sehari saat siang dan malam sebelum tidur, tidak minum menggunakan teh, kopi, susu, dan lainnya. Tablet kalsium 500 mg diminum 1x sehari dipagi hari. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan (berwarna merah/kuning) setiap hari atau mengatur pola makan yang mengandung zat besi dan tinggi protein seperti telur, daging, kacang-kacangan dan lain sebagainya serta menghindari minuman berkafein seperti teh/kopi agar tidak mengganggu penyerapan Fe didalam tubuh. Memotivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan Hb sekaligus urine rutin di Puskesmas pada trimester III kehamilan supaya memantau kenaikan kadar Hb sesuai yang diharapkan (Ibu bersedia melaksanakan pemeriksaan sesuai anjuran yang diberikan dan rencana akan datang periksa ke Puskesmas tanggal 17/12/2022). Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dengan mengurangi karbohidrat atau makanan/minuman manis karena ibu memiliki riwayat keluarga dengan DM. Menganjurkan suami untuk mendampingi ibu periksa kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan. Menginformasikan kepada ibu tentang

tanda bahaya pada TM III. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi ke fasilitas kesehatan atau jika ada keluhan.

CATATAN PERKEMBANGAN

Antenatal Care kunjungan rumah kedua tanggal 08 Januari 2023 Jam 16.00 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Bidan datang melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan kehamilan dan ibu mengatakan mengatakan punggungnya sakit. Ibu mengatakan tanggal 26 Desember 2023 telah periksa ANC TM III ke Puskesmas Imogiri 1 Bantul untuk pemeriksaan Hb dan urin rutin. Ibu mengatakan saat ini sudah menghindari konsumsi minuman berkafein seperti kopi/the dan sebagainya.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu tekanan darah saat ini 122/72 mmHg, N: 83 kali/menit, R : 20 kali/menit, S : 36, 5°C, TB : 155 cm, Lila: 24 cm, BB: 59 kg. Hasil pemeriksaan didapatkan kondisi mata ibu simetris, sklera putih, konjungtiva merah muda, pandangan ibu tidak kabur, hidung ibu simetris, tidak ada secret, tidak epitaksis, tidak ada cuping hidung, untuk keadaan gigi dan mulut ibu simetris, bibir lembab, tidak ada stomatitis, tidak ada caries, tidak ada gingivitis, leher ibu tidak ada pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, dada simetris, bunyi ronchi tiak ada, tidak ada wheezing. Ibu juga dilakukan pemeriksaan pada payudara dengan hasil simetris, bersih, payudara menggantung, puting menonjol, ada hiperpigmentasi

areola, nyeri tekan tidak ada, ASI sedikit. Keadaan abdomen ibu TFU 3 jari dibawah processus xiphoideus (33 cm), bagian atas bokong, punggung kiri, presentasi kepala, kepala dapat digoyangkan, konvergen (belum masuk panggul). DJJ: 137 kali/menit. Pemeriksaan laboratorium TM III (26/12/2022 di Puskesmas Imogiri 1) yaitu Hb: 11,4 gr/dl, GDS: 82 mg/dl, Protein Urine: Negatif.

ANALISA

Ny F Umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 UK 37 Minggu 5 Hari janin tunggal, hidup, intrauterine dengan hamil normal

PENATALAKSANAAN

Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kondisi ibu dan janin baik yaitu TTV dalam batas normal, Denyut Jantung Janin 137x/menit, kadar Hb ibu dalam batas normal dan usia kehamilan ibu saat ini telah memasuki batas usia kehamilan yang ideal untuk persalinan yaitu 37 minggu-40 minggu. Menjelaskan pada ibu bahwa keadaan nyeri pinggang merupakan hal wajar yang terjadi pada ibu hamil, keadaan itu terjadi dapat dikarenakan perut ibu yang semakin membesar sehingga postur ibu akan menyesuaikan ketika berdiri dan berjalan, hal lain dapat dikarenakan perubahan hormon dan peregangan ligament sebagai proses alami tubuh dalam proses persiapan persalinan. Cara mengatasinya dapat dilakukan tidur dengan posisi yang benar yaitu dengan miring kesamping, salah satu kaki ditekuk dan diberi bantal, pada bawah perut dan belakang punggung juga dapat diberi bantal. Tidak terlalu lama duduk atau berdiri, menghindari menggunakan alas kaki ber hak/sebaiknya yang datar. Menganjurkan ibu tetap makan makanan yang bergizi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe) dan calcium lactate yang diberikan bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Memberitahukan

kepada ibu tanda-tanda persalinan dan mengatakan pada ibu untuk tidak panik dan tetap tenang apabila tanda persalinan muncul. Gunakan untuk istirahat yang cukup, bisa juga jalan-jalan pagi atau sore, tetap memenuhi kebutuhan nutrisi dan jangan lupa berdoa. Memberikan konseling ibu diperbolehkan melakukan hubungan suami istri karena sperma dari suami dapat menyebabkan kontraksi pada rahim ibu dan akan memicu terjadinya persalinan. Jika kencang-kencang semakin sering dan durasinya setiap 3 menit atau keluar air-air, maka segera datang ke bidan. Menginformasikan kepada ibu tentang P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) untuk persiapan persalinan yang aman (Ibu telah memutuskannya dan orang yang akan mengantar atau mendampingi adalah suami, kendaraan yang digunakan yaitu motor pribadi, biaya persalinan oleh suami, persiapam donor darah dari semua anggota keluarga memiliki golongan darah O+ baik keluarga suami maupun ibu. Ibu dan suami sudah mantap berencana melahirkan di RS MK supaya tidak perlu khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat persalinan). Menginformasikan kembali kepada ibu tentang tanda bahaya pada TM III. Memberikan KIE motivasi KB pasca persalinan pada ibu. Memberikan KIE tentang PHBS pada ibu dan suami. Memotivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan USG ke dokter spesialis kandungan minimal 1x di trimester III agar mengetahui lebih jelas/pasti mengenai keadaan janin sebagai persiapan persalinan yang aman. Melakukan *follow up* melalui *whatsapp* bahwa ibu telah melakukan pemeriksaan USG ke dokter kandungan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan hasil janin tunggal hidup intrauterine presentasi kepala sudah masuk PAP, TBJ: 3250 gram, air ketuban cukup dan plasenta letak fundus anterior. Ibu juga mengatakan telah membuat janji untuk bersalin di RS MK. Mengajukan ibu untuk kunjungan ulang 1 minggu lagi ke fasilitas kesehatan atau jika ibu merasa ada keluhan.

2. Asuhan Kebidanan Persalinan

Asuhan Kebidanan Persalinan Pada Ny F Umur 31 tahun G2P1AB0AH1
Umur Kehamilan 39 Minggu Janin Tunggal, Hidup, Intrauterine Presentasi

DATA SUBJEKTIF

Ibu datang ke RS MK 18 Januari 2023 jam 05.00 WIB. Ny. F umur 31 tahun G2P1AB0AH1 Umur Kehamilan 39 Minggu mengeluh perut kram terasa seperti kenceng-kenceng sejak pukul 03.00 WIB. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan nifas yang lalu yaitu ini merupakan kehamilan keduanya, dan ibu mengatakan tidak pernah keguguran. Anak pertama lahir tahun 2015 di tolong oleh Dokter di RSKIA secara spontan dan di induksi atas indikasi KPD, BB lahir: 3500 gram, perempuan, tidak ada komplikasi dan ASI eksklusif. Ibu mengatakan Hari Pertama Haid Terakhir tanggal 18 April 2022, sehingga Hari Perkiraan Lahirnya 25 Januari 2023. Umur Kehamilannya saat ini adalah 39 minggu. Sejauh ini ibu telah melakukan ANC sebanyak 10 kali dimana kunjungan awal ibu untuk ANC pada umur kehamilan 7 minggu. Ibu tidak ada keluhan yang dialami di trimester I dan II. Sedangkan pada trimester III ini ibu mengatakan nyeri pinggang.

DATA OBJEKTIF

Ny.F mengatakan dilakukan pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal dan dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 2 cm, dilakukanlah observasi lebih lanjut pada janin dan ibu seperti keadaan umum, vital sign, DJJ, kontraksi, kemajuan persalinan.

ANALISA

Ny F umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 umur kehamilan 39 minggu janin tunggal, hidup, intrauterine presentasi kepala dalam persalinan kala I fase laten dengan persalinan normal

PENATALAKSANAAN (dilakukan oleh Bidan jaga di RS MK)

CATATAN PERKEMBANGAN

18 Januari 2023 Jam 14.00 WIB ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin sering. VT: \ominus 4 cm. Dilakukanlah observasi lebih lanjut pada janin dan ibu seperti keadaan umum, vital sign, DJJ, kontraksi, kemajuan persalinan.

Jam 18.00 WIB. Ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin kuat dan sering serta keluar lendir darah dari jalan lahir. Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu dalam batas normal, VT: \ominus 8 cm.

Jam 21.20 WIB. Ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin sering, keluar air-air yang tidak tertahankan dan ada keinginan untuk meneran seperti ingin BAB. Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu dalam batas normal, VT: \ominus 10 cm, AK (+) jernih, STLD (+).

PENATALAKSANAAN (dilakukan oleh Bidan jaga di RS MK) Bayi lahir spontan, Jenis Kelamin: perempuan, pukul 22.00 WIB. Jam 22.00 WIB Plasenta lahir lengkap. Jam 22.25 WIB. Dilakukan penjahitan robekan jalan lahir dan pemantauan kala IV dalam batas normal tidak ada komplikasi.

3. Asuhan Kebidanan Nifas

Asuhan Kebidanan pada Ny. F Umur 31 tahun P2Ab0Ah2 8 Jam
Post Partum dengan Nifas Normal

Asuhan *Postnatal Care* di RS MK 19 Januari 2023 Jam 06.00 WIB

DATA SUBJEKTIF

Ibu melahirkan tanggal 18 Januari 2023 jam 22.00 WIB. Ibu mengatakan masih terasa sedikit lelah, perut masih terasa mulas dan sakit pada bagian jalan lahir. Ibu mengatakan sudah BAK ke kamar mandi, tetapi belum BAB.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu dalam batas normal. Ibu juga dilakukan pemeriksaan pada payudara normal, ASI keluar berwarna kuning (kolostrum). Keadaan abdomen dan genetalia ibu normal tidak ada komplikasi.

ANALISA

Ny F Umur 31 tahun P2Ab0Ah2 8 jam post partum dengan nifas normal

PENATALAKSANAAN (dilakukan oleh Bidan jaga di RS PKU Muhammadiyah berdasarkan pengkajian subjektif Ny. F)

Memberitahu tentang hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam kondisi normal dan menjelaskan mengenai keluhannya adalah hal yang normal dimasa nifas. Menganjurkan ibu untuk makan makanan bergizi, makanan yang mengandung protein, vitamin dan mineral, seperti telur, ikan laut, sayur dan sebagainya serta minum air mineral setiap selesai menyusui. Menganjurkan ibu untuk tidak menahan BAK dan BAB agar kondisi ibu

cepat dalam pemulihan dan tidak mengalami infeksi. Melakukan hubungan bonding antara ibu dan bayinya. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup apabila bayinya tidur, ibu juga tidur agar stamina ibu tetap terjaga. Mengajarkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan pada bayinya agar nutrisi bayi baik. Mengajarkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya minimal 2 jam sekali agar kebutuhan nutrisi bayi baik. Mengajarkan ibu untuk menjaga kebersihan genetaliaanya yaitu dengan cara mengganti pembalut sesering mungkin/ganti pembalut 3-4 kali sehari untuk mencegah terjadinya infeksi. Menjelaskan tanda bahaya masa nifas kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya nifas seperti pusing, demam, kontraksi uterus lembek dan perdarahan yang keluar seperti air keran mengalir untuk segera melapor pada bidan jaga. Memberikan terapi obat yaitu vitamin A 100.000 unit diminum 1x1 sebanyak 2 kapsul untuk mencegah perdarahan, amoxilin 500 mg diminum 3x1 sebanyak 15 tablet untuk mencegah infeksi, paracetamol 500 mg diminum 3x1 sebanyak 10 tablet untuk meringankan rasa nyeri jalan lahir dan tablet tambah darah 60 mg diminum 1x1 sebanyak 10 tablet untuk mengganti kehilangan darah selama persalinan. Memindahkan ibu ke ruang perawatan nifas bersama bayinya. Memperbolehkan ibu pulang dari RS sesuai *advice* dokter yaitu 20 Januari 2023 jam 11.00 WIB.

CATATAN PERKEMBANGAN

Asuhan *Postnatal Care* kunjungan rumah pada 24 Januari 2023 Jam 14.30 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Ibu mengatakan bekas jahitan masih sedikit sakit, dan ASI nya lancar, ibu memberikan ASI secara on demand atau sesuai keinginan bayi. Ibu tidak minum jamu atau melakukan budaya yang berkaitan pada masa nifas karena dalam keluarganya tidak menganut budaya atau kebiasaan seperti itu. Ibu sudah bisa BAK dan BAB. Ibu mengatakan belum ada rencana ber-KB.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu saat ini, Tekanan darah: 120/70, Nadi: 78x/menit, Respirasi: 20x/menit, Suhu: 36,5 C. Mata: sklera putih konjungtiva merah muda. Payudara: Simetris, bersih, payudara menggantung, puting menonjol, ada hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, ASI keluar (peralihan/transisi). Keadaan abdomen: TFU pertengahan antara simpisis dan pusat, kontraksi keras, lochea sanguilenta, perdarahan pervaginam dalam batas normal, terdapat luka perineum baik dan tidak ada pengeluaran nanah.

ANALISA

Ny. F umur 31 tahun P2Ab0Ah2 6 hari post partum dengan nifas normal.

PENATALAKSANAAN

Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik. Menjelaskan pada ibu mengenai keluhannya bahwa nyeri jahitan jalan

lahir merupakan hal yang normal karena sedang dalam masa penyembuhan sehingga ibu tidak perlu khawatir dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Mengajarkan teknik menyusui yang baik dan benar untuk memaksimalkan pemberian ASI pada bayi. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif tanpa memberikan makanan lain kepada bayinya minimal selama 6 bulan dan ASI diberikan minimal tiap 2 jam atau jika bayi memintanya. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar nutrisi ibu baik dan tinggi protein agar mempercepat penyembuhan luka jahitan perineum. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh terutama alat kelaminnya serta menganjurkan ibu untuk mengganti pembalut 3-4 kali/hari untuk mencegah terjadinya infeksi. Memberitahu ibu kegawatdaruratan dirumah seperti terjadi perdarahan yang banyak, rahim ibu tidak berkontraksi dengan baik (lembek), payudara keras nyeri hingga kemerahan, terdapat masalah dengan bayi seperti bayi kuning, tali pusat berdarah bernanah dan bau, bayi sulit tidur, demam, dan diare. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan konsumsi tablet tambah darah dari bidan. Memberikan KIE tentang KB, jenis, kelebihan, kekurangan dan efek sampingnya kepada ibu. Menjadwalkan kunjungan ulang 1 atau 2 minggu lagi atau bila ada keluhan.

CATATAN PERKEMBANGAN

Asuhan *Postnatal Care* kunjungan rumah pada 1 Februari 2023 Jam 13.30 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Ibu mengatakan keadaannya sudah membaik dapat beraktivitas seperti biasa dan tidak ada keluhan. Ibu mengatakan dirinya belum memutuskan perihal KB dengan suaminya.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu tekanan darah saat ini 110/70 mmHg, N: 86 kali/menit, R: 20 kali/menit, S: 36,7 °C. Mata: sklera putih konjungtiva merah muda. Payudara: Simetris, bersih, payudara menggantung, puting menonjol, ada hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, ASI keluar (matur). Keadaan Abdomen ibu: TFU tidak teraba, lochea alba, luka perineum sudah kering.

ANALISA

Ny. F umur 31 tahun P2Ab0Ah2 14 hari post partum dengan nifas normal.

PENATALAKSANAAN

Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik. Mengingatkan kembali kebutuhan nutrisi pada masa nifas yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Menganjurkan ibu kembali untuk tetap menyusui bayinya sampai 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan. Menganjurkan ibu untuk tetap meneruskan pola kehidupan atau aktifitas sehari-hari yang sudah dilaksanakan dengan baik. Menganjurkan ibu ke tenaga kesehatan apabila terdapat tanda-tanda seperti demam tinggi, perdarahan tidak normal, dan sakit kepala yang hebat. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan konsumsi tablet tambah darah dari bidan. Memotivasi ibu agar tetap ber-KB secara dini untuk memberikan jarak kehamilan dengan anak keduanya agar lebih fokus merawat bayinya saat ini. Memberikan motivasi pada ibu untuk ber-KB jangka panjang pasca nifas berakhir yang tidak mengganggu produksi ASI seperti suntik progesterin,

implant, dan IUD sesuai kondisi ibu. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang ke fasilitas kesehatan 2 minggu lagi atau bila ada keluhan. Menjadwalkan kunjungan terakhir nifas untuk memastikan KB dan jika ada masalah terkait kesehatan ibu maupun bayinya.

CATATAN PERKEMBANGAN

Asuhan *Postnatal Care* kunjungan rumah pada 15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Ibu mengatakan tidak ada keluhan dan beraktivitas seperti biasa. Ibu mengatakan suami dan dirinya ingin KB yang tidak memakai alat dan tidak ingin yang jangka panjang karena ada rencana program hamil kembali sedangkan menstruasi ibu tidak teratur dan sebelumnya sulit untuk hamil anak keduanya ini.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum ibu, keadaan umumnya baik, kesadaran ibu compos mentis. Tanda vital ibu tekanan darah saat ini 120/80 mmHg, N: 78 kali/menit, R:20 kali/menit, S: 36,5 °C, Keadaan Abdomen ibu: TFU tidak teraba, lochea alba, luka perineum sudah kering.

ANALISA

Ny. F umur 31 tahun P2Ab0Ah2 28 hari post partum dengan nifas normal.

PENATALAKSANAAN

Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik. Mengingatkan kembali kebutuhan nutrisi pada masa nifas yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Menganjurkan ibu untuk tetap meneruskan pola kehidupan atau aktifitas sehari-hari yang sudah

dilaksanakan dengan baik. Menganjurkan ibu ke tenaga kesehatan apabila terdapat tanda-tanda seperti demam tinggi, perdarahan tidak normal, dan sakit kepala yang hebat. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan konsumsi tablet tambah darah dari bidan. Memberikan konseling KB kembali kepada ibu agar dapat ber-KB pasca nifas berakhir lalu menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi terbagi menjadi 3 jenis yaitu alamiah, hormonal dan non hormonal. Alamiah seperti MAL, metode kalender dan suhu basal. KB hormonal seperti pil, suntik dan implant. Sedangkan KB non hormonal seperti IUD, kondom dan MOW/MOP (Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan dan mengatakan ingin menggunakan KB alamiah). Menjelaskan kepada ibu mengenai metode KB alamiah, jenis-jenisnya, kekurangan dan kelebihanannya (Ibu paham dan ingin KB alami yaitu MAL). Menjelaskan kepada ibu mengenai KB MAL, keefektifannya, caranya, kelebihan dan kekurangannya. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila ada keluhan atau ingin mengganti metode KB ke fasilitas terdekat.

4. Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir

Asuhan Kebidanan pada Bayi Ny F Usia 1 jam Cukup Bulan,
Sesuai Masa Kehamilan, Normal

Asuhan Bayi Baru Lahir di RS MK 18 Januari 2023 Jam 23.00 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Ibu mengatakan melahirkan anak keduanya. Bayi lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.00 WIB, umur kehamilan 39 Minggu, jenis kelamin perempuan lahir menangis kuat, tonus otot baik, bernafas normal.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum pada bayi didapatkan hasil keadaan umum baik, BB: 3300 gram, PB: 50 cm LK: 33 cm, LD: 32 cm, Lila: 10,5 cm. TTV dalam

batas normal. Pemeriksaan fisik bayi tidak ada kelainan dan tidak ada komplikasi.

ANALISA

Bayi Ny F usia 1 jam cukup bulan, sesuai masa kehamilan, normal.

PENATALAKSANAAN (dilakukan oleh Bidan jaga di RS MK berdasarkan pengkajian subjektif Ny. F)

Melakukan penimbangan atau pengukuran bayi, memberi salep mata antibiotic profilaksis untuk mencegah infeksi mata, dan vitamin K 1 mg untuk mencegah perdarahan secara intramuskular di paha kiri anterolateral. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir secara menyeluruh meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan head to toe. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, memberikan suntikan imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis B pada bayi di paha kanan anterolateral secara IM. Menjaga kehangatan suhu bayi dengan menyelimuti menggunakan kain dan memakaikan kepala bayi dengan topi. Melakukan pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir dengan memantau dan mencegah keadaan yang lebih buruk pada bayi baru lahir normal. Melakukan rawat gabung bayi dengan ibu di ruang perawatan nifas.

CATATAN PERKEMBANGAN

Asuhan Bayi Baru Lahir di RS MK 19 Januari 2023 Jam 23.00 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Ibu mengatakan bayinya lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, umur kehamilan 39 Minggu, sudah BAB 1 kali dan BAK 2 kali.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum pada bayi didapatkan hasil keadaan umum baik, BB: 3300 gram, PB: 50 cm, TTV dalam batas normal, kulit kemerahan, tali pusat masih basah, tidak berbau, tidak ada perdarahan. Keadaan genetalia bayi berjenis kelamin perempuan, sudah BAB, sudah BAK dan menyusui.

ANALISA

Bayi Ny F usia 1 hari cukup bulan, sesuai masa kehamilan, normal.

PENATALAKSANAAN (dilakukan oleh bidan jaga di RS MK berdasarkan hasil pengkajian subjektif dari Ny. F)

Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik. Mengajarkan ibu untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi seperti mencuci tangan sebelum meneteki (menyusui) bayinya. Mengajarkan ibu untuk menjaga kebutuhan nutrisi bayi seperti memberikan ASI secara on demand/sesuai kebutuhan bayi minimal setiap 2-3 jam untuk pemenuhan gizi. Semakin sering bayi disusui maka akan semakin lancar produksi ASI sehingga dapat mencukupi kebutuhan asupan dan mempercepat pertumbuhan serta perkembangan bayi. Menjelaskan mengenai ASI eksklusif. Memberikan KIE tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Memberikan KIE perawatan tali pusat. Mengajarkan ibu untuk melanjutkan imunisasi selanjutnya yaitu imunisasi BCG yang sudah dapat diberikan saat usia 1 bulan, manfaatnya untuk mencegah penyakit TBC. Mengajarkan ibu untuk kontrol rutin bayi pada rentang usia 3-7 hari atau kunjungan ke-2. Bayi dipulangkan bersama dengan ibu pada 20 Januari 2023 jam 11.00 WIB.

CATATAN PERKEMBANGAN

Asuhan Bayi Baru Lahir kunjungan rumah pada 24 Januari 2023 Jam 14.30 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Ibu mengatakan bayi lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.00, umur kehamilan 39 minggu jenis kelamin perempuan. Lahir menangis, tonus otot baik, bernafas normal. Saat ini tidak ada keluhan. BAK dan BAB lancar dalam batas normal, menyusu kuat. Ibu mengatakan tali pusat bayi telah puput tadi pagi.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum pada bayi didapatkan hasil keadaan umum baik, kesadaran: composmentis, N: 130 x/menit, S: 36,6°C, R: 45 x/menit, BB: 3400 gram, PB: 50 cm, kulit kemerahan, tali pusat telah puput. Keadaan genitalia bayi berjenis kelamin perempuan.

ANALISA

Bayi A usia 6 hari cukup bulan, sesuai masa kehamilan, normal.

PENATALAKSANAAN

Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik. Menganjurkan kepada ibu untuk membawa bayinya ke tenaga kesehatan atau posyandu untuk diimunisasi sesuai umur bayinya dan membawa buku KIA apabila imunisasi. Menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya ASI Eksklusif untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi setiap 2 jam selama 6 bulan. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya dengan mandi setidaknya 2 kali/hari. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayi seperti sering mengganti popok untuk mencegah

terjadinya ruam popok. Menganjurkan ibu agar menjaga dan mempertahankan suhu tubuh bayi tetap hangat dengan menyelimuti dan pasang topi. Memberikan KIE tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, meliputi tidak mau menyusui, kejang-kejang, lemah, sesak nafas (lebih dari 60x/menit dan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam), bayi merintih atau menangis terus menerus, tali pusat kemerahan sampai dinding perut (berbau dan bernanah), demam tinggi, mata bayi bernanah, diare/buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari, kulit dan mata bayi kuning, dan tinja bayi berwarna pucat saat buang air. Menganjurkan ibu untuk membawa bayi ke tenaga kesehatan apabila mendapatkan salah satu tanda diatas. Menganjurkan ibu untuk rutin mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang ke fasilitas terdekat saat usia bayi 8-28 hari/kunjungan ke-3 sekaligus imunisasi BCG.

CATATAN PERKEMBANGAN

Asuhan Bayi Baru Lahir kunjungan rumah pada 15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.

DATA SUBJEKTIF

Ibu mengatakan bayi lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.00 di RS MK, umur kehamilan 39 minggu, jenis kelamin perempuan. Lahir spontan menangis, tonus otot baik, bernafas normal. Saat ini tidak ada keluhan. BAK dan BAB lancar dalam batas normal, menyusu kuat dan telah imunisasi BCG di Bidan tanggal 12 Februari 2023.

DATA OBJEKTIF

Pemeriksaan umum pada bayi didapatkan hasil keadaan umum baik, kesadaran: Composmentis, N: 137 x/menit, S: 36,6°C, R: 44 x/menit, BB:

3700 gram, PB: 50 cm, kulit kemerahan. Keadaan genetalia bayi berjenis kelamin perempuan.

ANALISA

Bayi A usia 28 hari cukup bulan, sesuai masa kehamilan, normal

PENATALAKSANAAN

Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik. Menganjurkan kepada ibu untuk membawa bayinya ke tenaga kesehatan atau posyandu untuk diimunisasi selanjutnya sesuai umur bayi dan membawa buku KIA apabila imunisasi. Menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya ASI Eksklusif untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi setiap 2 jam selama 6 bulan. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya dengan mandi setidaknya 2 kali/hari. Menganjurkan ibu agar menjaga dan mempertahankan suhu tubuh bayi tetap hangat dengan menyelimuti dan pasang topi. Menganjurkan ibu untuk rutin mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas terdekat apabila ada keluhan dengan bayinya.

B. Kajian Teori

1. Kehamilan
 - a. Definisi

Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Kehamilan terjadi karena adanya pembuahan dimana bertemunya cairan mani suami dengan sel telur istri. Setelah pembuahan, maka terbentuk kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di dalam rahim ibu yang merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi janin¹⁰.

Kehamilan merupakan proses alamiah untuk menjaga kelangsungan peradaban manusia. Kehamilan baru bisa terjadi jika

seorang wanita sudah mengalami pubertas yang ditandai dengan terjadinya menstruasi. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Lama kehamilan yaitu 280 hari atau 40 pekan (minggu) atau 10 bulan (lunar months). Kehamilan dibagi atas 3 trimester: (a) kehamilan trimester I antara 0 -12 minggu, (b) kehamilan trimester II antara 12 - 28 minggu, dan (c) kehamilan trimester III antara 28 – 40 minggu. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah peristiwa yang dimulai dari konsepsi (pembuahan) dan berakhir dengan permulaan persalinan ¹¹. Selama masa inilah diperlukan perawatan khusus pada kehidupan ibu maupun janin agar dapat berlangsung dengan baik ¹².

Dalam kehamilan dapat dibedakan berdasarkan jumlah kehamilan/gravida seorang wanita, antara lain ¹³:

- 1) Primigravida adalah seorang ibu yang sedang hamil untuk pertama kali.
- 2) Multigravida adalah seorang ibu yang hamil lebih dari 1 sampai 5 kali.

b. Tanda- tanda kehamilan ¹⁴

a. Tanda-tanda dugaan hamil

a) Amenorea (terlambat datang bulan)

Mengetahui tanggal haid terakhir dengan perhitungan rumus Naegle dapat ditentukan perkiraan persalinan. Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel de Graaf dan ovulasi.

b) Nausea (enek/mual) dan emesis (muntah)

Pengaruh ekstrojen dan progesteron terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, sering terjadi pada pagi hari (Morning

Sickness). Dalam batas yang fisiologis keadaan ini dapat diatasi. Akibat mual dan muntah nafsu makan berkurang.

c) Sering buang air kecil

Trimester I karena kandung kencing tertekan uterus yang mulai membesar. Trimester II dan III karena janin mulai masuk ke ruang panggul dan menekan kembali kandung kencing.

d) Pigmentasi kulit

Terjadi karena pengaruh dari hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanosfor dan kulit.

(1) Sekitar pipi : cloasma gravidarum

Keluarnya melanophore stimulating hormone hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit pada kulit.

(2) Dinding perut: striae lividae, striae nigra, linea alba makin hitam.

(3) Sekitar payudara: hiperpigmentasi areola mammae, puting susu makin menonjol, kelenjar montgomery menonjol, pembuluh darah menifes sekitar payudara.

e) Anoreksia (tidak nafsu makan)

Terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, tapi setelah itu nafsu makan akan timbul lagi.

f) Payudara menjadi tegang dan membesar disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang duktuli dan alveoli di mammae glandula montgomery tampak lebih jelas, payudara membesar dan menegang dan ujung saraf tertekan menyebabkan rasa sakit terutama pada hamil pertama.

g) Obstipasi atau konstipasi terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormone steroid, sehingga menyebabkan kesulitan untuk buang air besar.

h) Epulis: varises atau penampakan pembuluh darah vena, karena pengaruh dari ekstrogen dan progesterone terjadi penampakan

pembuluh darah vena, terutama bagi mereka yang mempunyai bakat. Penampakan pembuluh darah itu terjadi di sekitar genetalia eksterna, kaki dan betis, dan payudara. Penampakan pembuluh darah ini dapat menghitung setelah persalinan.

- i) Mengidam.
- b. Tanda-tanda mungkin hamil
 - a) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya hamil.
 - b) Pada pemeriksaan dalam dijumpai :
 - (1) Tanda hegar: uterus segmen bawah lebih lunak dari pada bagian yang lain.
 - (2) Tanda piscasek: uterus membesar ke salah satu jurusan hingga menonjol jelas ke jurusan pembesaran perut.
 - (3) Tanda *Chadwick*: perubahan warna pada servix dan vagina menjadi kebiru-biruan.
 - (4) Tanda braxton-hicks: merupakan kontraksi tak teratur rahim dan terjadi tanpa rasa nyeri di sepanjang kehamilan. Kontraksi ini barang kali membantu sirkulasi darah dalam plasenta.
 - (5) Teraba ballotement
 - c) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif atau sebagian kemungkinan positif palsu.
- c. Tanda-tanda Pasti
 - 1) Terdengar Denyut Jantung Janin.
 - 2) Terasa pergerakan janin dalam rahim.
 - 3) Pemeriksaan ultrasonografi.
 - 4) Pemeriksaan rontgen untuk melihat kerangka janin ¹¹.
- c. Faktor pengaruh pada kehamilan ¹⁵
 - 1) Faktor fisik

Status kesehatan yang dapat mempengaruhi kehamilan. Penyakit atau kelainan yang tidak langsung berhubungan dengan kehamilan.

2) Faktor psikologis

a) *Stressor internal*

Stressor internal adalah stress yang berasal dari dalam diri sendiri yang timbul akibat adanya kehamilan seperti kecemasan, ketegangan, ketakutan, penyakit, tidak percaya diri, perubahan penampilan, perubahan peran sebagai orangtua, sikap terhadap kehamilan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

b) *Stressor external*

Stressor external adalah stress yang berasal dari orang sekitar maupun kondisi dari luar. Kondisi yang termasuk stressor external adalah status marital misalnya hamil belum menikah, maladaptasi, kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan, hubungan sosial yang tidak adekuat, kasih sayang, *support* mental, dan juga *broken home*.

3) Faktor lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

d. Asuhan kehamilan

Dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil, bidan harus memberikan pelayanan secara komperensif atau menyeluruh. Adapun lingkup asuhan kehamilan pada ibu hamil terdiri dari ¹¹:

- 1) Mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisa tiap kunjungan/pemeriksaan ibu hamil.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap.
- 3) Melakukan pemeriksaan abdomen termasuk TFU/ posisi/ presentasi dan penurunan kepala.
- 4) Melakukan penilaian pelvic, ukuran dan struktur panggul.
- 5) Menilai keadaan janin selama kehamilan.
- 6) Menghitung usia kehamilan dan hari perkiraan lahir.
- 7) Mengkaji status nutrisi dan hubungan dengan pertumbuhan janin.

- 8) Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi.
 - 9) Memberikan penyuluhan dan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan.
 - 10) Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan anemia ringan
 - 11) Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan
 - 12) Memberikan imunisasi.
 - 13) Mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan penangannya.
 - 14) Memberikan bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran, dan menjadi orangtua.
 - 15) Bimbingan dan penyuluhan tentang perilaku kesehatan selama kehamilan.
 - 16) Penggunaan secara aman, atau obat-obatan tradisional yang tersedia.
- e. Tipe pelayanan kehamilan

Tipe pelayanan kebidanan, meliputi 3 ruang lingkup yaitu pelayanan kebidanan primer atau mandiri, kolaborasi dan rujukan, sebagai berikut ¹⁴:

- 1) Pelayanan kebidanan primer merupakan pelayanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.
- 2) Pelayanan kebidanan kolaborasi merupakan layanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan.
- 3) Pelayanan kebidanan rujukan adalah layanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya bidan menerima rujukan dari dukun, juga layanan horisontal maupun vertikal ke profesi kesehatan lain.

f. Kebutuhan fisik ibu hamil ¹⁶

1) Kebutuhan oksigen

Pada kehamilan terjadi perubahan pada sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen, di samping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih dalam. Hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya aktifitas paru-paru oleh karena selain untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibu, juga harus mencukupi kebutuhan oksigen janin. Ibu hamil kadang-kadang merasakan sakit kepala, pusing ketika berada di keramaian misalnya di pasar, hal ini disebabkan karena kekurangan oksigen. Untuk menghindari kejadian tersebut hendaknya ibu hamil menghindari tempat kerumunan banyak orang. Untuk memenuhi kecukupan oksigen yang meningkat, supaya melakukan jalan-jalan dipagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, berada di ruang yang ventilasinya cukup.

2) Kebutuhan nutrisi

Untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama masa hamil, banyak diperlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dari pada sebelum hamil. Pada ibu hamil akan mengalami BB bertambah, penambahan BB bisa diukur dari IMT (Indeks Masa Tubuh) / BMI (Body Mass Index) sebelum hamil. IMT dihitung dengan cara BB sebelum hamil dalam kg dibagi (TB dlm m).

Gambar 2.1 Kategori IMT kehamilan

Kenaikan BB wanita hamil berdasarkan BMI atau IMT sebelum hamil

Kategori BMI	Rentang Kenaikan BB yang dianjurkan
Rendah (BMI < 19,8)	12,5 - 18 kg
Normal (BMI 19,8 - 26)	11,5 - 16 kg
Tinggi (BMI > 26 - 29)	7 - 11,5 kg
Obesitas (BMI > 29)	< 6 kg

Helen Varney, Buku Saku Bidan, Ilmu Kebidanan

- 3) Personal hygiene: penyemprotan vagina (douching) harus dihindari selama kehamilan karena akan mengganggu mekanisme pertahanan vagina yang normal, dan penyemprotan vagina yang kuat (dengan memakai alat semprot) ke dalam vagina dapat menyebabkan emboli udara atau emboli air. Deodorant vagina juga tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan dermatitis alergika.
- 4) Hamil bukan merupakan halangan untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual disarankan tidak dilakukan pada ibu hamil bila:
 - a) Terdapat tanda infeksi dengan pengeluaran cairan disertai rasa nyeri atau panas.
 - b) Terjadi perdarahan saat hubungan seksual.
 - c) Terdapat pengeluaran cairan (air) yang mendadak.
 - d) Terdapat perlukaan di sekitar alat kelamin bagian luar.
 - e) Serviks telah membuka
 - f) Plasenta letak rendah
 - g) Wanita yang sering mengalami keguguran, persalinan preterm, mengalami kematian dalam kandungan atau sekitar 2 minggu menjelang persalinan.

- 4) Posisi berbaring terlentang tidak dianjurkan pada ibu hamil karena dapat menekan pembuluh darah yang sangat penting yaitu vena cava inferior sehingga mengganggu oksigenasi dari ibu ke janin. Sebaiknya ibu hamil membiasakan berbaring dengan posisi miring ke kiri.
 - 5) Olah raga yang aman bagi ibu hamil adalah senam aerobik ringan, jalan kaki, berenang dan yoga.
 - 6) Ibu hamil boleh naik pesawat udara usia kehamilan < 35 minggu. Pada kehamilan beresiko, hamil muda sebaiknya tidak naik pesawat udara.
- g. Kebutuhan psikologis pada ibu hamil
- 1) Support dari keluarga pada ibu hamil
 - 2) Support dari tenaga kesehatan pada ibu hamil
 - 3) Rasa aman dan nyaman selama kehamilan
 - 4) Persiapan menjadi orangtua
 - 5) Persiapan sibling.
- h. Tanda bahaya dalam kehamilan

Setiap kunjungan antenatal bidan harus mengajarkan kepada ibu hamil untuk mengenali tanda-tanda bahaya pada kehamilan maupun persalinan. Tanda bahaya ini jika tidak terdeteksi maka akan mengakibatkan kematian. Untuk mengantisipasi ini maka tidak hanya ibu hamil saja yang perlu mengerti tentang tanda bahaya tetapi suami dan keluarganya khususnya orang penting yang berhak memberi keputusan apabila terjadi kagawat daruratan harus juga mengetahui tentang tanda bahaya ¹⁴.

Ada 6 tanda bahaya selama periode antenatal adalah ¹⁷:

- 1) Perdarahan per vaginam
 - a) Perdarahan tidak normal yang terjadi pada awal kehamilan (perdarahan merah, banyak atau perdarahan dengan nyeri), kemungkinan abortus, mola atau kehamilan ektopik.

- b) Perdarahan tidak normal pada kehamilan lanjut (perdarahan merah, banyak, kadang-kadang, tidak selalu, disertai rasa nyeri) bisa berarti plasenta previa atau solusio plasenta.
- 2) Sakit kepala yang hebat, menetap yang tidak hilang. Sakit kepala hebat dan tidak hilang dengan istirahat adalah gejala pre eklampsia.
 - 3) Perubahan visual secara tiba – tiba (pandangan kabur). Masalah penglihatan pada ibu hamil yang secara ringan dan tidak mendadak kemungkinan karena pengaruh hormonal. Tetapi kalau perubahan visual yang mendadak misalnya pandangan kabur atau berbayang dan disertai sakit kepala merupakan tanda pre eklampsia.
 - 4) Nyeri abdomen yang hebat. Nyeri abdomen yang tidak ada hubungan dengan persalinan adalah tidak normal. Nyeri yang tidak normal apabila nyeri yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat, hal ini kemungkinan karena appendisitis, kehamilan ektopik, abortus, penyakit radang panggul, gastritis, penyakit kantung empedu, abrupsi plasenta, infeksi saluran kemih dll.
 - 5) Bengkak pada muka atau tangan. Hampir separuh ibu hamil mengalami bengkak normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah beristirahat atau meninggikan kaki. Bengkak dapat menunjukkan tanda bahaya apabila muncul pada muka dan tangan dan tidak hilang setelah beristirahat dan disertai keluhan fisik lain. Hal ini dapat merupakan tanda anemia, gagal jantung atau pre eklampsia.
 - 6) Bayi bergerak kurang dari seperti biasanya. Ibu hamil akan merasakan gerakan janin pada bulan ke 5 atau sebagian ibu merasakan gerakan janin lebih awal. Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 x dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik.

2. Anemia dalam Kehamilan

a. Definisi

Kehamilan dapat memicu sekaligus memacu terjadinya perubahan tubuh, baik secara anatomis maupun fisiologis terjadi peningkatan kebutuhan akan zat besi pada masa kehamilan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memasok kebutuhan janin untuk bertumbuh (pertumbuhan janin memerlukan banyak sekali zat besi), pertumbuhan plasenta dan peningkatan volume darah ibu. Kebutuhan zat besi selama trimester I relatif sedikit yaitu 0,8 mg/hari, kemudian meningkat tajam selama trimester II dan III, yaitu 6,3 mg/hari. Selama kehamilan, wanita hamil mengalami peningkatan plasma darah hingga 30%, sel darah 18%, tetapi Hb hanya bertambah 19%. Akibatnya, frekuensi anemia pada kehamilan cukup tinggi.¹⁸

Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah Hemoglobin (Hb) tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Anemia kehamilan adalah kondisi tubuh dengan kadar hemoglobin dalam darah <11 gr% pada trimester 1 dan 3 atau kadar Hb <10,5 gr% pada trimester 2.⁴ Menurut Irianto (2014) selama kehamilan, wanita hamil mengalami peningkatan plasma darah hingga 30 %, sel darah 18 %, tetapi Hb hanya bertambah 19 %. Akibatnya, frekuensi anemia pada kehamilan cukup tinggi.

b. Etiologi anemia dalam kehamilan

Anemia selama hamil selain karena hemodilusi, banyak hal lain yang menyebabkannya terjadi. Salah satunya yang paling sering adalah anemia gizi. Anemia gizi adalah kondisi dimana kadar hemoglobin yang rendah dari normal sebagai akibat dari kekurangan satu atau lebih gizi penting, terlepas dari penyebab kekurangan tersebut.¹⁹ Anemia gizi banyak disebabkan oleh kekurangan zat besi, folat dan vitamin B12. Namun, anemia karena defisiensi besi merupakan yang paling

banyak terjadi pada ibu hamil baik di negara berkembang maupun negara maju.²⁰

Etiologi anemia defisiensi besi pada kehamilan yaitu gangguan pencernaan dan absorpsi, hipervolemia, menyebabkan terjadinya pengenceran darah, kebutuhan zat besi meningkat, kurangnya zat besi dalam makanan, dan penambahan darah tidak sebanding dengan penambahan plasma.¹⁸

c. Patofisiologi anemia pada ibu hamil

Kehamilan melibatkan berbagai perubahan fisiologis antara lain perubahan fisik, perubahan sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem traktus urinarius, sirkulasi darah serta perubahan fisiologis. Kehamilan pada umumnya berkembang dengan normal, namun kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sulit diprediksi apakah ibu hamil akan bermasalah selama kehamilan ataupun baik-baik saja.²¹

Metabolisme basal naik sebesar 15% sampai 20% dari semula, terutama pada trimester ketiga. Kesimbangan asam basa mengalami penurunan dari 155 mEq per liter menjadi 145mEq per liter disebabkan adanya hemodilusi darah dan kebutuhan mineral yang dibutuhkan janin. Kebutuhan protein perempuan hamil semakin tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, perkembangan organ kehamilan dan persiapan laktasi. Dalam makanan diperlukan protein tinggi sekitar 0,5 gr/kgBB atau sebutir telur ayam sehari. Kebutuhan kalori didapatkan dari karbohidrat, lemak, dan protein. Kebutuhan zat mineral untuk ibu hamil. Berat badan ibu hamil bertambah.²²

d. Faktor-faktor yang memengaruhi anemia ibu hamil

1) Faktor dasar

a) Sosial dan ekonomi

Kondisi lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi ekonomi di suatu daerah dan menentukan pola konsumsi pangan dan gizi yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, kondisi sosial di

pedesaan dan perkotaan memiliki pola konsumsi pangan dan gizi yang berbeda. Kondisi ekonomi seseorang sangat menentukan dalam penyediaan pangan dan kualitas gizi. Apabila tingkat perekonomian seseorang baik maka status gizinya akan baik dan sebaliknya.¹⁸

b) Pengetahuan

Ibu hamil yang memiliki pengetahuan kurang baik berisiko mengalami defisiensi zat besi sehingga tingkat pengetahuan yang kurang tentang defisiensi zat besi akan berpengaruh pada ibu hamil dalam perilaku kesehatan dan berakibat pada kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi dikarenakan ketidaktahuannya dan dapat berakibat anemia.²³

c) Pendidikan

Pendidikan yang baik akan mempermudah untuk mengadopsi pengetahuan tentang kesehatannya. Rendahnya tingkat pendidikan ibu hamil dapat menyebabkan keterbatasan dalam upaya menangani masalah gizi dan kesehatan keluarga.²⁴

d) Budaya

Budaya adalah pola terintegrasi dari perilaku manusia termasuk pikiran, pembicaraan, tindakan, dan artifak serta tergantung pada kapasitas orang untuk menyimak, dan meneruskan pengetahuan kepada generasi.²⁵ Pantangan pada makanan tertentu, sehubungan dengan pangan yang biasanya dipandang pantas untuk dimakan, dijumpai banyak pola pantangan.

2) Faktor tidak langsung

1) Frekuensi Antenatal Care (ANC)

Menurut Departemen Kesehatan RI (2012) Kunjungan ANC oleh ibu hamil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal seperti paritas, usia ibu dan juga faktor eksternal seperti pengetahuan ibu, sikap, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya,

geografis, informasi dan juga dukungan, baik dari dukungan petugas maupun dukungan dari keluarga ibu. Dilihat dari banyaknya faktor yang ada. Pada rancangan penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada faktor pengetahuan, dukungan keluarga, umur dan paritas. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan peneliti dari segi waktu dan juga kemampuan materi dan non materi dalam melakukan penelitian. Ibu yang usianya terlalu tua (>35 tahun) atau terlalu muda (<20 tahun), cenderung lebih patuh memeriksakan kehamilannya karena kemungkinan mempunyai resiko tinggi kehamilan.²⁶

2) Paritas

Paritas ibu merupakan frekuensi ibu pernah melahirkan anak hidup atau mati, tetapi bukan aborsi.²⁴ Semakin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan maka semakin banyak kehilangan zat besi dan semakin menjadi anemia.²⁷

3) Umur ibu

Umur ibu yang ideal dalam kehamilan yaitu pada kelompok umur 20-35 tahun dan pada umur tersebut kurang beresiko komplikasi kehamilan serta memiliki reproduksi yang sehat. Hal ini terkait dengan kondisi biologis dan psikologis dari ibu hamil. Sebaliknya pada kelompok umur < 20 tahun beresiko anemia sebab pada kelompok umur tersebut perkembangan biologis yaitu reproduksi belum optimal. Selain itu kehamilan pada kelompok usia diatas 35 tahun merupakan kehamilan yang beresiko tinggi. Wanita hamil dengan umur diatas 35 tahun juga akan rentan anemia. Hal ini menyebabkan daya tahan tubuh mulai menurun dan mudah terkena berbagai infeksi selama masa kehamilan.²⁷

4) Dukungan suami

Dukungan informasi dan emosional merupakan peran penting suami, dukungan informasi yaitu membantu individu menemukan alternatif yang ada bagi penyelesaian masalah, misalnya menghadapi masalah ketika istri menemui kesulitan selama hamil, suami dapat memberikan informasi berupa saran, petunjuk, pemberian nasihat, mencari informasi lain yang bersumber dari media cetak/elektronik, dan juga tenaga kesehatan; bidan dan dokter. Dukungan emosional adalah kepedulian dan empati yang diberikan oleh orang lain atau suami yang dapat meyakinkan ibu hamil bahwa dirinya diperhatikan.²⁸

3) Faktor langsung

1) Pola konsumsi

Pola konsumsi adalah cara seseorang atau kelompok orang dalam memilih makanan dan memakannya sebagai tanggapan terhadap pengaruh fisiologi, psikologi budaya dan sosial.²⁹ Kejadian anemia sering dihubungkan dengan pola konsumsi yang rendah kandungan zat besinya serta makanan yang dapat memperlancar dan menghambat absorpsi zat besi.³⁰

2) Infeksi

Beberapa infeksi penyakit memperbesar risiko anemia. Infeksi itu umumnya adalah TBC, cacangan dan malaria, karena menyebabkan terjadinya peningkatan penghancuran sel darah merah dan terganggunya eritrosit. Cacangan jarang sekali menyebabkan kematian secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Infeksi cacangan akan menyebabkan malnutrisi dan dapat mengakibatkan anemia defisiensi besi. Infeksi malaria dapat menyebabkan anemia.²⁴

3) Perdarahan

Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan keduanya saling berinteraksi. Perdarahan menyebabkan banyak unsur besi yang hilang sehingga dapat berakibat pada anemia.³⁰

e. Tanda dan gejala anemia defisiensi besi pada ibu hamil

Pada umumnya telah disepakati bahwa tanda-tanda anemia akan jelas apabila kadar hemoglobin (Hb) <7 gr/dl. Gejala anemia dapat berupa kepala pusing, palpitasi, berkunang-kunang, pucat, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan sistem neuromuskular, lesu, lemah, lelah, disphagia, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, gangguan penyembuhan luka, dan pembesaran kelenjar limpa.¹⁸

f. Klasifikasi anemia

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan CDC di Amerika Serikat mengatakan ibu hamil dikatakan memiliki anemia jika kadar hemoglobinnya (Hb) pada trimester pertama dan ketiga kurang dari 11 gr/dL atau hematokritnya (Hct) kurang dari 33 persen. Sementara anemia di trimester kedua terjadi ketika kadar Hb kurang dari 10,5 g/dL atau Hct kurang 32 persen setelah dites 3 sumber³¹. Klasifikasi anemia yaitu:

- 1) Hb normal ibu hamil berada pada angka ≥ 11 gr/dL
- 2) Nilai Hb pada ibu hamil dengan anemia ringan: 10-10,9 gr/dL
- 3) Nilai Hb pada ibu hamil dengan anemia sedang: 7-9,9 gr/dL
- 4) Nilai Hb pada ibu hamil dengan anemia parah: < 7 gr/dL

g. Bahaya anemia pada kehamilan dan janin

1) Bahaya anemia terhadap kehamilan, persalinan dan nifas

Bahaya selama kehamilan dapat terjadi abortus, persalinan prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, ancaman dekompensasi kordis (Hb <6 gr%), mola hidatidosa, hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum,

ketuban pecah dini (KPD). Bahaya saat persalinan yaitu gangguan his (kekuatan mengejan), kala pertama dapat berlangsung lama, dan terjadi partus terlantar, kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, kala uri dapat diikuti retensio plasenta, dan perdarahan post partum karena atonia uteri, kala empat dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri. Pada kala nifas yaitu terjadi subinvolusi uteri menimbulkan perdarahan post partum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang, terjadi Decompensasi Cordis/Kegagalan Jantung cordis mendadak setelah persalinan, anemia kala nifas, mudah terjadi infeksi mammae.

2) Bahaya anemia terhadap janin

Sekalipun tampaknya janin mampu menyerap berbagai kebutuhan dari ibunya, tetapi dengan anemia akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Akibat anemia dapat terjadi gangguan yaitu abortus, kematian intra uterine, persalinan prematuritas tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal, dan inteligensia rendah.³²

h. Pencegahan anemia

Pencegahan anemia pada ibu hamil antara lain:³³

- 1) Perbanyak konsumsi makanan kaya zat besi dan protein, seperti hati, telur, unggas, daging, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau dan buah berwarna merah atau kuning.
- 2) Mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, tomat, mangga dan lain yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi.

Menurut Proverawati (2011), pencegahan anemia kehamilan antara lain mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bernutrisi terutama makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran daun hijau, daging merah, sereal, telur dan kacang tanah), minum vitamin dan kunjungan kehamilan dilakukan pemeriksaan/cek anemia.

3) Minum Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan.

i. Penanganan Anemia pada Ibu Hamil

1) Pemberian TTD bagi ibu hamil:³³

a) Diperlukan untuk memenuhi asupan zat besi, guna mempersiapkan proses kehamilan dan persalinan yang sehat.

b) Untuk mencegah anemia, diberikan minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan.

2) Agar konsumsi TTD dapat lebih efektif untuk mencegah anemia:³³

a) TTD sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual.

b) TTD dikonsumsi bersama makanan atau minuman yang mengandung Vitamin C seperti buah segar, sayuran dan jus buah, agar penyerapan zat besi didalam tubuh lebih baik.

c) Jangan minum TTD bersama teh, kopi, susu, obat sakit maag dan tablet calk, karena akan menghambat penyerapan zat besi.

3. Persalinan

a. Definisi

Persalinan merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu, dimana janin dilahirkan secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.³⁴ Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dikatakan normal jika proses

terjadinya pada kehamilan usia 37-40 minggu tanpa disertai adanya penyulit.³⁵

Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur, progresif, sering dan kuat yang nampaknya tidak saling berhubungan bekerja dalam keharmonisan untuk melahirkan bayi.³⁶

b. Tanda- tanda persalinan

1) Lightening

Menjelang minggu ke-36, pada primigravida terjadi penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul, masuknya kepala bayi ke pintu atas panggul di rasakan ibu hamil terasa ringan di bagian atas, rasa sesaknya berkurang, di bagian bawah terasa sesak, terjadi kesulitan saat berjalan, dan sering miksi. Pada multipara kepala janin baru masuk pintu atas panggul menjelang persalinan.³⁷

2) His Persalinan

Sifat his persalinan meliputi pinggang terasa sakit yang menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval makin pendek, kekuatan makin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks, makin beraktivitas, kekuatan makin bertambah.³⁷

3) Pengeluaran Lendir dan Darah

Terjadinya his persalinan mengakibatkan perubahan pada serviks yang menyebabkan pendataran dan pembukaan, pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis lepas, dan terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah.³⁷

4) Pengeluaran Cairan Ketuban

Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap, dengan pecahnya ketuban diharapkan persalinan berlangsung dalam waktu 24 jam.³⁷

c. Tahapan persalinan

1) Kala I

Kala I atau kala pembukaan berlangsung dari pembukaan (0 cm) sampai pembukaan lengkap (10 cm). Kala I untuk primigravida berlangsung 12 jam, sedangkan multigravida sekitar 8 jam. Kala I (pembukaan) dibagi menjadi dua fase, yakni:³⁸

a) Fase Laten

- (1) Pembukaan serviks berlangsung lambat
- (2) Pembukaan 0 sampai pembukaan 3 cm
- (3) Berlangsung dalam 7-8 jam

b) Fase Aktif

Berlangsung selama 6 jam dan di bagi atas 3 fase, yaitu:³⁸

- (1) Periode akselerasi, yakni berlangsung selama 2 jam pembukaan menjadi 4 cm.
- (2) Periode dilatasi maksimal, berlangsung selama 2 jam pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
- (3) Periode deselerasi, berlangsung lambat dalam waktu 2 jam pembukaan menjadi 10 cm atau lengkap.

Pada kala ini kita akan melakukan pemantauan persalinan dengan menggunakan partograf. Partograf adalah alat untuk mencatat informasi berdasarkan observasi anamnesis, dan pemeriksaan fisik ibu dalam persalinan, dan sangat penting khususnya untuk membuat keputusan klinik selama kala I persalinan. Tujuan utama penggunaan partograf adalah mengamati dan mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam dan menentukan normal atau tidaknya

persalinan serta mendeteksi dini persalinan lama sehingga bidan dapat membuat deteksi dini mengenai kemungkinan persalinan lama.³⁸

2) Kala II

Kala II ini memiliki ciri khas, yaitu:³⁶

- a) His terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira-kira 2-3 menit sekali
- b) Kepala janin telah turun masuk ruang panggul dan secara reflektoris menimbulkan rasa ingin mengejan
- c) Tekanan pada rektum, ibu merasa ingin BAB
- d) Anus membuka
- e) Lama pada kala II ini pada primipara dan multipara berbeda yaitu :
 - (1) Primipara kala II berlangsung 1,5 jam-2 jam
 - (2) Multipara kala II berlangsung 0,5 jam-1 jam.

3) Kala III

Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dan fundus uteri sedikit di atas pusat. Beberapa saat kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta akan lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar secara spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri.³⁷

a) Fisiologi Kala III

Terbagi dalam dua tahap pada kelahiran plasenta, yaitu terlepasnya plasenta dari implantasinya pada dinding uterus dan pengeluaran plasenta dari dalam kavum uteri. Setelah bayi lahir, uterus masih mengadakan kontraksi yang mengakibatkan penciutan permukaan kavum uteri tempat implantasi plasenta. Oleh karena tempat implantasi plasenta menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta akan menekuk, menebal, kemudian dilepaskan dari dinding uterus.

Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau bagian atas vagina.³⁷

- b) Tanda-tanda lepasnya plasenta
 - (1) Perubahan bentuk dan tinggi fundus
 - (2) Tali pusat memanjang
 - (3) Semburan darah tiba-tiba.³⁷
 - c) Manajemen aktif kala III
 - (1) Pemberian suntikan oksitosin
 - (2) Melakukan peregangan tali pusat terkendali
 - (3) Pemijatan atau masase fundus uteri.³⁷
- 4) Kala IV
- a) Fisiologi kala IV

Kala IV dimulai sejak plasenta lahir sampai dengan dua jam sesudahnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada kala IV adalah kontraksi uterus sampai uterus kembali ke bentuk normal. Uterus dapat dirangsang untuk berkontraksi dengan baik dan kuat melalui massase atau rangsang taktil, kelahiran plasenta yang lengkap perlu juga dipastikan untuk menjamin tidak terjadi perdarahan lanjut.³⁸
 - b) Pemantauan dan Evaluasi Lanjut³⁸
 - (1) Keadaan umum ibu: tensi, nadi, pernapasan, dan rasa sakit
 - (a) Periksa Setiap 15 menit pada jam pertama setelah persalinan dan setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan jika kondisi itu tidak stabil pantau lebih sering.
 - (b) Apakah ibu membutuhkan minum
 - (c) Apakah ibu akan memegang bayinya
 - (2) Kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri

Rasakan apakah fundus uteri berkontraksi kuat dan berada dibawah umbilicus.

- (a) Periksa fundus 2-3 kali dalam 10 menit pertama.
- (b) Setiap 15 menit pada jam pertama setelah persalinan
- (c) Setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan
- (d) Masase fundus (jika perlu) untuk menimbulkan kontraksi

(3) Perdarahan

Perdarahan: ada/tidak, banyak/biasa

(4) Kandung Kemih

Kandung kemih harus terus dalam keadaan kosong, karena kandung kemih yang penuh dapat menghalangi kontraksi maksimal sehingga perdarahan dapat terjadi. Pemantauan kontraksi selama satu jam pertama dilakukan empat kali dalam 15 menit, dan dua kali selama 30 detik pada jam kedua.

(5) Luka-luka: jahitannya baik/tidak, ada perdarahan/tidak

Evaluasi laserasi dan perdarahan aktif pada perineum dan vagina. Nilai perluasan laserasi perineum. Derajat laserasi perineum terbagi atas:³⁹

(a) Derajat I

Meliputi mukosa vagina, fourchette posterior dan kulit perineum. Pada derajat I ini tidak perlu dilakukan penjahitan, kecuali jika terjadi perdarahan.

(b) Derajat II

Meliputi mukosa vagina, fourchette posterior, kulit perineum dan otot perineum. Pada derajat II dilakukan penjahitan dengan teknik jelujur.

(c) Derajat III

Meliputi mukosa vagina, fourchette posterior, kulit perineum, otot perineum dan otot spingter ani external.

(d) Derajat IV

Derajat III ditambah dinding rectum anterior. Pada derajat III dan IV segera lakukan rujukan karena laserasi ini memerlukan teknik dan prosedur khusus.

(6) Uri dan selaput ketuban harus lengkap

(7) Bayi dalam keadaan baik.

d. Mekanisme persalinan normal

1) Penurunan Kepala

Pada primipara kepala janin turun ke rongga panggul/masuk ke PAP pada akhir minggu 36 kehamilan, sedangkan pada multipara terjadi saat mulainya persalinan. Penurunan kepala janin terjadi selama persalinan karena daya dorong dari kontraksi dan posisi serta peneranan (selama kala dua) oleh ibu. Fiksasi (engagement) ialah tahap penurunan pada waktu diameter biparietal dari kepala janin telah masuk panggul ibu.³⁷

Sinklitismus adalah bila arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP (sutura sagitalis berada di tengah-tengah jalan lahir atau PAP). Asinklitismus adalah bila arah sumbu kepala janin miring dengan bidang PAP (sutura sagitalis mendekati promontorium atau simfisis pubis).³⁷

2) Fleksi

Semakin turun ke rongga panggul, kepala janin semakin fleksi, sehingga mencapai fleksi maksimal (biasanya di Hodge III) dengan ukuran diameter kepala janin yang terkecil, yaitu diameter suboksipito bregmatika (9,5 cm). Melalui fleksi ini, diameter terkecil dari kepala janin dapat masuk ke dalam panggul dan terus menuju dasar panggul.³⁷

3) Putaran paksi dalam

Putaran paksi dalam adalah pemutaran ubun-ubun kecil (UUK) dari bagian depan yang menyebabkan bagian terendah dari bagian

depan janin memutar ke arah depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang, kepala bagian terendah adalah daerah ubun-ubun kecil dan bagian tersebut akan memutar ke depan, ke arah simfisis. Rotasi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan, karena rotasi dalam merupakan usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir.³⁸

4) Ekstensi

Sesudah kepala janin sampai didasar panggul dan UUK berada di bawah simfisis sebagai hipomoklion, kepala mengadakan gerakan defleksi atau ekstensi untuk dapat dilahirkan, maka lahirlah berturut-turut UUB, dahi, muka, dan dagu.³⁷

5) Putaran paksi luar

Kepala yang telah lahir selanjutnya mengalami putaran paksi luar, yaitu kepala bayi memutar kembali ke arah punggungnya untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Bahu melintasi pintu dalam keadaan miring dan akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilaluinya di dalam rongga panggul. Dengan demikian, setelah kepala bayi lahir, bahu mengalami putaran paksi dalam di dasar panggul dan ukuran bahu menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul.³⁸

6) Ekspulsi

Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion untuk kelahiran bahu belakang. Setelah kedua bahu bayi lahir, selanjutnya seluruh badan bayi dilahirkan searah dengan sumbu jalan lahir.³⁸

e. Faktor yang mempengaruhi persalinan³⁹

- 1) Passage/jalan lahir/panggul ibu
- 2) Power/kekuatan: his dan tenaga mengejan
- 3) Passanger/buah kehamilan: janin, plasenta dan air ketuban

- 4) Psikologis
- 5) Penolong (kesiapan dari penolong persalinan).

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan karena ketidaksesuaian yang satu akan berdampak terhadap yang lain, terlebih bagi penolong persalinan harus memperhatikan ke lima faktor tersebut, agar persalinan dapat terjadi sesuai yang diharapkan, berjalan dengan lancar. tanpa ada komplikasi.

f. Kebutuhan Dasar Ibu Bersalin

1) Dukungan fisik dan psikologis

Ada lima kebutuhan dasar bagi wanita dalam persalinan menurut Lesse dan Keane ialah.³⁶

- a) Asuhan fisik dan psikologis
- b) Kehadiran seorang pendamping secara terus menerus
- c) Pengurangan rasa sakit
- d) Penerimaan atas sikap dan perilakunya
- e) Informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman.

2) Kebutuhan makanan dan cairan

Makanan padat tidak boleh diberikan selama persalinan aktif, oleh karena makan padat lebih lama tinggal dalam lambung dari pada makanan cair, sehingga proses pencernaan lebih lambat selama persalinan. Pasien dapat diberikan banyak minum segar (jus buah, sup) selama persalinan.

3) Kebutuhan Eliminasi

Kandung kemih harus dikosongkan setiap 2 jam selama proses persalinan, bila pasien mengatakan ingin BAB bidan harus memastikan kemungkinan adanya tanda dan gejala masuk pada kala II.

4) Posisi dalam persalinan

Beberapa posisi dalam bersalin:⁴⁰

a) Posisi berbaring miring



Gambar 2.2 Posisi Berbaring Miring

Keuntungan posisi berbaring miring yaitu kontraksi uterus lebih efektif, memudahkan bidan dalam memberikan pertolongan persalinan, karena tidak terlalu menekan, proses pembukaan akan berlangsung secara perlahan-lahan sehingga persalinan berlangsung lebih nyaman. Sedangkan kerugian posisi ini adalah memerlukan bantuan untuk memegangi paha kanan ibu.

b) Jongkok



Gambar 2.3 Posisi Jongkok dan Berdiri

Keuntungan dari posisi jongkok dalam persalinan yakni memperluas rongga panggul, diameter transversa bertambah 1 cm dan diameter anteroposterior bertambah 2 cm. Proses persalinan lebih mudah, serta mengurangi trauma pada perineum. Sedangkan kerugian dari posisi ini yakni memungkinkan timbul cedera pada kepala bayi, karena tubuh

bayi yang berada di jalan lahir bisa meluncur dengan cepat. Untuk menghindari cedera, biasanya ibu berjongkok di atas bantal empuk yang berguna menahan kepala.

c) Posisi merangkak



Gambar 2.4 Posisi Merangkak

Keuntungan dari posisi merangkak yakni posisi paling baik bagi ibu yang mengalami nyeri punggung saat persalinan, mengurangi rasa sakit serta mengurangi keluhan hemoroid.

d) Duduk/setengah duduk



Gambar 2.5 Posisi Duduk

Keuntungan posisi ini yakni memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu turunnya bayi, memberi kesempatan untuk istirahat di antara dua kontraksi, serta memudahkan melahirkan kepala bayi.

e) Mengapa tidak boleh melahirkan dalam posisi terlentang atau lithotomi:

- (1) Dapat menyebabkan Sindrome supine hypotensi karena tekanan pada vena kava inferior oleh kavum uteri, yang mengakibatkan ibu pingsan dan hilangnya oksigen bagi bayi
- (2) Dapat menambah rasa sakit
- (3) Bisa memperlama proses persalinan

- (4) Lebih sulit bagi ibu untuk melakukan pernafasan
- (5) Membuat buang air lebih sulit
- (6) Membatasi pergerakan ibu
- (7) Bisa membuat ibu merasa tidak berdaya
- (8) Bisa membuat proses meneran menjadi lebih sulit
- (9) Bisa menambah kemungkinan terjadinya laserasi pada perineum dan bisa menimbulkan kerusakan syaraf pada kaki dan punggung.

5) Pengurangan rasa nyeri

Pendekatan-pendekatan untuk mengurangi rasa sakit, menurut Varney's Midwifery:³⁶

- a) Adanya seseorang yang dapat mendukung dalam persalinan
- b) Pengaturan posisi
- c) Relaksasi dan latihan pernafasan
- d) Istirahat dan privasi
- e) Penjelasan mengenai proses atau kemajuan atau prosedur yang akan dilakukan
- f) Asuhan diri
- g) Sentuhan dan masase
- h) Counterpressure untuk mengurangi tegangan pada ligament sacroiliaca
- i) Pijatan ganda pada pinggul
- j) Penekanan pada lutut
- k) Kompres hangat dan kompres dingin
- l) Berendam
- m) Pengeluaran suara
- n) Visualisasi dan pemusatan perhatian
- o) Musik

2. Nifas

a. Definisi

Masa nifas (puerperium) dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Puerperium yaitu dari kata Puer yang artinya bayi dan Porous melahirkan. Jadi, puerperium berarti masa setelah melahirkan bayi yaitu masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil. Sekitar 50 % kematian ibu terjadi dalam 24 jam pertama postpartum sehingga pelayanan pasca persalinan yang berkualitas harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi.⁴¹

b. Fisiologi masa nifas

1) Perubahan sistem reproduksi

Perubahan alat-alat genital baik interna maupun eksterna kembali seperti semula seperti sebelum hamil disebut involusi. Meskipun istilah involusi telah digunakan untuk menunjukkan perubahan retrogesif yang terjadi di semua organ dan struktur saluran reproduksi, istilah ini lebih spesifik menunjukkan adanya perubahan retrogesif pada uterus yang menyebabkan berkurangnya ukuran uterus. Demi kejelasan, definisi involusi puerperium dibatasi pada uterus dan apa yang terjadi pada organ dan struktur lain hanya dianggap sebagai perubahan puerperium.⁴²

Bidan dapat membantu ibu untuk mengatasi dan memahami perubahan-perubahan seperti:⁴²

a) Involusi uterus

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Walaupun istilah

involusi saat ini telah digunakan untuk menunjukkan kemunduran yang terjadi pada setiap organ dan saluran reproduktif, kadang lebih banyak mengarah secara spesifik pada kemunduran uterus yang mengarah ke ukurannya. (*Varney's midwifery*). Dalam masa nifas alat-alat genitalia interna maupun eksterna akan berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan alat-alat genitalia ini dalam keseluruhannya disebut involusi. Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil.

Tabel 2.1 Perubahan-Perubahan Normal pada Uterus selama Postpartum

<i>Involusi uteri</i>	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus
Plasenta lahir	Setinggi pusat	100 gram	12,5 cm
7 hari	Pertengahan pusat dan simpisis	500 gram	7,5 cm
14 hari	Tidak teraba	350 gram	5 cm
6 minggu	Normal	60 gram	2,5 cm

Involusi uterus meliputi reorganisasi dan pengeluaran desidua/endometrium dan eksfoliasi tempat perlekatan plasenta yang ditandai dengan penurunan ukuran dan berat serta perubahan pada lokasi uterus juga ditandai dengan warna dan jumlah lochea. Banyaknya *lochea* dan kecepatan involusi tidak dipengaruhi oleh pemberian rangkaian preparat ergot (*Ergotrate, Methergine*), yang hanya mempunyai efek jangka pendek. Akan tetapi, menyusui akan mempercepat proses involusi. Desidua yang tersisa didalam uterus setelah pelepasan

dan ekspulsi plasenta dan *membrane* terdiri dari lapisan zona basalis dan bagian lapisan zona spongiosa desidua basalis (pada tempat perlengkapan plasenta) dan desidua parietalis (melapisi bagian uterus, yang lain uterus).

b) Involusi tempat plasenta

Uterus pada bekas implantasi plasenta merupakan luka yang kasar dan menonjol ke dalam kavum uteri. Segera setelah plasenta lahir, dengan cepat luka mengecil, pada akhir minggu ke -2 hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir nifas 1-2 cm.

c) Perubahan ligamen

Ligament-ligament dan diafragma pelvis serta fasia yang meregang sewaktu kehamilan dan partus, setelah janin lahir berangur-angsur menciut kembali seperti sediakala. Tidak jarang *ligamentum rotundum* menjadi kendur yang mengakibatkan letak uterus menjadi retroflexi. Tidak jarang pula wanita mengeluh “kandungannya turun” setelah melahirkan oleh karena ligamen, fasia, jaringan penunjang genitalia menjadi agak kendur.

d) Perubahan serviks

Segera setelah melahirkan, serviks menjadi lembek, kendur, terkulai dan berbentuk seperti corong. Hal ini disebabkan korpus uteri berkontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi, sehingga perbatasan antara korpus dan serviks uteri berbentuk cincin. Warna serviks merah kehitam-hitaman karena penuh pembuluh darah. Segera setelah bayi dilahirkan, tangan pemeriksa masih dapat dimasukan 2-3 jari dan setelah 1 minggu hanya 1 jari saja yang dapat masuk.

e) Lochea

Lochea mempunyai bau yang amis (anyir) meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya berbeda-beda pada

setiap wanita. *Lochea* mengalami perubahan karena proses involusi. Karena perubahan warnanya, nama deskriptif *lochea* berubah menjadi *lochea rubra*, *serosa*, atau *alba*.

(1) *Lochea rubra* berwarna merah karena mengandung darah.

Ini adalah *lochea* pertama yang mulai keluar segera setelah kelahiran dan terus berlanjut selama dua hingga tiga hari pertama pascapartum. *Lochea rubra* terutama mengandung darah dan jaringan desidua.

(2) *Lochea serosa* mulai terjadi sebagai bentuk yang lebih pucat dari *lochea rubra*, *serosa* dan merah muda. *Lochea* ini berhenti sekitar tujuh hingga delapan hari. Kemudian dengan warna merah muda, kuning atau putih hingga transisi menjadi *lochea alba*. *Lochea serosa* terutama mengandung cairan serosa, jaringan desidua, leukosit dan eritrosit.

(3) *Lochea alba* mulai terjadi sekitar hari kesepuluh pascapartum dan hilang sekitar periode dua hingga empat minggu. Pada beberapa wanita, *lochea* ini tetap ada pada saat pemeriksaan pascapartum. Warna *lochea alba* putih krem dan terutama mengandung leukosit dan sel desidua.

2) Perubahan vulva, vagina, dan perineum

Segera setelah kelahiran, vagina tetap terbuka lebar, mungkin mengalami beberapa derajat edema dan memar, dan celah pada introitus. Setelah satu hingga dua hari pertama pascapartum, tonus otot vagina kembali, celah vagina tidak lebar dan vagina tidak lagi edema. Selama proses persalinan vulva dan vagina mengalami tekanan serta peregangan, setelah beberapa hari persalinan kedua organ ini kembali dalam keadaan kendur. *Rugae* timbul kembali pada minggu ketiga. Himen tampak sebagai tonjolan kecil dan dalam proses pembentukan berubah menjadi

karankulaemitiformis yang khas bagi wanita multipara. Ukuran vagina akan selalu lebih besar dibandingkan keadaan saat sebelum persalinan pertama.⁴³

c. Adaptasi psikologi pada masa nifas

Periode masa nifas merupakan waktu dimana ibu mengalami stress pascapersalinan, terutama pada ibu primipara. Hal – hal yang dapat membantu ibu dalam pada masa nifas adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Fungsi yang memengaruhi untuk sukses dan lancarnya masa transisi menjadi orang tua.
- 2) Respons dan dukungan dari keluarga dan teman dekat.
- 3) Riwayat pengalaman hamil dan melahirkan sebelumnya.
- 4) Harapan, keinginan, dan aspirasi ibu saat hamil juga melahirkan.

Periode ini diekspresikan oleh reva rubin yang terjadi pada tiga tahap berikut ini:⁴⁴

a) *Taking in period*

Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat bergantung pada orang lain, focus perhatian terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, serta kebutuha tidur dan nafsu makan meningkat.

b) *Taking hold period*

Berlangsung 3-4 hari postpartum, ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Pada masa ini ibu menjadi sangat sensitif, sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat untuk mengatasi kritikan yang dialami ibu.

c) *Letting go period*

Dialami setelah ibu dan bayi tiba dirumah. Ibu mulai secara penuh menerima tanggung jawab sebagai “seorang ibu” dan

menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya.

d. Kebutuhan ibu nifas ⁴⁵

1) Nutrisi dan cairan

Pada masa nifas masalah diet perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Diet yang diberikan harus bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein, dan banyak mengandung cairan. Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut:

- a) Mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari.
- b) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup.
- c) Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari.
- d) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, setidaknya selama 40 hari pascapersalinan.
- e) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

2) Ambulasi

Ambulasi dini (*early ambulation*) ialah kebijaksanaan agar secepat mungkin bidan membimbing ibu postpartum bangun dari tempat tidurnya dan membimbing ibu secepat mungkin untuk berjalan. Sekarang tidak perlu lagi menahan ibu postpartum telentang ditempat tidurnya selama 7-14 hari setelah melahirkan. Ibu postpartum sudah diperbolehkan bangun dari tempat tidur selama 24-48 jam postpartum. Keuntungan *early ambulation* adalah sebagai berikut:

- a) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan *early ambulation*.
- b) Faal usus dan kandung kemih lebih baik.

c) *Early ambulation* memungkinkan kita mengajarkan ibu cara merawat anaknya selama ibu masih dirumah sakit. Misalnya memandikan, mengganti pakaian, dan memberi makan. Lebih sesuai dengan keadaan Indonesia (sosial ekonomis). Menurut penelitian-penelitian yang ada, *early ambulation* tidak mempunyai pengaruh yang buruk, tidak menyebabkan perdarahan yang abnormal, tidak mempengaruhi penyembuhan luka episiotomi atau luka di perut, serta tidak memperbesar kemungkinan *prolapsus* atau *retrotexto uteri*.

3) Eliminasi

a) Buang Air Kecil

Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. Jika dalam 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi, kalau ternyata kandung kemih penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi. Berikut ini sebab-sebab terjadinya kesulitan berkemih (*retensio urine*) pada ibu postpartum:

- (1) Berkurangnya tekanan intraabnormal.
- (2) Otot-otot perut masih lemah.
- (3) Edema dan uretra.
- (4) Dinding kadung kemih kurang sensitif.

b) Buang Air Besar

Ibu postpartum diharapkan dapat buang air besar (defekasi) setelah hari kedua postpartum. Jika hari ketiga belum juga BAB, maka perlu diberi obat pencahar per oral atau per rektal. Jika setelah pemberian obat pencahar masih belum bisa BAB, maka dilakukan klisma (enema).

4) *Personal Hygiene*

Pada masa postpartum, seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi. Oleh itu, kebersihan diri sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sangat penting untuk tetap dijaga. Kebutuhan personal hygiene mencakup perawatan perineum dan perawatan payudara.⁴⁴

a) Perawatan perineum

Setelah buang air besar ataupun buang air kecil, perineum dibersihkan secara rutin. Caranya adalah dibersihkan dengan sabun yang lembut minimal sekali sehari. Membersihkan dimulai dari arah depan ke belakang sehingga tidak terjadi infeksi. Ibu postpartum harus mendapatkan edukasi tentang hal ini. Ibu diberitahu cara mengganti pembalut yaitu bagian dalam jangan sampai terkontaminasi oleh tangan. Pembalut yang sudah kotor diganti paling sedikit 4 kali sehari. Ibu diberitahu tentang jumlah, warna, dan bau lochea sehingga apabila ada kelainan dapat diketahui secara dini. Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Apabila ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka.⁴⁴

b) Perawatan payudara

Menjaga payudara tetap bersih dan kering dengan menggunakan BH yang menyokong payudara. Apabila puting susu lecet oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap selesai menyusui. Menyusui tetap dilakukan dimulai dari puting susu yang tidak lecet agar ketika bayi dengan daya hisap paling kuat dimulai dari puting susu yang tidak lecet. Apabila puting lecet sudah pada tahap berat dapat diistirahatkan selama 24 jam, ASI dikeluarkan dan diminumkan

dengan menggunakan sendok. Untuk menghilangkan nyeri ibu dapat diberikan paracetamol 1 tablet 500 mg setiap 4-6 jam sehari.⁴⁴

5) Istirahat dan Tidur

Hal-hal yang bisa dilakukan pada ibu untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur adalah sebagai berikut:

- a) Anjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan.
- b) Sarankan ibu untuk kembali pada kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur.

Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal:

- a) Mengurangi jumlah ASI yang diproduksi.
- b) Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan.
- c) Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri.

6) Aktivitas Seksual

Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu masa nifas harus memenuhi syarat berikut ini:

- a) Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu-satu dua jarinya kedalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapan saja ibu siap.
- b) Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai masa waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Keputusan ini bergantung pada pasangan yang bersangkutan.

7) Latihan dan Senam Nifas

Setelah persalinan terjadi involusi pada hampir seluruh organ tubuh wanita. Involusi ini sangat jelas terlihat pada alat-alat kandungan. Sebagai akibat kehamilan dinding perut menjadi lembek dan lemas disertai adanya striae gravidarum yang membuat keindahan tubuh akan sangat terganggu. Oleh karena itu, mereka akan selalu berusaha untuk memulihkan dan mengencangkan keadaan dinding perut yang sudah tidak indah lagi. Cara untuk mengembalikan bentuk tubuh menjadi indah dan langsing seperti semula adalah dengan melakukan latihan dan senam nifas.

8) Pendidikan Kesehatan pada Orang Tua tentang Postpartum

Kebutuhan dukungan sosial, emosional, dan psikologis orang tua merupakan aspek yang penting untuk keberhasilan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui, sehingga terhindar adanya penyulit dan komplikasi. Setiap ibu atau orang tua memiliki kebutuhan yang berbeda. Persiapan menjadi orang tua sudah harus dipersiapkan sejak kehamilan, bisa dilakukan melalui edukasi pada Kelas Ibu hamil. Kontinuitas asuhan dan pemberi asuhan (provider bidan) serta hubungan positif antara ibu serta keluarga dengan bidan akan memungkinkan orang tua untuk mengekspresikan kekhawatirannya, kecemasannya, serta ketidaktahuannya tentang asuhan postpartum, sehingga asuhan menjadi efektif. Setiap pertemuan bidan dengan orang tua baru merupakan kesempatan untuk memberi pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, edukasi orang tua dapat lebih efektif mengatasi permasalahan-permasalahan postpartum atau memenuhi kebutuhan orang tua.⁴⁴

e. Jadwal kunjungan masa nifas⁴⁶

1) Kunjungan Pertama (6 – 8 jam Pasca Persalinan)

a) Mencegah perdarahan masa nifas, karena atonia uteri

- b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, serta merujuk jika perdarahan berlanjut.
 - c) Memberi konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga cara mencegah perdarahan masa nifas akibat atonia uteri.
 - d) Pemberian ASI awal
 - e) Melakukan bonding attachment
 - f) Menjaga bayi tetap sehat, cegah hipotermia.
 - g) Petugas kesehatan yang menolong persalinan harus mendampingi ibu dan BBL 2 jam pertama pascapartum atau sampai keadaan ibu dan bayinya stabil
- 2) Kedua (6 hari Pasca – Persalinan)
- a) Memastikan involusi uterus berjalan
 - b) Menilai adanya tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal
 - c) Memastikan ibu dapat makan, minum, dan cukup istirahat.
 - d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda penyulit
 - e) Memberi konseling mengenai asuhan bayi, perawatan tali pusat dan perawatan sehari-hari
- 3) Ketiga (2 minggu post partum) Sama dengan kunjungan kedua
- 4) Keempat (6 minggu Pasca-Persalinan)
- a) Menanyakan penyulit yang dialami
 - b) Memberi Konseling KB secara dini.
- f. Tanda-tanda bahaya nifas

Tanda-tanda bahaya postpartum adalah suatu tanda yang abnormal yang mengindikasikan adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas, apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Tanda-tanda bahaya postpartum sebagai berikut:⁴⁴

1) Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a) Perdarahan postpartum primer (*Early Postpartum Hemorrhage*) adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir, atau perdarahan dengan volume seberapa pun tetapi terjadi perubahan keadaan umum ibu dan tanda-tanda vital sudah menunjukkan analisa adanya perdarahan. Penyebab utama adalah atonia uteri, retensio placenta, sisa placenta dan robekan jalan lahir. Terbanyak dalam 2 jam pertama.
 - b) Perdarahan postpartum sekunder (*Late Postpartum Hemorrhage*) adalah perdarahan dengan konsep pengertian yang sama seperti perdarahan postpartum primer namun terjadi setelah 24 jam postpartum hingga masa nifas selesai. Perdarahan postpartum sekunder yang terjadi setelah 24 jam, biasanya terjadi antara hari ke 5 sampai 15 postpartum. Penyebab utama adalah robekan jalan lahir dan sisa placenta.
- 2) Infeksi pada masa postpartum
- Gejala umum infeksi berupa suhu badan panas, malaise, denyut nadi cepat. Gejala lokal dapat berupa uterus lembek, kemerahan dan rasa nyeri pada payudara atau adanya disuria.
- 3) Lochea yang berbau busuk (bau dari vagina)
- Apabila pengeluaran lochea lebih lama dari pada yang disebutkan di atas kemungkinan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a) Tertinggalnya placenta atau selaput janin karena kontraksi uterus yang kurang baik.
 - b) Ibu yang tidak menyusui anaknya, pengeluaran lochea rubra lebih banyak karena kontraksi uterus dengan cepat.
 - c) Infeksi jalan lahir, membuat kontraksi uterus kurang baik sehingga lebih lama mengeluarkan lochea dan lochea berbau anyir atau amis.

- d) Bila lochea bernanah dan berbau busuk, disertai nyeri perut bagian bawah kemungkinan analisa diagnosisnya adalah metritis. Bila pengobatan terlambat atau kurang adekuat dapat menjadi abses pelvik, peritonitis, syok septik.
- 4) Sub involusi uterus (pencegilan uterus yang terganggu)
Involusi adalah keadaan uterus mengecil oleh kontraksi rahim dimana berat rahim dari 1000 gram saat setelah bersalin, menjadi 40-60 mg pada 6 minggu kemudian. Bila pengecilan ini kurang baik atau terganggu di sebut sub involusi. Faktor penyebab sub involusi, antara lain: sisa plasenta dalam uterus, endometritis, adanya mioma uteri.
- 5) Nyeri pada perut dan pelvis
- 6) Pusing dan lemas yang berlebihan, sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan kabur
- 7) Suhu tubuh ibu $> 38^{\circ}\text{C}$
- 8) Payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit
Keadaan ini dapat disebabkan oleh payudara yang tidak disusu secara adekuat, puting susu yang lecet, BH yang terlalu ketat, ibu dengan diet yang kurang baik, kurang istirahat, serta anemia. Keadaan ini juga dapat merupakan tanda dan gejala adanya komplikasi dan penyulit pada proses laktasi, misalnya pembengkakan payudara, bendungan ASI, mastitis dan abses payudara.
- 9) Rasa sakit, merah, lunak dan pembengkakan di wajah maupun ekstremitas
Selama masa nifas dapat terbentuk thrombus sementara pada vena-vena di pelvis maupun tungkai yang mengalami dilatasi. Keadaan ini secara klinis dapat menyebabkan peradangan pada vena-vena pelvis maupun tungkai yang disebut tromboplebitis pelvica (pada panggul) dan tromboplebitis femoralis (pada tungkai).

Pembengkakan ini juga dapat terjadi karena keadaan edema yang merupakan tanda klinis adanya preeklampsia/eklampsia.

10) Demam, muntah, dan rasa sakit waktu berkemih.

3. Bayi Baru Lahir

a. Definisi bayi baru lahir (neonatus)

- 1) Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ektrauterin) dan toleransi bagi BBL untuk dapat hidup dengan baik.⁴⁷
- 2) Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru dilahirkan pada kehamilan cukup bulan (dari kehamilan 37-42 minggu) dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram dan tanpa tanda-tanda asfiksia dan penyakit penyerta lainnya.⁴⁸
- 3) Neonatus adalah individu yang baru saja mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan ektrauterine.⁴⁹

b. Masa neonatal

Masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran.⁴⁷

- 1) Neonatus adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan usia 1 bulan sesudah lahir.
- 2) Neonatus dini: usia 0-7 hari.
- 3) Neonatus lanjut: usia 8-28 hari.

c. Ciri-ciri bayi baru lahir

- 1) Berat badan : 2500-4000 gram.
- 2) Panjang badan : 48-52 cm.
- 3) Lingkar kepala : 33-35 cm.
- 4) Lingkar dada : 30-38 cm.
- 5) Frekuensi jantung : 120-160 x/menit.

- 6) Pernafasan : 40-60 x/menit.
 - 7) Kulit berwarna kemerahan dan licin karena jaringan subkutan cukup.
 - 8) Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya sudah sempurna.
 - 9) Kuku agak panjang dan lemas.
 - 10) Genetalia : Perempuan labia mayora telah menutupi labia minora, jika laki-laki testis telah turun, skrotum sudah ada.
 - 11) Refleks hisap dan menelan telah terbentuk dengan baik.
 - 12) Refleks moro atau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik.
 - 13) Refleks grasps atau menggenggam sudah baik.
 - 14) Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan.⁴⁷
- d. Kebutuhan nutrisi bayi usia 0-6 bulan

Nutrisi bayi yang berusia 0-6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja (ASI Eksklusif). Hal-hal perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi usia 0-6 bulan adalah sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan (kolostrum)
- 2) Jangan beri makanan/minuman selain ASI
- 3) Susui bayi sesering mungkin
- 4) Susui setiap bayi menginginkan, paling sedikit 8 kali sehari
- 5) Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui.
- 6) Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian
- 7) Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya
- 8) Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman dan penuh perhatian
- 9) Dukungan suami dan keluarga penting dalam keberhasilan ASI Eksklusif

e. ASI eksklusif

Air Susu Ibu adalah makanan terbaik dan sempurna untuk bayi, karena mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi berumur 6 bulan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi UNICEF dan World Health Assembly (WHA) yang menyarankan pemberian ASI Eksklusif hanya memberikan ASI saja tanpa tambahan pemberian cairan (seperti : air putih, madu, susu formula, dan sebagainya) atau makanan lainnya (seperti : buah, biskuit, bubur susu, bubur nasi, tim, dan sebagainya).⁵⁰

1) Manfaat ASI

Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari pemberian ASI yaitu komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi, mengandung zat protektif, tidak menimbulkan alergi, mempunyai efek psikologis yang menguntungkan, mengupayakan pertumbuhan yang baik, mencegah perdarahan pasca persalinan, mempercepat pengecilan kandungan, mengurangi anemia, dapat digunakan sebagai metode KB sementara, mengurangi risiko kanker indung telur dan kanker payudara, memberikan rasa dibutuhkan, ASI tidak perlu dibeli, sehingga dana yang diperlukan untuk membeli susu formula dapat digunakan untuk keperluan lain.⁵⁰

2) Lama pemberian ASI (menyusui)

Pada hari-hari pertama, biasanya ASI belum keluar, bayi cukup disusukan selama 4-5 menit, untuk merangsang produksi ASI dan membiasakan puting susu diisap oleh bayi. Setelah hari ke 4-5 boleh disusukan selama 10 menit. Setelah produksi ASI cukup, bayi dapat disusukan selama 15 menit. Menyusukan selama 15 menit ini jika produksi ASI cukup dan ASI lancer keluaranya, sudah

cukup untuk bayi. Dikatakan bahwa, jumlah ASI yang terisap bayi pada 5 menit pertama adalah ± 112 ml, 5 menit kedua ± 64 ml, dan 5 menit terakhir hanya ± 16 ml.⁵⁰

3) Frekuensi menyusui

Sebaiknya bayi disusui secara nir-jadwal (on demand), karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis bukan sebab lain (kencing, kepanasan/kedinginan, atau sekedar ingin didekap) atau ibu sudah merasa perlu menyusui bayinya. Bayi yang sehat, ASI dalam lambungnya akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada awalnya bayi akan menyusui dengan jadwal yang tidak teratur, dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kemudian. Dengan menyusui nir-jadwal, sesuai kebutuhan bayi, akan mencegah timbulnya masalah menyusui. Ibu yang bekerja di luar rumah dianjurkan agar lebih sering menyusui pada malam hari.⁵⁰

f. Perawatan tali pusat

Perawatan tali pusat merupakan upaya untuk mencegah infeksi tali pusat yang sesungguhnya merupakan tindakan sederhana, yang terpenting adalah tali pusat dan daerah sekitar tali pusat selalu bersih dan kering, dan selalu mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun sebelum merawat tali pusat. Beberapa cara perawatan tali pusat sebagai berikut:⁵⁰

1) Membiarkan tali pusat kering sendiri

Membiarkan tali pusat mengering dengan sendirinya dan hanya membersihkan setiap hari tidak menyebabkan infeksi, hal yang penting adalah tidak membubuhkan apapun pada sekitar daerah tali pusat karena dapat mengakibatkan infeksi.

2) Metode kasa kering, salah satu yang disarankan oleh WHO dalam merawat tali pusat adalah dengan menggunakan pembalut kasa bersih yang sering diganti.

- 3) Metode kasa alkohol 70%, tali pusat dirawat dan dijaga kebersihannya dengan mengenakan alkohol 70% , paling sedikit dua kali sehari setiap empat jam dan lebih sering lagi jika tampak basah atau lengket.
- 4) Metode antiseptic dan kasa kering, luka tali pusat dibersihkan dan dirawat dengan alkohol 70% atau povidon iodine 10% serta dibalut kasa steril, pembalut tersebut diganti setiap hari dan setiap tali basah atau kotor.

Adapun prinsip perawatan tali pusat sebagai berikut:⁵⁰

- a) Jangan membungkus atau mengoleskan bahan atau ramuan apapun ke puntung tali pusat.
 - b) Mengusapkan alkohol ataupun betadin masih diperkenankan sepanjang tidak menyebabkan tali pusat basah atau lembab.
- g. Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan

Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir yang dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera (pendengaran, penglihatan perabaan, pembauan, dan pengecapan). Selain itu harus pula merangsang gerak kasar dan halus kaki, tangan dan jari-jari, mengajak berkomunikasi serta merangsang perasaan yang menyenangkan dan pikiran bayi dan balita. Rangsangan yang dilakukan sejak lahir, terus menerus, bervariasi dengan suasana bermain dan kasih sayang akan memicu kecerdasan anak. Waktu yang ideal untuk stimulasi adalah saat bayi bangun tidur/ tidak mengantuk, tenang, siap bermain dan sehat. Tujuan tindakan memberikan stimulasi pada bayi dan balita adalah untuk membantu anak mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan optimal atau sesuai yang diharapkan. Tindakan pemberian stimulasi dilakukan dengan prinsip bahwa stimulasi merupakan ungkapan rasa kasih dan sayang, bermain dengan anak, berbahagia bersama.⁵⁰

Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi 0-3 bulan antara lain:⁵⁰

- 1) Bergaul dan mandiri. Ajaklah bayi anda berbicara dengan lembut dibuai, dipeluk, dinyanyikan lagu dan lain-lain.
- 2) Bicara, Bahasa dan Kecerdasan. Ajaklah bayi anda berbicara, mendengarkan berbagai suara (suara burung, radio, dan lain-lain)
- 3) Gerak Kasar. Lihat bayi anda mengangkat kepala pada posisi telungkup dan memperhatikan benda bergerak.
- 4) Gerak halus. Latih bayi anda menggenggam benda kecil.

h. Imunisasi

Imunisasi adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan (imunitas) pada bayi atau anak sehingga terhindar dari penyakit. Pentingnya imunisasi didasarkan pada pemikiran bahwa pencegahan penyakit merupakan upaya terpenting dalam pemeliharaan kesehatan anak.⁵⁰

Berdasarkan proses atau mekanisme pertahanan tubuh, imunisasi dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁰

1) Imunisasi pasif (passive immunization)

Imunisasi pasif ini adalah “immunoglobulin” jenis imunisasi ini dapat mencegah penyakit campak (measles pada anak-anak)

2) Imunisasi Aktif (active immunization)

Imunisasi yang diberikan pada anak adalah:

- a) BCG, untuk mencegah penyakit TBC
- b) DPT, untuk mencegah penyakit-penyakit difteri, pertussis, dan tetanus
- c) Polio, untuk mencegah penyakit poliomyelitis
- d) Campak, untuk mencegah penyakit campak.

Keberhasilan pemberian imunisasi pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat tingginya kadar antibody pada saat dilakukan imunisasi, potensi antigen yang

disuntikkan, waktu antara pemberian imunisasi dan status nutrisi terutama kecukupan protein.⁵⁰

4. Keluarga Berencana

a. Pengertian KB

Program Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.⁵¹

Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri telah menentukan jumlah anak dalam keluarganya.⁵²

Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan dalam membantu pasangan suami istri dalam menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, maupun mengatur interval kelahiran. Keluarga Berencana (KB) diartikan sebagai program yang dirancang untuk mengurangi jumlah kelahiran atau mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal maupun non hormonal.⁵³

b. Tujuan program KB

Tujuan umum untuk 5 tahun kedepan mewujudkan visi dan misi program KB yaitu membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di masa yang datang untuk mencapai keluarga KB berkualitas tahun 2015. Sedangkan tujuan khusus program KB adalah mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera

melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.⁵³

c. Sasaran Program KB

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan dan sasaran tidak langsung pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga sejahtera.⁵³

d. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan keluarga berencana yang bermutu, yaitu⁵³:

- 1) Perlunya pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan klien
- 2) Klien harus dilayani secara profesional dan memenuhi standar pelayanan
- 3) Perlu dipertahankan kerahasiaan dan privasi klien
- 4) Upayakan klien tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani
- 5) Petugas memberikan informasi terkait pilihan kontrasepsi yang tersedia dan menjelaskan tentang kemampuan fasilitas kesehatan dalam melayani berbagai pilihan kontrasepsi kepada klien
- 6) Fasilitas pelayanan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan tersedia pada waktu yang ditentukan serta nyaman bagi klien
- 7) Tersedianya bahan dan alat kontrasepsi dalam jumlah yang cukup
- 8) Terdapat mekanisme supervisi yang dinamis yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam pelayanan dan terdapat mekanisme umpan balik dayang relatif bagi klien.

e. Ruang lingkup KB

Menurut Kemenkes RI (2016), meliputi⁵³:

- 1) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

- 2) Konseling
 - 3) Pelayanan Kontrasepsi
 - 4) Pelayanan Infertilitas
 - 5) Pendidikan Sex (sex education)
 - 6) Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan
 - 7) Konsultasi genetik
 - 8) Tes Keganasan
 - 9) Adopsi.
- f. Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Menurut Suwardono et al. (2020), ada empat jenis akseptor KB diantaranya yaitu ⁵⁴:

- 1) Akseptor baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau akseptor yang kembali menggunakan kontrasepsi setelah abortus atau melahirkan.
- 2) Akseptor lama adalah akseptor yang telah menggunakan kontrasepsi, tetapi datang kembali berganti ke alat kontrasepsi yang lain.
- 3) Akseptor aktif adalah akseptor yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.
- 4) Akseptor aktif kembali adalah akseptor yang berhenti menggunakan kontrasepsi selama tiga bulan atau lebih kemudian datang kembali untuk menggunakan kontrasepsi yang sama atau berganti dengan cara lain setelah berhenti/istirahat paling kurang tiga bulan dan bukan karena hamil.

Sedangkan akseptor KB menurut sarannya menurut Kemenkes RI (2016), meliputi ⁵³:

- 1) Fase menunda kehamilan

Menunda kehamilan sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang usia istrinya belum mencapai 20 tahun. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan untuk fase ini yaitu kontrasepsi dengan pulihnya

kesuburan tinggi atau kembalinya kesuburan dapat terjamin 100%.
Kontrasepsi yang disarankan yaitu AKDR dan pil KB.

2) Fase mengatur/menjarangkan kehamilan

Pada fase ini, usia istri antara 20-35 tahun merupakan usia paling baik untuk melahirkan. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan untuk fase ini yaitu efektifitasnya tinggi dan reversibilitasnya tinggi karena pasangan masih mengharapkan memiliki anak lagi. Kontrasepsi dapat digunakan 3-4 tahun sesuai dengan jarak kelahiran yang direncanakan.

3) Fase mengakhiri kesuburan

Pada fase ini, sebaiknya setelah umur istri lebih dari 35 tahun tidak hamil dan memiliki 2 anak. Jika pasangan sudah tidak mengharapkan mempunyai anak lagi, kontrasepsi yang dapat disarankan yaitu AKDR, vasektomi/tubektomi, implan, pil KB dan suntik KB.

g. Jenis-jenis kontrasepsi

Menurut Kemenkes RI (2016), kontrasepsi terdapat tiga macam yaitu kontrasepsi hormonal, kontrasepsi non hormonal dan kontrasepsi alamiah.⁵³

1) Kontrasepsi hormonal

Kontrasepsi hormonal mempunyai efek samping dalam penggunaannya salah satunya merupakan pergantian berat tubuh. Batas toleransi kenaikan bb akibat pemakaian kontrasepsi hormonal adalah 1,5-2 kg.⁵⁵ Pemakaian kontrasepsi hormonal disarankan dibatasi cuma 2 tahun saja, perihal tersebut bertujuan buat meminimalkan dari dampak samping yang tidak di idamkan. Dikala menyudahi dari memakai kontrasepsi hormonal, diharapkan membagikan waktu sela waktu pada badan buat memperoleh siklus haid wajar kembali. Dikala perempuan pengguna kontrasepsi

hormonal memperoleh siklus haid wajar minimum 3 kali, akseptor diperbolehkan kembali memakai selaku kontrasepsi pilihannya.⁵⁶

Terdapat sebagian aspek pemicu yang pengaruhi peningkatan berat tubuh antara lain adalah faktor hormonal (jenis dan lama pemakaian kontrasepsi), kelebihan santapan, kekurangan kegiatan serta kemudahan hidup, aspek psikologik serta genetik, pola mengkonsumsi santapan, serta aspek lingkungan.^{57, 58}

Kenaikan berat badan yang disebabkan oleh faktor hormonal sebab hormon progesteron memudahkan pergantian karbohidrat serta gula jadi lemak, sehingga lemak di dasar kulit meningkat, tidak hanya itu hormon progesteron pula menimbulkan nafsu makan meningkat serta merendahkan kegiatan raga, dampaknya konsumsi KB hormonal bisa menimbulkan berat tubuh meningkat. Dampak yang terjadi apabila masalah efek samping akibat pemakaian kotrasepsi hormonal ini tidak di atasi dengan baik adalah terganggunya kesuburan seorang wanita sehingga kemungkinan memiliki anak kembali akan membutuhkan waktu lama, dampak lainnya adalah berhubungan dengan masalah kesehatan yaitu dengan kenaikan berat badan yang terus bertambah akan menyebabkan obesitas yang dapat memicu timbulnya penyakit penyerta yang bisa berdampak pada kematian.⁵⁹ Pemecahan dari penjelasan diatas kalau berartinya kedudukan tenaga kesehatan buat membagikan bimbingan kepada calon akseptor KB serta pendamping tentang pembelajaran kesehatan pemakaian kontrasepsi beserta dampak samping yang hendak ditimbulkan sehingga diharapkan bisa meminimalisir dampak samping akibat konsumsi kontrasepsi hormonal. Petugas kesehatan pula dapat menganjurkan buat memakai kontrasepsi non hormonal semacam IUD ataupun kondom.⁶⁰

a) Definisi

Kontrasepsi hormonal adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan mengandung preparat estrogen dan progesteron yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan.⁶¹

b) Jenis-jenis kontrasepsi hormonal

Menurut Kemenkes RI (2016), kontrasepsi hormonal yaitu pil KB, suntik, dan implant/susuk.⁵³

(1) Pil KB

Pil KB merupakan alat kontrasepsi oral yang memiliki fungsi untuk mencegah kehamilan dengan kerja mencegah ovulasi dan lendir mulut rahim menjadi lebih kental sehingga sperma sulit masuk. Apabila digunakan dengan benar dan teratur, resiko kegagalan pil KB sangat kecil sekitar 1:1000. Kegagalan dapat terjadi hingga 6% jika ibu lupa mengonsumsi pil KB. Beberapa efek samping dari pemakaian pil KB, yaitu:⁶²

- (a) Mual pada pemakaian 3 bulan pertama
- (b) Muncul pendarahan di antara masa haid bila lupa mengonsumsi pil KB
- (c) Dapat menimbulkan sakit kepala ringan
- (d) Dapat mengalami nyeri payudara
- (e) Dapat meningkatkan berat badan
- (f) Tidak mengalami menstruasi
- (g) Bila lupa meminumnya dapat meningkatkan resiko kehamilan
- (h) Tidak untuk wanita yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan perokok berat
- (i) Tidak semua pil KB dapat digunakan oleh ibu yang sedang menyusui.

(2) Suntik

Kontrasepsi metode suntikan yang mengandung Depo Medroxyprogesteron merupakan cara untuk mencegah terjadinya kehamilan menggunakan suntikan hormonal.⁶² Metode suntikan sangat efektif, terjadi kegagalan 0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan tiap tahunnya.⁵³ Efek samping dari pemakaian metode suntik, yaitu ⁶²:

- (a) Gangguan haid
- (b) Permasalahan berat badan merupakan efek samping yang sering muncul
- (c) Terlambatnya kembali kesuburan setelah pemakaian dihentikan
- (d) Pada penggunaan jangka panjang terjadi perubahan pada lipid serum dan dapat menurunkan densitas tulang.
- (e) Kekeringan pada vagina, penurunan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas dan timbulnya jerawat juga dapat terjadi pada pemakaian jangka panjang
- (f) Peningkatan berat badan.

(3) Implant/Susuk

Kontrasepsi implant merupakan kontrasepsi yang mengandung levonorgestrel/progesterone yang dibungkus silastik silikon polidimetri silikon dan disusukkan dibawah kulit. Kontrasepsi implant sangat efektif, kegagalannya 0,2-1 kehamilan per 100 wanita. Efek samping dari kontrasepsi ini yaitu dapat menyebabkan perubahan pada pola haid berupa pendarahan bercak (spotting), hipermenorea, atau meningkatnya jumlah darah haid, serta amenorea. Beberapa keluhan lain yang timbul diantaranya ⁶²:

- (a) Sakit kepala

- (b) Peningkatan/penurunan berat badan
- (c) Nyeri payudara
- (d) Perasaan mual
- (e) Pusing
- (f) Gelisah
- (g) Membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan
- (h) Klien tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi sesuai dengan keinginan, tetapi harus pergi ke klinik untuk pencabutan.

2) Kontrasepsi non hormonal

a) Definisi

Kontrasepsi non hormonal merupakan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak mengandung hormon.⁶³

b) Jenis-jenis kontrasepsi non hormonal

(1) Kondom pria dan wanita

Metode ini merupakan salah satu kontrasepsi yang terbuat dari bahan lateks sangat tipis (karet) atau poliuretan (plastik) berfungsi mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Untuk kondom wanita, dimasukkan kedalam vagina dan dilonggarkan. Efektivitas dari kondom pria yang digunakan sesuai instruksi sekitar 98% atau 2 dari 100 wanita berpotensi hamil setiap tahunnya.⁶⁴ Efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemakaian kondom, diantaranya ⁶²:

- (a) Kondom bocor atau rusak (sebelum berhubungan)
- (b) Adanya reaksi alergi (spermisida)
- (c) Mengurangi kenikmatan hubungan.

(2) Intra Uteri Devices (IUD/AKDR)

AKDR merupakan alat yang efektif, aman, dan reversibel untuk mencegah kehamilan dengan cara dimasukkan kedalam uterus melalui kanalis servikalis. AKDR terbuat dari bahan plastik atau logam kecil. Efektivitas dari AKDR sendiri tinggi, walaupun masih dapat terjadi 1-3 kehamilan per 100 wanita per tahunnya.⁶² Pemasangan alat kontrasepsi ini harus dikerjakan oleh tenaga medis, alat kontrasepsi harus dimasukkan kedalam kemaluan, dan pemasangan yang cukup rumit.⁶⁵ Efek samping lain dari AKDR, yaitu⁶²:

- (a) Timbul bercak darah kram perut setelah pemasangan AKDR
- (b) Nyeri punggung dan kram dapat terjadi bersamaan selama beberapa hari setelah pemasangan
- (c) Nyeri berat akibat kram perut
- (d) Disminorhea, terjadi selama 1-3 bulan pertama setelah pemasangan
- (e) Gangguan menstruasi seperti menorrhagia, metroragia, amenorea, oligomenorea.
- (f) Anemia
- (g) AKDR tertanam dalam endometrium atau myometrium
- (h) Benang AKDR hilang, terlalu panjang ataupun terlalu pendek.

(3) Sterilisasi MOW/MOP

Pada wanita disebut MOW atau tubektomi, adalah tindakan pembedahan yang dilakukan pada kedua tuba fallopi wanita dan merupakan metode kontrasepsi permanen. Metode ini disebut permanen karena metode ini tidak dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ingin memiliki anak kembali.

Sedangkan pada pria disebut MOP atau vasektomi, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan dengan memotong sebagian (0,5-1 cm) saluran benih. Beberapa efek samping yang dapat timbul dari tubektomi yaitu terjadi infeksi luka, demam pasca operasi, luka pada kandung kemih, dan terjadi hematoma. Sedangkan untuk vasektomi (MOP) yaitu timbulnya rasa nyeri, abses pada bekas luka, dan hematoma atau membengkaknya biji zakar karena pendarahan.⁶²

(4) Diafragma

Diafragma merupakan cangkir lateks fleksibel yang digunakan dengan spermisida dan dimasukkan kedalam vagina sebelum berhubungan.⁶⁶ Metode ini merupakan metode untuk mengontrol kehamilan dengan mencegah sperma pria bertemu dengan sel telur wanita. Metode ini lebih efektif jika digunakan dengan spermisida. Beberapa efek samping dari spermisida, yaitu⁶⁴:

- (a) Dapat meningkatkan risiko mengalami HIV akibat pemakaian spermisida yang dioleskan bersama dengan diafragma jika tertular dari pasangan yang terinfeksi
- (b) Dapat menyebabkan iritasi dan sensasi terbakar pada vagina bagi pengguna yang alergi terhadap spermisida maupun lateks
- (c) Dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kencing
- (d) Dapat terjadi *toxic shock syndrome*.

(5) Spermisida

Spermisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh sperma. Jenis spermisida biasanya meliputi krim, busa, suppositoria vagina dan gel. Spermisida digunakan oleh wanita, berfungsi menutup leher rahim dan

membunuh sperma. Efektivitasnya sekitar 71%, hanya memberikan perlindungan sedang terhadap kehamilan. Efektivitasnya kurang dan efektivitas pengaplikasiannya hanya 1-2 jam.^{64, 62} Beberapa efek samping yang dapat timbul dari pemakaian spermisida, yaitu ⁶⁴:

- (a) Pemakaian spermisida yang dioleskan bersamaan dengan diafragma akan meningkatkan resiko tertular HIV dari pasangan yang terinfeksi. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan metode ini digunakan jika hanya memiliki satu pasangan seksual.
- (b) Dapat menyebabkan iritasi dan sensasi terbakar pada vagina yang memiliki alergi lateks maupun spermisida
- (c) Dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kencing
- (d) Dapat terjadi toxic shock syndrome. Untuk menurunkan risiko ini maka penggunaan tidak boleh melebihi 24 jam.

3) Kontrasepsi alamiah

a) Definisi

Kontrasepsi alamiah merupakan salah satu cara mencegah kehamilan tanpa menggunakan alat atau secara alami tanpa bantuan alat dan memanfaatkan sifat alami tubuh.⁶⁷

b) Jenis-jenis kontrasepsi alamiah

(1) Metode kalender atau pantang berkala

Metode kalender atau pantang berkala merupakan metode kontrasepsi sederhana yang digunakan dengan cara tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Metode ini akan efektif bila digunakan dengan baik dan benar. Pasangan suami istri harus mengetahui masa subur, sebelum menggunakan metode ini. Diperlukan pengamatan minimal enam kali siklus

menstruasi jika ingin menggunakan metode ini. Angka kegagalan dalam penggunaan metode kalender adalah 14 per 100 wanita per tahun.⁶² Diperlukan konseling tambahan dalam penerapan metode ini untuk memastikan metode kalender digunakan dengan tepat.⁶⁴

(2) *Coitus Interruptus* atau Senggama Terputus

Metode ini adalah metode dimana ejakulasi dilakukan diluar vagina atau pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina.⁶² Angka kegagalan dari metode ini yaitu 4-27 kehamilan per 100 wanita per tahun. Efektivitas dari metode ini sama memiliki efektivitas yang sama dengan metode kondom.⁶⁴

(3) Metode suhu basal

Suhu tubuh basal merupakan suhu terendah tubuh selama istirahat atau dalam keadaan tidur. Pengukuran suhu basal ini dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas atau segera setelah bangun tidur. Suhu basal tubuh diukur menggunakan termometer basal, yang dapat digunakan secara oral, per vagina, atau melalui dubur dan ditempatkan pada lokasi selama 5 menit. Tujuan dari pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa ovulasi. Suhu tubuh basal dipantau dan dicatat selama beberapa bulan dan dianggap akurat bila terdeteksi pada saat ovulasi. Tingkat keefektifan metode ini sekitar 80% atau 20-30 kehamilan per 100 wanita per tahunnya. Angka kegagalannya secara teoritis adalah 15 kehamilan per 100 wanita per tahun.⁶²

(4) Metode lendir serviks

Metode mukosa serviks atau metode ovulasi ini merupakan metode keluarga berencana alamiah (KBA) yaitu dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva untuk mengenali masa subur dari siklus menstruasi. Angka kegagalan dari metode ini sekitar 3-4 wanita per 100 wanita per tahun. Keberhasilan dari metode ini tergantung pada pemahaman yang tepat, instruksi yang tepat, pencatatan lendir serviks, dan keakuratan dalam pengamatan. Apabila petunjuk metode ini dilakukan dengan akurat, maka keberhasilannya dapat mencapai 99%.⁶²

(5) Metode Amenorea Laktasi (MAL)

Lactational Amenorrhea Method (LAM) atau Metode Amenorea Laktasi (MAL) merupakan salah satu metode alamiah yang menggunakan Air Susu Ibu (ASI). Metode ini merupakan metode sementara dengan pemberian ASI secara eksklusif, yang artinya hanya memberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya. Efektifitas dari metode ini sangat tinggi sekitar 98 persen apabila dilakukan secara benar. Syarat agar dapat menggunakan metode ini yaitu belum mendapat haid pasca melahirkan, menyusui secara eksklusif (tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya), dan metode ini hanya digunakan selama enam bulan pertama setelah melahirkan.⁶⁷

Metode ini efektif sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian kontrasepsi lainnya. Cara kerjanya dengan menunda atau menekan ovulasi.

Keuntungan kontrasepsi meliputi:

- (a) Efektifitas tinggi (keberhasilan 98 % pada 6 bulan pasca persalinan)
- (b) Segera efektif
- (c) Tidak mengganggu sanggama.
- (d) Tidak ada efek secara sistemik.
- (e) Tidak perlu pengawasan medis.
- (f) Tidak perlu obat atau alat.
- (g) Tanpa biaya
- (h) Dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai pramenopause.
- (i) Bayi mendapat manfaat ASI : meningkatkan kekebalan tubuh, asupan gizi yang terbaik dan sempurna selama tumbuh kembang bayi yang optimal, terhindar terhadap kontaminasi dari air, susu lain atau formula, atau alat minum yang dipakai.
- (j) Ibu : mengurangi resiko anemia, mengurangi resiko perdarahan pasca persalinan, dan meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi.

Keterbatasan:

- (a) Perawatan saat kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit.
- (b) Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan.
- (c) Tidak melindungi terhadap IMS (Infeksi Menular Seksual). Dapat dipakai pada Ibu yang menyusui secara eksklusif, bayinya berumur kurang dari 6 bulan dan belum mendapat haid setelah melahirkan.⁶⁷

h. Faktor-faktor yang berhubungan dalam pemilihan metode kontrasepsi

Dibawah ini beberapa faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS), antara lain:

1) Usia

Usia seseorang mempengaruhi metode kontrasepsi yang digunakan. Usia 20 tahun keatas cenderung lebih memilih untuk menggunakan kontrasepsi karena diusia tersebut merupakan masa menjarangkan kehamilan.⁶⁸ Pada penelitian Valentina T (2019), menjelaskan bahwa usia menentukan dalam pemilihan metode kontrasepsi, dikarenakan usia memengaruhi terhadap keinginan anak yang dimiliki. Usia wanita yang muda, cenderung untuk memiliki anak yang lebih banyak dibandingkan wanita yang berumur tua.⁶⁹

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan proses peningkatan terhadap perubahan pola pikir dan pengetahuan. Pendidikan berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup maupun kesehatan. Pendidikan berpengaruh dalam perilaku sehari-hari.⁶⁸ Perilaku seseorang dengan yang berpendidikan rendah akan berbeda dengan yang berpendidikan tinggi. Berpendidikan yang tinggi tentu akan lebih memiliki pengetahuan yang lebih.⁶⁹

3) Pekerjaan

Status pekerjaan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dalam pemilihan metode kontrasepsi. Pekerjaan ibu dapat menggambarkan tingkat pengambilan keputusan dalam keluarga.⁶⁹

4) Jumlah anak

Jumlah anak berpengaruh dalam metode kontrasepsi yang digunakan. Banyaknya jumlah anak yang dimiliki akan cenderung untuk menghentikan kesuburan dan menggunakan kontrasepsi.⁶⁸

5) Penghasilan

Penghasilan seseorang berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.⁶⁸ Besar kecilnya penghasilan yang didapatkan dan keadaan ekonomi seseorang berkaitan erat dengan kemampuan untuk memilih metode kontrasepsi yang akan digunakan.⁶⁹

BAB III

PEMBAHASAN

A. Asuhan Masa Kehamilan

13 Desember 2023 dilakukan kunjungan rumah ke Dusun Kerten RT 007, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul sebagai pengkajian awal pada Ny. F usia 31 tahun seorang ibu hamil berstatus pekerjaan sebagai guru honorer dan wirausaha, berpendidikan D4, memiliki suami bernama Tn. N sebagai ketua RT berpendidikan D4 ilmu pemerintahan. Bidan datang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan *informed consent*. Ibu mengatakan tidak ada keluhan dan bersedia menjadi pasien CoC (*Continuity of Care*) sehingga mengisi surat persetujuan. Ibu mengatakan HPHT tanggal 18 April 2022, sehingga HPL 25 Januari 2023. Umur kehamilannya saat ini adalah 33 minggu 6 hari. Teori menyatakan, kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Lama kehamilan yaitu 280 hari atau 40 pekan (minggu) atau 10 bulan (lunar months). Kehamilan dibagi atas 3 trimester: (a) kehamilan trimester I antara 0 -12 minggu, (b) kehamilan trimester II antara 12 - 28 minggu, dan (c) kehamilan trimester III antara 28 – 40 minggu.¹¹ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Ny. F dalam masa kehamilan trimester III. Selama masa inilah diperlukan perawatan khusus pada kehidupan ibu maupun janin agar dapat berlangsung dengan baik.¹² Dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil, bidan harus memberikan pelayanan secara kompherensif atau menyeluruh, pada konteks ini bidan melakukan *Continuity of Care* (CoC) atau asuhan kebidanan secara berkesinambungan merupakan asuhan yang diberikan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, atau neonatus, serta pemilihan metode kontrasepsi atau KB secara komprehensif.^{8,11}

Dalam kehamilan dapat dibedakan berdasarkan jumlah kehamilan/gravida seorang wanita, antara lain: primigravida adalah seorang ibu yang sedang hamil untuk pertama kali dan multigravida adalah seorang

ibu yang hamil lebih dari 1 sampai 5 kali.¹³ Menurut pernyataan Ny. F saat ini merupakan kehamilan keduanya dan ibu tidak pernah keguguran dan pernah 1x melahirkan sehingga ibu termasuk seorang multigravida.

Hasil pemeriksaan pada ibu didapatkan yaitu tanda vital dalam batas normal, BB sebelum hamil: 49 kg, BB saat ini: 60 kg, TB : 155 cm, LILA : 24 cm dan IMT : 20,23 kg/m² (normal). Diketahui ibu mengalami kenaikan BB yaitu 11 kg selama hamil ini. Hal ini sejalan dengan teori bahwa IMT ibu dalam kategori normal sehingga kenaikan BB selama hamil 11,5-16 kg.¹⁶ Pemeriksaan fisik head to toe keseluruhan normal, TFU 27 cm, presentasi kepala dan belum masuk panggul. Tetapi pada data penunjang hasil pemeriksaan laboratorium terakhir pada tanggal 17/08/2022 didapatkan Hb ibu: 9,7 gr%. Anemia kehamilan adalah kondisi tubuh dengan kadar hemoglobin dalam darah <11 gr% pada trimester 1 dan 3 atau kadar Hb <10,5 gr% pada trimester 2.⁴ Sejalan dengan teori yang mengklasifikasikan anemia sebagai berikut: Hb normal: ≥ 11 gr/dL, anemia ringan: 10-10,9 gr/dl, anemia sedang: 7- 9,9 gr/dl dan anemia berat: < 7 gr/dl.³¹

Berdasarkan data pengkajian subjektif dan objektif yang telah diperoleh ditegakkan diagnosa kebidanan yaitu Ny F Umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 umur kehamilan 33 minggu 6 hari dengan anemia sedang, janin tunggal, hidup, intrauterine, presentasi kepala. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan CDC di Amerika Serikat mengatakan ibu hamil dikatakan memiliki anemia jika kadar hemoglobinnya (Hb) pada trimester pertama dan ketiga kurang dari 11 gr/dL. Sementara anemia di trimester kedua terjadi ketika kadar Hb kurang dari 10,5 g/dL. Faktor-faktor yang memengaruhi anemia ibu hamil yaitu faktor dasar (sosial dan ekonomi, pengetahuan, pendidikan, dan budaya)^{18, 23, 24, 25}, faktor tidak langsung (frekuensi antenatal care (ANC), paritas, umur ibu, dan dukungan suami)^{26, 27, 28}, dan faktor langsung (pola konsumsi, infeksi dan perdarahan).^{29, 30, 24} Anemia yang terjadi pada Ny. F bukanlah dari faktor dasar dan faktor langsung, karena dari segi sosial ekonomi keluarga dalam keadaan cukup/menengah/memiliki

penghasilan, dari segi pendidikan ibu lulusan sarjana/berpendidikan tinggi, dari segi budaya tidak ada pantangan makanan apapun selama hamil, ibu sudah rutin konsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran yang diberikan tenaga kesehatan, tidak pernah/menderita infeksi maupun perdarahan, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan/ANC, umur ibu dalam kategori reproduksi sehat >20 tahun dan <35 tahun, serta baru satu kali melahirkan. Dari segi pengetahuan, Ny. F belum sepenuhnya memahami tentang anemia karena meskipun Ny. F teratur meminum tablet Fe dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi maupun protein tetapi Ny. F mengaku dirinya masih sering mengkonsumsi teh. Kebiasaan konsumsi teh ini dilakukan Ny. karena Ny. F tidak mengetahui jika minuman berkafein dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Ny. F juga mengatakan bahwa suaminya seorang ketua RT yang kesehariannya dominan di kantor desa dan jarang sekali bisa menemani ibu periksa kehamilan sehingga dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar faktor yang mempengaruhi anemia pada Ny. F yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai anemia dan kurangnya dukungan suami selama kehamilan. Adapun bahaya anemia selama kehamilan dapat terjadi abortus, persalinan prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, ancaman dekomposisi kordis (Hb <6 gr%), mola hidatidosa, hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini (KPD). Bahaya saat persalinan yaitu gangguan his (kekuatan mengejan), kala pertama dapat berlangsung lama, dan terjadi partus terlantar, kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, kala uri dapat diikuti retensio plasenta, dan perdarahan post partum karena atonia uteri, kala empat dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri. Pada masa nifas yaitu terjadi subinvolusi uteri menimbulkan perdarahan post partum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang, terjadi Dekompensasi Cordis/Kegagalan Jantung cordis mendadak setelah persalinan, anemia kala nifas, dan mudah terjadi infeksi mammae.³²

Masalah yang dialami Ny. F yaitu belum melakukan pemeriksaan kadar Hb dan urin rutin di TM III, ibu belum mengetahui tanda bahaya kehamilan TM III dan ibu memiliki riwayat keluarga dengan DM. Pada kasus Ny.F tidak ada diagnosa potensial sehingga tidak membutuhkan tindakan segera. Kebutuhan yang diperlukan yaitu memberikan KIE tentang anemia dan peran suami dalam mengatasinya, memberikan KIE mengenai tanda bahaya kehamilan TM III, menganjurkan untuk pemeriksaan kadar Hb dan urin rutin TM III di Puskesmas Imogiri 1, dan menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dengan mengurangi karbohidrat atau makanan/minuman manis.

Faktor yang mempengaruhi anemia pada Ny. F yaitu kurangnya pengetahuan tentang anemia dan dukungan suami. Oleh karena itu, bidan memberikan KIE mengenai pengertian anemia, faktor risiko, komplikasi, gejala, pencegahan atau pengobatan, pola konsumsi makanan/minuman dan tablet tambah darah ibu hamil seperti menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi tablet Fe 2x sehari bersamaan dengan Vitamin C 2x sehari saat siang dan malam sebelum tidur, tidak minum menggunakan teh, kopi, susu, dan lainnya, tablet kalsium diminum 1x sehari dipagi hari, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan (berwarna merah/kuning) setiap hari atau mengatur pola makan yang mengandung zat besi dan tinggi protein seperti telur, daging, kacang-kacangan dan lain sebagainya serta menghindari minuman berkafein seperti teh/kopi agar tidak mengganggu penyerapan Fe didalam tubuh. Selain itu, bidan juga memberikan KIE peran/dukungan suami pada ibu hamil dengan anemia sebagai pendamping. Pendampingan keluarga adalah anggota keluarga bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan, seperti seorang suami mendampingi dan memberikan dukungan moril kepada istrinya selama masa hamil serta memberikan bantuan apa saja yang diperlukan istrinya.⁷⁰ Dukungan keluarga tidak hanya moril saja, ada dukungan penghargaan, dukungan informasi dan emosional. Dukungan

informasi yaitu membantu ibu menemukan alternatif yang ada bagi penyelesaian masalah, misalnya menghadapi masalah ketika istri menemui kesulitan selama hamil, suami dapat memberikan informasi berupa saran, petunjuk, pemberian nasihat, mencari informasi lain yang bersumber dari media cetak/elektronik, dan juga tenaga kesehatan; bidan dan dokter. Dukungan emosional adalah kepedulian dan empati yang diberikan oleh orang lain atau suami yang dapat meyakinkan ibu hamil bahwa dirinya diperhatikan seperti menemani ibu setiap pemeriksaan rutin kehamilan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu.²⁸ Dalam memberikan KIE tentang anemia dan peran/dukungan suami ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian Sari, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi anemia ibu hamil yaitu dukungan keluarga (PR 0,560 pvalue = 0,049), adapun pengaruh asupan zat besi (Fe) (PR 1,195 pvalue = 0,026), tingkat pendapatan (PR 0,507 pvalue = 0,015), dan pengetahuan (PR 0,557 pvalue = 0,055).⁷¹ Ny. F mengatakan sangat senang karena setelah dirinya mencoba berdiskusi dengan suaminya mengenai dukungan suami dalam mengatasi anemia kehamilan, saat ini suaminya ikut mendampingi ibu setiap pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan dan selalu mengingatkan makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi maupun yang perlu dihindari serta selalu mengingatkan ibu untuk meminum tablet fe. Tatalaksana lainnya yaitu memberikan KIE mengenai tanda bahaya kehamilan trimester III¹⁷, menganjurkan untuk pemeriksaan kadar Hb dan urin rutin trimester III di Puskesmas Imogiri 1 (26 Desember 2023 dengan hasil Hb: 11,4 gr/dl, GDS: 82 mg/dl, Protein Urine: Negatif), dan menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dengan mengurangi karbohidrat atau makanan/minuman manis. Kadar Hb Ny. F mengalami kenaikan dari 9,7 gr/dl menjadi 11,4 gr/dl. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar Hb ibu telah mencapai batas normal di kehamilan trimester III, keberhasilan kadar Hb Ny. F ini tidak lain karena KIE yang diberikan sehingga menambah pengetahuan ibu tentang anemia,

kepatuhan mengkonsumsi tablet fe, mengikuti anjuran pola makan dan minum untuk mengatasi anemia, serta adanya dukungan keluarga.

08 Januari 2023 dilakukan kunjungan rumah selanjutnya (catatan perkembangan II) didapatkan usia kehamilan Ny. F memasuki 37 minggu 5 hari, ibu mengatakan mengatakan punggungnya sakit dan di trimester III belum pernah USG lagi. Dalam hal ini bidan perlu memberikan bimbingan mengenai persiapan persalinan, kelahiran, dan menjadi orangtua sebagai salah satu lingkup asuhan masa kehamilan.¹¹ Tatalaksananya yaitu Ny. F diberikan KIE mengenai keluhan nyeri pinggang dan cara mengatasinya sebagaimana sesuai teori yang menyatakan bahwa salah satu lingkup asuhan kehamilan yaitu menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan.¹¹ Ny. F diberikan KIE tanda-tanda persalinan mengatakan pada ibu untuk tidak panik dan tetap tenang apabila tanda persalinan muncul. Gunakan untuk istirahat yang cukup, bisa juga jalan-jalan pagi atau sore, tetap memenuhi kebutuhan nutrisi dan jangan lupa berdoa, memberikan konseling bahwa ibu diperbolehkan melakukan hubungan suami istri karena sperma dari suami dapat menyebabkan kontraksi pada rahim ibu dan akan memicu terjadinya persalinan. Jika kencang-kencang semakin sering dan durasinya setiap 3 menit atau keluar air-air, maka segera datang ke fasilitas kesehatan)³⁷. Penelitian Wulandari, dkk 2020 menyatakan bahwa ada hubungan erat antara pola seksual ibu hamil dengan kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) nilai Pvalue 0,024 dan OR= 6,00.⁷² Karena menurut teori, frekuensi coitus pada trimester ketiga kehamilan yang lebih dari 3 kali seminggu diyakini memicu kontraksi rahim oleh karena adanya paparan terhadap hormon prostaglandin di dalam semen atau cairan sperma dan mempercepat persalinan sehingga baik untuk diterapkan pada ibu hamil normal dengan usia kehamilan >37 minggu.⁷³ Lalu Ny. F mengisi P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), Ny. F dan suami sudah mantap berencana melahirkan di RS MK supaya tidak perlu khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk persiapan

persalinan yang aman. Kemudian diberikan KIE motivasi KB dan baru akan mendiskusikan keputusan ber-KB pasca salin bersama suaminya. Ny. F juga diberikan KIE tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) serta memotivasi ibu untuk USG trimester III minimal 1x ke dokter kandungan agar mengetahui lebih jelas/pasti mengenai keadaan janin sebagai persiapan persalinan yang aman sekaligus janji temu persalinan di RS yang dituju (hasil *follow up* melalui *whatsapp*, ibu telah melakukan pemeriksaan USG ke dokter kandungan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan hasil janin tunggal hidup intrauterine presentasi kepala sudah masuk PAP, TBJ: 3250 gram, air ketuban cukup dan plasenta letak fundus anterior. Ibu juga mengatakan telah membuat janji untuk bersalin di RS MK.

B. Asuhan Masa Persalinan

Ny. F datang didampingi suami ke RS MK 18 Januari 2023 jam 05.00 WIB umur kehamilan 39 minggu mengeluh perut kram terasa seperti kenceng-kenceng sejak pukul 03.00 WIB. Hal-hal yang dialami ibu tersebut merupakan tanda-tanda persalinan. Kenceng-kenceng yang dirasakan ibu merupakan kontraksi uterus. Kontraksi uterus yang sangat nyeri, memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. Sifat his persalinan meliputi pinggang terasa sakit yang menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval makin pendek, kekuatan makin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks, makin beraktivitas, kekuatan makin bertambah³⁷. Ibu mengatakan saat jam 05.00 WIB sudah pembukaan 2 cm sehingga ibu dirawat inap untuk dilakukan observasi kemajuan persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa ibu sedang dalam persalinan kala I fase laten. Kala I atau kala pembukaan berlangsung dari pembukaan (0 cm) sampai pembukaan lengkap (10 cm). Kala I untuk primigravida berlangsung 12 jam, sedangkan multigravida sekitar 8 jam. Kala I (pembukaan) dibagi menjadi dua fase, yakni: fase laten dan fase aktif. Fase laten ditandai dengan pembukaan serviks berlangsung lambat, pembukaan 0 sampai pembukaan 3 cm dan berlangsung dalam 7-8 jam³⁸. Saat jam 14.00 WIB ibu mengatakan pembukaannya bertambah yaitu

Ø 4 cm (masuk kala I fase aktif). Jam 18.00 WIB Ø 8 cm, ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin kuat dan sering serta keluar lendir darah dari jalan lahir. Lendir darah merupakan salah satu tanda persalinan. Terjadinya his persalinan mengakibatkan perubahan pada serviks yang menyebabkan pendataran dan pembukaan, pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis lepas, dan terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah³⁷. Jam 21.20 WIB ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin sering, keluar air-air yang tidak tertahankan dan ada keinginan untuk meneran seperti ingin BAB dan pembukaannya sudah lengkap. Tanda dan gejala kala II yaitu his semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit dengan durasi 50-100 detik, menjelang akhir kala I ketuban pecah dan ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak. Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rektum dan/ atau vagina, perineum terlihat menonjol, vulva-vagina dan sfingter ani terlihat membuka.³⁶ Kala II persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi proses ini biasanya berlangsung 1,5-2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida.³⁶ Selama masa proses persalinan bidan RS PKU Muhammadiyah Kotagede melakukan asuhan persalinan normal kala I sampai kala IV. Jam 22.00 WIB bayi Ny. F lahir spontan, cukup bulan, air ketuban jernih, tonus otot aktif, dan menangis kuat. Jam 22.10 WIB plasenta lahir spontan dan lengkap, kemudian dilakukan penjahitan laserasi jalam lahir derajat II dan pemantauan kala IV dengan hasil dalam batas normal.

C. Asuhan Bayi Baru Lahir

Bayi Ny. F 1 jam kemudian dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil BB: 3300 gram, PB: 50 cm, LK: 34 cm, LD: 33 cm, Lila: 10.5 cm, tanda vital dalam batas normal dan hasil pemeriksaan fisik seluruhnya normal. Bidan melakukan perawatan pada bayi. Ny. F yaitu memberi salep mata antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi mata, dan vitamin K 1 mg

untuk mencegah perdarahan secara intramuskular di paha kiri anterolateral, setelah 1 jam vitamin K lalu diberikan suntikan imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis B pada bayi di paha kanan anterolateral secara IM. Hal ini sesuai dengan teori bahwa suntikan imunisasi Hepatitis B (HB 0) IM 0,5 mL segera setelah lahir atau kurang dari 7 hari setelah kelahiran di paha kanan anterolateral bayi. Imunisasi adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan (imunitas) pada bayi atau anak sehingga terhindar dari penyakit. Pentingnya imunisasi didasarkan pada pemikiran bahwa pencegahan penyakit merupakan upaya terpenting dalam pemeliharaan kesehatan anak.⁵⁰ Tatalaksana lainnya yaitu menjaga kehangatan suhu bayi dengan menyelimuti menggunakan kain dan memakaikan kepala bayi dengan topi, melakukan pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir dengan memantau dan mencegah keadaan yang lebih buruk pada bayi baru lahir normal serta melakukan rawat gabung bayi dengan ibu di ruang perawatan nifas.

D. Asuhan Masa Nifas dan Keluarga Berencana

Ny. F 31 tahun P2A0 dilakukan asuhan postpartum 8 jam normal. Teori menyatakan bahwa masa nifas (puerperium/postpartum) dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Sekitar 50 % kematian ibu terjadi dalam 24 jam pertama postpartum sehingga pelayanan pasca persalinan yang berkualitas harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi.⁴¹ Ny. F mengeluh masih terasa sedikit lelah, perut masih terasa mulas dan sakit pada bagian jalan lahir. Ibu mengatakan sudah BAK ke kamar mandi, tetapi belum BAB. Keluhan-keluhan yang dialami merupakan perubahan fisiologis dan adaptasi psikologis masa nifas. Lelah yang dirasakan menunjukkan bahwa ibu masih berada dalam adaptasi periode masa nifas. Periode ini diekspresikan oleh reva rubin yang terjadi pada tiga tahap berikut ini: *Taking in period, taking hold period dan letting go*. Pada Ny. F yang saat ini dialami adalah periode *taking in*. periode ini terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, dimana ibu masih pasif, kurang percaya diri, sangat bergantung pada orang lain, fokus perhatian

terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu makan meningkat⁴⁴. Mules pada perut merupakan hal yang normal setelah melahirkan, tanda bahwa kontraksi uterus baik sebagai proses involusi. Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. TFU ibu yaitu 2 jari dibawah pusat. Hal ini sesuai dengan teori dimana batas normal ukuran TFU setelah plasenta lahir yaitu setinggi pusat dan akan semakin kecil seiring lamanya masa nifas.⁴² Sedangkan nyeri pada luka jahitan yang dialami merupakan merupakan nyeri yang diakibatkan oleh robekan jalan lahir derajat 2 yang terjadi pada perineum. Nyeri perineum sebagai manifestasi dari luka bekas penjahitan yang dirasakan pasien akibat ruptur perineum pada saat melahirkan dan akan hilang seiring dengan penyembuhan luka perineum tersebut.⁴⁵ Ny. F saat ini sudah bisa berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah melahirkan. lochea Ny. F adalah lochea rubra. *Lochea* rubra berwarna merah karena mengandung darah. Ini adalah *lochea* pertama yang mulai keluar segera setelah kelahiran dan terus berlanjut selama dua hingga tiga hari pertama postpartum.⁴² Tatalaksana asuhan yang dilakukan mulai dari jelaskan kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dan keluhan yang dialaminya, menganjurkan ibu untuk makan makanan bergizi mengandung protein, vitamin dan mineral, menganjurkan ibu tidak menahan BAK dan BAB, melakukan *bounding attachment* ibu dan bayinya (rawat gabung), istirahat cukup, pemberian ASI awal, ASI eksklusif dan frekuensi pemberian ASI, personal hygiene, menjelaskan tanda bahaya masa nifas, memberikan terapi obat amoxicillin 500 mg, asam mefenamat 500 mg, tablet tambah darah (Fe) 60 mg, dan Vit A 20.000 IU. Ibu mengatakan pulang dari RS tanggal 20 Januari 2023 jam 11.00 WIB sesuai *advice* dokter. Ny. F dilakukan kunjungan nifas kedua dirumah pada 24 Januari 2023 6 hari postpartum. Asuhan yang diberikan pada kunjungan ini bertujuan untuk memastikan

involusi uterus berjalan dengan normal, menilai adanya tanda-tanda infeksi dan perdarahan, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat nutrisi yang cukup, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, dan memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir.⁴⁶ Ibu mengatakan bekas jahitan masih sedikit sakit, dan ASI nya lancar, ibu memberikan ASI secara on demand atau sesuai keinginan bayi. Ibu tidak minum jamu atau melakukan budaya yang berkaitan pada masa nifas karena dalam keluarganya tidak menganut budaya atau kebiasaan seperti itu. Ibu sudah bisa BAK dan BAB. Ibu mengatakan belum ada rencana ber-KB. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dan pemeriksaan fisik secara *head to toe* yaitu normal. TFU berada dipertengahan simpisis dan pusat dan kontraksi keras. Bidan memberikan penjelasan mengenai keluhan yang dialami ibu adalah hal yang normal dalam penyembuhan masa nifas, menganjurkan personal hygiene, mengajarkan teknik menyusui yang benar, menganjurkan pemberian ASI eksklusif, KIE tanda bahaya masa nifas, dan memberi KIE mengenai nutrisi ibu nifas. Pada masa nifas, nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Sedangkan peran dan dukungan suami berdampak positif pada pencapaian peran/psikis ibu. Dukungan suami yang kurang dapat memicu pencapaian peran ibu yang kurang dan memicu rasa stres sehingga produksi ASI mengalami ketidaklancaran.⁷⁴ Sejalan dengan penelitian Maimunah dan Sirotus (2020) bahwa pengetahuan ibu nifas tentang konsumsi nutrisi dan peran suami berhubungan dengan kelancaran produksi ASI dengan nilai $p < 0,05$ yaitu p-value sebesar 0,025 pada pengetahuan ibu tentang konsumsi nutrisi dan p-value sebesar 0,001 pada peran suami. Ibu yang berpengetahuan baik dan peran suaminya baik cenderung lancar produksi ASInya dibandingkan ibu yang berpengetahuan kurang dan suaminya kurang berperan pada masa nifas/menyusui.⁷⁵ Pada kunjungan ini juga bidan telah memberikan KIE tentang KB kepada Ny. F. Kunjungan ketiga dirumah Ny.F, 14 hari postpartum pada 1 Februari 2023 memiliki tujuan yang sama dengan

kunjungan kedua. Ibu mengatakan keadaannya sudah membaik dapat beraktivitas seperti biasa, tidak ada keluhan dan mengatakan dirinya belum memutuskan perihal KB dengan suami. Bidan melakukan pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU tidak teraba dan lochea alba dan jahitan sudah kering. Hal ini sesuai dengan proses involusi uteri secara fisiologis. Penatalaksanaan yang diberikan pada kunjungan ketiga sama halnya dengan kunjungan kedua dan tidak terdapat kesenjangan antara kasus dan teori. Kunjungan nifas terakhir dilakukan pada 15 Februari 2023 dihari ke- 28 postpartum. Asuhan yang diberikan pada kunjungan keempat ini berfokus kepada konseling KB secara dini yang diharapkan ibu dan keluarga dapat segera menentukan alat kontrasepsi yang akan digunakan setelah masa nifas selesai. Pada kunjungan keempat ini juga mengkaji dan mengevaluasi kembali penyulit-penyulit yang ibu rasakan selama masa nifas.⁴⁴ Selama masa nifas ibu pernah mengalami keluhan-keluhan nifas normal dan hal tersebut sudah teratasi dengan baik, hingga saat ini ibu dapat menyusui bayinya dengan baik dan efektif serta pengeluaran ASI juga mencukupi kebutuhan bayi. Pemeriksaan fisik dalam batas normal dan TFU tidak teraba, kandung kemih kosong, lochea berjenis alba berwarna putih, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa lochea yang keluar pada post partum >14 hari adalah lochea alba berwarna putih.⁷⁶ Ibu mengatakan suami dan dirinya ingin KB yang tidak memakai alat dan tidak ingin yang jangka panjang karena ada rencana program hamil kembali sedangkan menstruasi ibu tidak teratur dan sebelumnya sulit untuk hamil anak keduanya ini. Oleh karena itu, diberikan tatalaksana pada Ny. F yaitu konseling KB kembali kepada ibu agar dapat ber-KB pasca nifas berakhir. Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan dalam membantu pasangan suami istri dalam menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, maupun mengatur interval kelahiran. Keluarga Berencana (KB) diartikan sebagai program yang dirancang untuk mengurangi jumlah kelahiran atau mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan metode

kontrasepsi hormonal maupun non hormonal.⁵³ Ny. F dijelaskan mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi terbagi menjadi 3 jenis yaitu alamiah, hormonal dan non hormonal. Alamiah seperti MAL, metode kalender dan suhu basal. KB hormonal seperti pil, suntik dan implant. Sedangkan KB non hormonal seperti IUD, kondom dan MOW/MOP. Lalu menjelaskan kepada ibu mengenai metode KB alamiah, jenis-jenisnya, kekurangan dan kelebihan. Ibu paham dan ingin KB alami yaitu MAL sehingga dijelaskan mengenai KB MAL, keefektifannya, caranya, kelebihan dan kekurangannya. *Lactational Amenorrhea Method* (LAM) atau Metode Amenorea Laktasi (MAL) merupakan salah satu metode alamiah yang menggunakan Air Susu Ibu (ASI). Metode ini merupakan metode sementara dengan pemberian ASI secara eksklusif, yang artinya hanya memberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya. Efektifitas dari metode ini sangat tinggi sekitar 98 persen apabila dilakukan secara benar. Syarat agar dapat menggunakan metode ini yaitu belum mendapat haid pasca melahirkan, menyusui secara eksklusif (tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya), dan metode ini hanya digunakan selama enam bulan pertama setelah melahirkan.⁶⁷ Metode ini efektif sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian kontrasepsi lainnya. Cara kerjanya dengan menunda atau menekan ovulasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mufdlilah et al (2021) bahwa adanya korelasi antara pengetahuan dan perilaku ibu dalam menerapkan MAL sebagai metode kontrasepsi alami dengan p-value 0,006 (OR= 3,463; CI 95% = 1,411 - 8,498). Penting untuk menyeimbangkan pengetahuan yang baik dengan perilaku yang baik dalam menerapkan LAM. Selain itu, para ibu tidak percaya diri untuk menggunakan LAM saja, sehingga kontrasepsi tambahan sebagian besar dimanfaatkan sebagai pilihan dalam enam bulan pertama pascapersalinan. Sikap ini berpotensi mempengaruhi penggunaan LAM, dan diperlukan pemahaman yang mendalam tentang penerapannya agar ibu benar-benar merasakan dampaknya. Menyusui menunda kembalinya kesuburan karena pelepasan hormon pelepas gonadotropin (GnRH) dan hormon

luteinizing (LH) masing-masing dari hipotalamus dan hipofisis. Selain itu, konsentrasi plasma hormon perangsang folikel (FSH) cukup untuk menginduksi pertumbuhan folikel. Perkembangan ini, bersamaan dengan sekresi estradiol, meningkat menjadi normal saat bayi menghisap puting ibu. Oleh karena itu, proses hisap mencegah pembentukan gelombang LH preovulasi normal, dan folikel gagal pecah, sehingga menunda konsepsi. Keuntungan menggunakan LAM antara lain keuntungan ekonomi, tidak adanya efek samping, dan penggunaan obat atau alat tidak diperlukan.⁷⁷ Dengan pemberian KIE tersebut, Ny. F semakin yakin dan bersedia menerapkan KB MAL dari saat ini, bidan juga menganjurkan jika ada keluhan/sudah mendapatkan menstruasi atau ingin mengganti jenis KB maka ibu dianjurkan datang ke fasilitas kesehatan.

E. Asuhan Masa Neonatus

Neonatus adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan usia 28 hari. Neonatus dini adalah bayi berusia 0-7 hari. Neonatus lanjut adalah bayi berusia 8-28 hari. Kunjungan neonatal adalah pelayanan kesehatan kepada neonatus sedikitnya 3 kali yaitu Kunjungan neonatal I (KN1) pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir, Kunjungan neonatal II (KN2) pada hari ke 3 s/d 7 hari, dan Kunjungan neonatal III (KN3) pada hari ke 8 – 28 hari.⁵⁰ By. A telah melakukan kunjungan neonatal I-III pada bayi usia 8 jam, 6 hari dan 14 hari. Hasil pemeriksaan kunjungan KN I-III secara keseluruhan baik dan tidak ada masalah pada neonatus. Berat badan by. A tidak mengalami penurunan. Berat badan by. A mengalami kenaikan dari 3300 gram menjadi 3700 gram. Pada usia 0–6 bulan pertumbuhan berat badan bayi akan mengalami penambahan setiap minggu sekitar 140–200 gram dan berat badannya akan menjadi dua kali berat badan lahir pada akhir bulan ke-6.⁷⁸ Penatalaksanaan KN I - III pada bayi A yaitu memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik, menganjurkan ibu untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi seperti mencuci tangan sebelum menetek (menyusui) bayinya, menganjurkan ibu untuk menjaga kebutuhan

nutrisi bayi seperti memberikan ASI secara on demand/sesuai kebutuhan bayi minimal setiap 2-3 jam untuk pemenuhan gizi, menjelaskan mengenai ASI eksklusif, KIE tentang tanda bahaya pada bayi, KIE perawatan tali pusat yaitu dengan membersihkan tali pusat bayi saat mandi lalu dikeringkan dan dibiarkan saja tidak perlu diolesi minyak dan lain-lain, prinsipnya tetap bersih dan kering. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan imunisasi selanjutnya yaitu imunisasi BCG yang sudah dapat diberikan saat usia 1 bulan, manfaatnya untuk mencegah penyakit TBC serta menganjurkan ibu untuk rutin mengikuti kegiatan posyandu setiap bulannya.

Kesimpulannya yaitu asuhan yang diberikan dari masa kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan neonatus hingga KB telah sesuai dengan teori dan kewenangan bidan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021.⁷⁹

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan yang berkesinambungan selama kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB pada Ny. F yang dimulai pada saat pertemuan kunjungan ANC (rumah) pertama di trimester III yaitu pada tanggal 13 Desember 2022 hingga 15 Februari 2023 yaitu dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh asuhan sesuai teori, penelitian dan kewenangan bidan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kasus ini adalah:

1. Telah dilakukan asuhan berkesinambungan pada ibu hamil trimester III Ny. F usia 31 tahun G2P1Ab0Ah1 dengan anemia sedang di Puskesmas Imogiri 1 Bantul mulai UK 36 minggu 6 hari meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan sesuai dengan teori dan wewenang bidan.
2. Telah dilakukan asuhan berkesinambungan pada ibu bersalin Ny. F usia 31 tahun G2P1Ab0Ah1 di RS MK meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan sesuai dengan teori dan wewenang bidan.
3. Telah dilakukan asuhan berkesinambungan pada ibu nifas Ny. F usia 31 tahun P2Ab0Ah2 di Puskesmas Imogiri 1 Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan sesuai dengan teori dan wewenang bidan.
4. Telah dilakukan asuhan berkesinambungan pada neonatus By. Ny. F cukup bulan sesuai masa kehamilan normal di Puskesmas Imogiri 1

Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan sesuai dengan teori dan wewenang bidan.

5. Telah dilakukan asuhan berkesinambungan pada keluarga berencana Ny. F usia 31 tahun akseptor KB MAL di Puskesmas Imogiri 1 Bantul meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan melakukan evaluasi serta melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan sesuai dengan teori dan wewenang bidan.

B. Saran

1. Bagi pasien dan keluarga

Memperoleh informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, neonatus dan keluarga berencana serta ibu mendapat pelayanan kebidanan secara *Continuity of Care* mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, neonatus dan keluarga berencana.

2. Bagi Dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Mampu digunakan sebagai masukan untuk pengembangan materi yang telah diberikan baik dalam perkuliahan maupun praktik lapangan agar dapat menerapkan secara langsung dan berkesinambungan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas dan keluarga berencana dengan pendekatan manajemen kebidanan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

3. Bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan

Mampu menerapkan mata kuliah asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan keluarga berencana yang telah didapatkan saat perkuliahan.

4. Bagi Bidan di Puskesmas Imogiri 1 Bantul

Mampu meningkatkan mutu pelayanan dalam pemberian asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas dan keluarga berencana.

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. World Health Statistics. 2014; Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1/9789240692671_eng.pdf.
2. WHO. World Health Statistics. 2016; Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206498/1/9789241565264_eng.pdf.
3. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Profil Data Kesehatan DIY 2021. Yogyakarta; 2021.
4. Aritonang I. Gizi Ibu dan Anak. Yogyakarta: Leutika Prio; 2015.
5. Puskesmas Imogiri 1. Profil Puskesmas Imogiri 1 Bantul Tahun 2021. 2022.
6. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2021. Yogyakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 139 p.
7. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Profil Kesehatan Provinsi Jateng Tahun 2019. Jawa Tengah: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 2019.
8. Misar Y. Faktor Risiko Komplikasi Persalinan Pada Ibu Melahirkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Makassar: Universitas Hasanuddin; 2012.
9. Holmes D. Buku ajar Ilmu Kebidanan. Jakarta: EGC; 2012.
10. Dinkes S. Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Hamil. 2015.
11. Romauli S. Buku Ajar Askeb I: Konsep Dasar Asuhan Kehamilan. Yogyakarta: Nuha Medika; 2014.
12. Walyani ES. Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press; 2018. 1 p.
13. Walyani ES. Perawatan Kehamilan dan Menyusui Anak Pertama agar Bayi Lahir dan Tumbuh Sehat. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Baru Press; 2018. 1–29 p.
14. Tyastuti S. Asuhan kebidanan kehamilan. Pusdik SDM Kesehatan; 2016.
15. Tyastuti S, Wahyuningsih HP. Asuhan Kebidanan Kehamilan. 1st ed. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2016. 154–

155 p.

16. Bartini I. *Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil Normal*. Yogyakarta: Nuha Medika; 2015.
17. Hijri F, Trisuci Y. Hubungan antara Karakteristik Ibu dengan Pengetahuan tentang Tanda Tanda Bahaya Kehamilan. *J Bid Ilmu Kesehat*. 2016;7(1).
18. Irianto K. *Gizi Seimbang dalam Kesehatan Reproduksi (Balanced Nutrition in Reproductive Health)*. Jakarta: Alfabeta; 2014.
19. Kemenkes RI. *Riset Kesehatan Dasar 2015*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI; 2015.
20. Khairunnisa L, Wiyati PS, Adespin DA. Hubungan Anemia selama Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi. *J Kedokt Diponegoro*. 2019;8(2).
21. Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2014.
22. Asrinah D. *Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan*. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2015.
23. Wati DW, Febry F, Rahmiwati A. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Defisiensi Zat Besi Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Gandus Palembang. *J Kesehat Masy*. 2016;7(1):42–7.
24. Nurhidayati DR. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Anemia Pada Ibu Hamil Diwilayah Kerja Puskesmas Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. 2013;
25. Deal TE, Kennedy AA. *Corporate Culture: The Rites and Rituals of Corporate Life*. Massachusetts: Addison-Wesley. 2015;
26. Artika. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan K4 di Puskesmas Baqa Kota Samarinda Tahun 2016. 2016;
27. Fatkhiyah N. Faktor Risiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Slawi Kab. Tegal). *J Kebidanan Indones*. 2018;2(2).
28. Anjarwati R, Septiana A. Hubungan Dukungan Suami Dengan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Mengonsumsi Tablet Fe Di Puskesmas Jetis Yogyakarta. *J Ilmiah Bidan*. 2016;1(3).

29. Waryana. Gizi Reproduksi. Yogyakarta: Pustaka Rahima; 2015.
30. Bulkis AS. Hubungan Pola Konsumsi dengan Status Hemoglobin Pada Ibu Hamil di Kabupaten Gowa Tahun 2013. Universitas Hasanuddin Makassar; 2013.
31. Tewary K, Singh A. Anaemia in Pregnancy. 2017. 1–3 p.
32. Manuaba. Ilmu kebidanan Penyakit Kandungan dan KB. Jakarta: EGC; 2010.
33. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pemberian Tablet Tambah darah (TTD) Bagi Ibu Hamil pada Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
34. Herinawati, Titik Hindriati AN. Pengaruh Effleurage Massage terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif di Praktik Mandiri Bidan Nuriman Rafida dan Praktik Mandiri Bidan Latifah Kota Jambi Tahun 2019. J Ilm Univ Batanghari Jambi. 2019;19(3):590–601.
35. Sulistyawati A, Nugraheny E. Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin. Jakarta: Salemba Medika; 2015.
36. Walyani ES, Purwoastuti TE. Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Pustaka Baru Press; 2016.
37. Lailiyana, Laila A, Daiyah I, Susanti A. Asuhan Kebidanan Persalinan. Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2014.
38. Jannah N. ASKEB II Persalinan Berbasis Kompetensi. Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2015.
39. Kurniarum A. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan; 2016.
40. Kuswanti I, Melina F. Askeb II Persalinan (Cetakan I). Pustaka Pelajar; 2014.
41. Rini S, Kumala F. Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice. Yogyakarta: Deepublish; 2016.
42. Varney, Helen. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Edisi 4 Volume 2. Jakarta: EGC; 2017.
43. Heryani H. Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Dan Menyusui. Jakarta: CV Trans

- Info Media; 2014.
44. Wahyuningsih HP. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018.
 45. Saleha S. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Jakarta: Salemba Medika; 2015.
 46. Syafrudin, Damayanti D., Delminsta. Himpunan Penyuluhan Kesehatan. Jakarta: Trans Info Media; 2014.
 47. Marmi, Rahardjo K. Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Yogyakarta: Pustaka Media; 2015.
 48. Yetti A. Hubungan antara Persalinan Premature dengan Hiperbilirubin pada Neonatus. *J Kesehat.* 2014;2(2):109–12.
 49. Nanny DL. Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita. Jakarta: Salemba Timur; 2014.
 50. Handayani TE, Setiyani A, Sa'adab N, Magetan prodi kebidanan. Modul Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita. Surabaya: Prodi Kebidanan Magetan; 2018. 296 p.
 51. Setiyaningrum E Z. Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: CV Trans Info Media; 2015.
 52. Suratun. Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi Cetakan 3. Natawijaya, editor. Jakarta: Salemba Medika; 2013.
 53. Kemenkes RI. Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2016.
 54. Suwardono BP, Fatah MZ, Farid NN. Description of the Low Participation of Family Planning Acceptor in Bangkalan Regency. *J Promkes Indones J Heal Educ.* 2020;8(1):121–131.
 55. Manuaba IBG. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB. Jakarta: EGC; 2016.
 56. Wahyuni ED. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018.
 57. Nurgianti. Penurunan Libido Pada Akseptor Kb Suntik Dmpa (Depo Medroxy Progesteron Asetat) Terhadap Pola Adaptasi Seksual Dengan

- Pendekatan Model Adaptasi Callista Roy. Uin Alauddin Makassar. UIN Alauddin Makassar.; 2017.
58. Hartanto H. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 2015.
 59. Wahyuni ES. Kontrasepsi Hormon Progesteron. 2017. 1–105 p.
 60. Arum DNS, Sujiyatini. Panduan Lengkap Pelayanan KB terkini. Yogyakarta: Fitramaya; 2017.
 61. Nurlinda. Gambaran Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal Di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa. [Makassar]: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2016.
 62. Priyanti S, Syalfina AD. Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana. CV Kekata Group; 2017.
 63. Dewi RIS, Etriyanti, Nurhayati F. Berat Badan Akseptor KB Hormonal Dengan Akseptor KB Non Hormonal. J Abdimas Sainika. 2016;2(1):1–10.
 64. Yusita EP. Penggunaan Kontrasepsi dalam Praktik Klinik dan Komunitas. Jakarta: UB Press; 2019.
 65. Farid MF, Gosal FA. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Selassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. JST Kesehat. 2017;7(4):381–388.
 66. Apter D. Contraception options: Aspects unique to adolescent and young adult. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017;8(9):1–13.
 67. Jalilah NH, Prapitasari R. Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Penerbit Adab (CV Adanu Abimata); 2020.
 68. Hutagalung SP. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi oleh PUS di Puskesmas Rawang Pasar IV Kabupaten Asahan. 2018;
 69. Valentina T. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. 2019;
 70. Friedman M. Buku Ajar Keperawatan keluarga : Riset, Teori, dan Praktek.

- 1st ed. Jakarta: EGC; 2014.
71. Sari H, Yarmaliza, Zakiyuddin. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Samadua Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. *Jurmakesmas*. 2022;2(1):133–47.
 72. Wulandari E, Ramadhaniati Y, Eliagita C. Relationship between Sexual Patterns of Pregnant Women and the Occurrence of Premature Rupture of Membranes (KPD) in Kepahiang District Hospital. *Midwifery Heal J*. 2020;5(2).
 73. Winkjosastro H, Saifuddin AB, Rachimadhi T. Ilmu Kebidanan. 4th ed. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2014.
 74. Mentari KC. Hubungan Peran Suami melalui Breastfeeding Father dengan Kelancaran Pengeluaran ASI EKksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Cakru Kabupaten Jember. Universitas Negeri Jember; 2019.
 75. Maimunah R, Sitorus NY. Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Konsumsi Nutrisi Dan Peran Suami Terhadap Kelancaran Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Area Selatan Kota Medan Tahun 2020. *J Kebidanan Malahayati*. 2020;6(4):446–52.
 76. Bahiyatun. Buku Ajar Kebidanan Nifas Normal. Jakarta: EGC; 2015.
 77. Muftlilah, Johan RB, Ningsih SR. Breastfeeding Knowledge and Behavior in Lactational Amenorrhea Method (LAM) as a Natural Contraceptive. *Natl Public Heal JournalJournal*. 2021;16(4):242–9.
 78. Setiyani A, Sukesi, Esyuananik. Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, Dan Anak Pra Sekolah. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2016.
 79. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SOAP Kebidanan

PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Jalan Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 55143 Telp (0274) 374331

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY F UMUR 31 TAHUN G2P1AB0AH1

UK 33 MINGGU 6 HARI DENGAN DENGAN ANEMIA SEDANG

DI PUSKESMAS IMOGIRI I BANTUL

TANGGAL/JAM : 13 Desember 2022 Jam 08.30 WIB

(berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan dan catatan pada rekam medis dan buku KIA pasien Ny.F)

S	Identitas		
	BIODATA	Istri	Suami
	Nama :	Ny F	Tn. N
	Umur :	31 tahun	40 Tahun
	Pendidikan :	D4/S1	D4/S1 ilmu pemerintahan
	Pekerjaan :	Guru/wirausaha	Ketua RT/wirausaha
	Agama :	Islam	Islam
	Suku/ Bangsa :	Jawa/ Indonesia	Jawa/ Indonesia
	Alamat :	Dusun Kerten RT 007, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta	
	<p>Bidan datang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan <i>informed consent</i>. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan keduanya, dan ibu mengatakan tidak pernah keguguran. Anak pertama lahir tahun 2015 di tolong oleh dokter di RSKIA secara spontan dan di induksi atas indikasi KPD, BB lahir: 3500 gram, perempuan, tidak ada komplikasi dan ASI eksklusif. Riwayat kehamilan ini yaitu sejauh ini ibu telah melakukan ANC sebanyak 7 kali (Puskesmas Imogiri 1 dan Klinik MN, melakukan ANC terpadu di Puskesmas Imogiri 1 saat trimester II), dimana kunjungan awal ibu untuk ANC pada umur kehamilan 7 minggu.</p> <p>a. Riwayat Pernikahan</p> <p>Ny. F mengatakan ini merupakan pernikahan pertama dengan Tn. N, dan suami mengatakan ini juga pernikahan pertama. Menikah saat</p>		

	<p>berusia 23 tahun, dengan suami 8 tahun.</p> <p>b. Riwayat menstruasi Menarche umur 14 tahun. Siklus 298 hari, tidak teratur. Lama 7 hari. Sifat Darah: Encer. Flour Albus: tidak. Dysmenorhoe: tidak. Banyak Darah ganti pembalut 2-3 kali sehari. HPHT : 18-04-2022, HPL: 25-01-2023, umur kehamilan 33 minggu 6 hari.</p> <p>c. Riwayat KB Ny.F mengatakan belum pernah memakai KB.</p> <p>d. Riwayat kesehatan : Ibu mengatakan bahwa ibu tidak pernah/tidak sedang menderita penyakit menular (TBC, Hepatitis, PMS), menurun (DM,Asma,Hipertensi), dan menahun (jantung, paru, ginjal). Tetapi ayah kandungnya memiliki riwayat DM.</p> <p>e. Pola nutrisi : Makan sehari 3x, jenisnya nasi, sayur dan lauk(telur/ayam/daging). Minum air putih kurang lebih 8 gelas perhari dan teh 1 gelas/hari, tidak ada keluhan. Ny.F tidak mempunyai alergi obat ataupun makanan.</p> <p>f. Pola Aktivitas: Melakukan pekerjaan rumah tangga, wirausaha salon kecantikan, dan mengajar (fleksibel)</p> <p>g. Pola istirahat : tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 8 jam.</p> <p>h. Psikososial : Kehamilan ini diinginkan suami istri dan keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan ibu tentang kehamillan Ibu mengatakan sudah mengetahui tentang kehamilan. Bahwa masa kehamilan membutuhkan gizi dan istirahat yang cukup untuk perkembangan janin di dalam kandungan. 2. Pengetahuan ibu tentang kondisi/keadaan yang dialami sekarang Ibu mengatakan mengetahui bahwa keadaannya yang anemia. 3. Penerimaan ibu dan keluarga terhadap kehamilan saat ini Ibu mengatakan menerima kehamilan saat ini dan keluarga serta suami mendukung dan senang. 4. Persiapan/rencana persalinan Ibu mengatakan belum merencanakannya. 																
O	<p>a. Pemeriksaan umum</p> <table border="0"> <tr> <td>Keadaan umum</td> <td>: baik</td> <td>Kesadaran</td> <td>: composmentis</td> </tr> <tr> <td>BB sekarang</td> <td>: 60 kg</td> <td>BB sebelum hamil</td> <td>: 49 kg</td> </tr> <tr> <td>Suhu</td> <td>: 36,6 °C</td> <td>TD</td> <td>: 110/70 mmHg</td> </tr> <tr> <td>Nadi</td> <td>: 86 x/menit</td> <td>Respirasi</td> <td>: 20 kali/menit</td> </tr> </table>	Keadaan umum	: baik	Kesadaran	: composmentis	BB sekarang	: 60 kg	BB sebelum hamil	: 49 kg	Suhu	: 36,6 °C	TD	: 110/70 mmHg	Nadi	: 86 x/menit	Respirasi	: 20 kali/menit
Keadaan umum	: baik	Kesadaran	: composmentis														
BB sekarang	: 60 kg	BB sebelum hamil	: 49 kg														
Suhu	: 36,6 °C	TD	: 110/70 mmHg														
Nadi	: 86 x/menit	Respirasi	: 20 kali/menit														

	<p>Lila TM I : 24 cm TB : 155 cm IMT: $49/1,55^2 = 20,39$ (kategori normal)</p> <p>b. Pemeriksaan fisik</p> <p>Wajah : tidak pucat Mata : conjungtiva merah muda, sklera putih Leher : tidak ada pembengkakan vena juguralis/kelenjar limfe Abdomen : tidak ada bekas luka operasi Palpasi : 3 jari diatas pusat, fundus teraba bulat lunak tidak melenting, bagian kiri teraba bagian teraba keras memanjang, dibagian kiri teraba ekstremitas, presentasi kepala, kepala masih dapat digoyangkan (belum masuk panggul), konvergen.</p> <p>TFU : 27 cm TBJ : $(27-12) \times 155 = 2.325$ gram DJJ : 140 x/ menit</p> <p>Ekstremitas atas dan bawah : refleks patella (+), tidak terdapat odema pada kaki</p> <p>c. Pemeriksaan Penunjang</p> <p>Trimester II (ANC terpadu) tanggal 17/08/2022 di Puskesmas Imogiri 1</p> <p>Hb : 9,7 g/dL HIV : NR GDS : 85 mg/Dl Sifilis : NR Golongan darah: B+ HBsAg: NR Protein urine : Negatif</p> <p>Pemeriksaan lainnya (09/12/2022 di RSKIA S) hasil USG: usia kehamilan 32 minggu 3 hari, Janin hidup, tunggal, intrauterine, presentasi kepala, berat janin : 1,908 gram, plasenta: normal/tidak posterior, ketuban: cukup/ 4,73 cm.</p>
A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnosis Ny F Umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 UK 33 Minggu 6 Hari dengan Anemia Sedang. Janin tunggal, hidup, intrauterine, presentasi kepala. 2. Masalah Ibu belum melakukan pemeriksaan kadar Hb dan urin rutin di TM III, ibu mengetahui tanda bahaya kehamilan tua dan ibu memiliki riwayat keluarga dengan DM. 3. Kebutuhan Memberikan KIE tentang anemia dan penanganannya, memberikan KIE mengenai tanda bahaya kehamilan TM III dan menganjurkan untuk pemeriksaan kadar Hb dan urin rutin TM III di Puskesmas Imogiri 1, menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dengan mengurangi

	<p>karbohidrat atau makanan/minuman manis.</p> <p>4. Diagnosis potensial: Tidak ada</p> <p>5. Antisipasi tindakan segera: Tidak ada</p>
P	<p>13 Desember 2022 jam 08.30 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kondisi ibu dan janin baik yaitu TTV dalam batas normal dan Denyut Jantung Janin 140x/ menit serta usia kehamilan ibu saat ini 33 minggu 6 hari semakin mendekati aterm. Ibu memahami keadaannya 2. Melakukan informed consent atas ketersediaan ibu untuk didampingi selama masa kehamilan hingga berKB. Ibu telah menandatangani lembar informed consent. 3. Memberikan KIE mengenai pengertian anemia, faktor risiko anemia, komplikasi anemia, gejala anemia, pencegahan atau pengobatan untuk anemia, pola konsumsi tablet tambah darah ibu hamil dan peran suami dalam mengatasinya dengan menggunakan media leaflet. Ibu dapat memahaminya. 4. Menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi tablet Fe 2x sehari bersamaan dengan Vitamin C 2x sehari saat siang dan malam sebelum tidur, tidak minum menggunakan teh, kopi, susu, dan lainnya. Tablet kalsium diminum 1x sehari dipagi hari. 5. Ibu bersedia melanjutkan untuk mengkonsumsi obat Fe sesuai anjuran yang diberikan. 6. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan (berwarna merah/kuning) setiap hari atau mengatur pola makan yang mengandung zat besi dan tinggi protein seperti telur, daging, kacang-kacangan dan lain sebagainya serta menghindari minuman berkafein seperti teh/kopi agar tidak mengganggu penyerapan Fe didalam tubuh. Ibu bersedia dan berusaha untuk mengubah pola makan yang sehat bernutrisi sesuai dengan anjuran yang diberikan. 7. Memotivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan Hb sekaligus urine rutin di Puskesmas pada trimester III kehamilan supaya memantau kenaikan kadar Hb sesuai yang diharapkan. Ibu bersedia melaksanakan pemeriksaan sesuai anjuran yang diberikan dan rencana akan datang periksa ke Puskesmas tanggal 17/12/2022. 8. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dengan mengurangi karbohidrat atau makanan/minuman manis karena ibu memiliki riwayat keluarga dengan DM. Ibu paham dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan. 9. Menganjurkan suami untuk mendampingi ibu periksa kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan. Ibu paham dan akan menyampaikannya pada suami.

	<p>10. Menginformasikan kepada ibu tentang tanda bahaya pada TM III. Ibu mengetahui dan dapat menyebutkan tanda bahaya pada TM III.</p> <p>11. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi ke fasilitas kesehatan atau jika ada keluhan. Ibu bersedia melakukannya.</p>
--	--

CATATAN PERKEMBANGAN 1

(Kunjungan rumah berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan dan catatan pada buku KIA pasien Ny.F)

08 Januari 2023 Jam 16.00 WIB.

S	<p>Bidan datang melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan kehamilan dan ibu mengatakan mengatakan punggungnya sakit. Ibu mengatakan tanggal 26 Desember 2023 telah periksa ANC TM III ke Puskesmas Imogiri 1 Bantul untuk pemeriksaan Hb dan urin rutin. Ibu mengatakan saat ini sudah menghindari konsumsi minuman berkafein seperti kopi/the dan sebagainya.</p>
O	<p>a. Pemeriksaan umum</p> <p>Keadaan umum : baik</p> <p>Kesadaran : composmentis</p> <p>BB sekarang : 59 kg</p> <p>TD : 122/72 mmHg</p> <p>Suhu : 36,5 °C</p> <p>Nadi : 83 x/menit</p> <p>Respirasi : 20 kali/menit</p> <p>b. Pemeriksaan fisik</p> <p>Wajah : tidak pucat</p> <p>Mata : conjungtiva merah muda, sklera putih</p> <p>Leher : tidak ada pembengkakan vena jugularis/kelenjar limfe</p> <p>Abdomen : tidak ada bekas luka operasi</p> <p>Palpasi : 3 jari dibawah processus xiphoideus (33 cm), bagian atas bokong, punggung kiri, presentasi kepala, kepala dapat digoyangkan, konvergen (belum masuk panggul).</p> <p>TFU : 33 cm</p> <p>TBJ : $(33-12) \times 155 = 3,255$ gram</p> <p>DJJ : 137 x/ menit</p> <p>Ekstremitas atas dan bawah : refleks patella (+), tidak terdapat odema</p> <p>c. Pemeriksaan Penunjang</p> <p>TM III (26/12/2022 di Puskesmas Imogiri 1)</p> <p>Hb: 11,4 gr/dl, GDS: 82 mg/dl, Protein Urine: Negatif.</p>

A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnosis Ny F Umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 UK 37 Minggu 5 Hari janin tunggal, hidup, intrauterine dengan hamil normal 2. Masalah ibu mengatakan mengatakan punggungnya sakit dan di TM III belum pernah USG lagi. 3. Kebutuhan Memberikan KIE mengenai keluhan yang ibu rasakan, KIE tanda bahaya kehamilan TM III, KIE tanda-tanda persalinan dan P4K, KIE motivasi KB dan PHBS serta memotivasi ibu untuk USG TM III ke dokter kandungan. 4. Diagnosis potensial: Tidak ada 5. Antisipasi tindakan segera: Tidak ada
P	<p>08 Januari 2023 jam 16.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kondisi ibu dan janin baik yaitu TTV dalam batas normal, Denyut Jantung Janin 137x/menit, kadar Hb ibu dalam batas normal dan usia kehamilan ibu saat ini telah memasuki batas usia kehamilan yang ideal untuk persalinan yaitu 37 minggu-40 minggu. Ibu mengetahui keadaannya 2. Menjelaskan pada ibu bahwa keadaan nyeri pinggang merupakan hal wajar yang terjadi pada ibu hamil, keadaan itu terjadi dapat dikarenakan perut ibu yang semakin membesar sehingga postur ibu akan menyesuaikan ketika berdiri dan berjalan, hal lain dapat dikarenakan perubahan hormon dan peregangan ligament sebagai proses alami tubuh dalam proses persiapan persalinan. Cara mengatasinya dapat dilakukan tidur dengan posisi yang benar yaitu dengan miring kesamping, salah satu kaki ditekuk dan diberi bantal, pada bawah perut dan belakang punggung juga dapat diberi bantal. Tidak terlalu lama duduk atau berdiri, menghindari menggunakan alas kaki ber hak/sebaiknya yang datar. Ibu mengerti anjuran bidan dan akan melakukannya 3. Menganjurkan ibu tetap makan makanan yang bergizi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Ibu bersedia melakukannya 4. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe) dan calcium lactate yang diberikan bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ibu bersedia melakukannya 5. Memberitahukan kepada ibu tanda-tanda persalinan dan mengatakan pada ibu untuk tidak panik dan tetap tenang apabila tanda persalinan muncul. Gunakan untuk istirahat yang cukup, bisa juga jalan-jalan pagi atau sore, tetap memenuhi kebutuhan nutrisi dan jangan lupa berdoa. Memberikan konseling ibu diperbolehkan melakukan hubungan suami

	<p>istri karena sperma dari suami dapat menyebabkan kontraksi pada rahim ibu dan akan memicu terjadinya persalinan. Jika kencang-kencang semakin sering dan durasinya setiap 3 menit atau keluar air-air, maka segera datang ke bidan.</p> <p>Ibu dapat menyebutkan tanda-tanda persalinan dan memahami anjuran yang diberikan</p> <p>6. Menginformasikan kepada ibu tentang P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) untuk persiapan persalinan yang aman.</p> <p>Ibu telah memutuskannya dan orang yang akan mengantar atau mendampingi adalah suami, kendaraan yang digunakan yaitu motor pribadi, biaya persalinan oleh suami, persiapam donor darah dari semua anggota keluarga memiliki golongan darah O+ baik keluarga suami maupun ibu. Ibu dan suami sudah mantap berencana melahirkan di RS MK supaya tidak perlu khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat persalinan.</p> <p>7. Menginformasikan kembali kepada ibu tentang tanda bahaya pada TM III.</p> <p>Ibu mengetahui dan dapat menyebutkan tanda bahaya pada TM III</p> <p>8. Memberikan KIE motivasi KB pasca persalinan pada ibu.</p> <p>Ibu bersedia untuk mulai mendiskusikan keputusan ber-KB pasca salin bersama suaminya</p> <p>9. Memberikan KIE tentang PHBS pada ibu dan suami.</p> <p>Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia menerapkan PHBS.</p> <p>10. Memotivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan USG ke dokter spesialis kandungan minimal 1x di trimester III agar mengetahui lebih jelas/pasti mengenai keadaan janin sebagai persiapan persalinan yang aman.</p> <p>Ibu akan melakukannya seminggu sebelum HPL agar sekaligus janji temu persalinan di RS.</p> <p>11. Melakukan follow up melalui whatsapp.</p> <p>Telah dilakukan dan ibu merespon dengan baik dan mengatakan bahwa ibu telah melakukan pemeriksaan USG ke dokter kandungan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan hasil janin tunggal hidup intrauterine presentasi kepala sudah masuk PAP, TBJ: 3250 gram, air ketuban cukup dan plasenta letak fundus anterior. Ibu juga mengatakan telah membuat janji untuk bersalin di RS MK.</p> <p>12. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang 1 minggu lagi ke fasilitas kesehatan atau jika ibu merasa ada keluhan.</p> <p>Ibu bersedia melakukannya.</p>
--	---

PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Jalan Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 55143 Telp (0274) 374331

**ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN PADA NY F UMUR 31 TAHUN
G2P1AB0AH1 UMUR KEHAMILAN 39 MINGGU JANIN TUNGGAL,
HIDUP, INTRAUTERINE PRESENTASI KEPALA DALAM
PERSALINAN KALA I FASE LATEN DENGAN PERSALINAN NORMAL
DI RS MK**

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan buku KIA pasien Ny.F)

Tanggal 3 Februari 2023 Jam 02.00 WIB

S	Identitas		
	BIODATA	Istri	Suami
	Nama :	Ny F	Tn. N
	Umur :	31 tahun	40 Tahun
	Pendidikan :	D4/S1	D4/S1 ilmu pemerintahan
	Pekerjaan :	Guru/wirausaha	Ketua RT/wirausaha
	Agama :	Islam	Islam
	Suku/ Bangsa :	Jawa/ Indonesia	Jawa/ Indonesia
	Alamat :	Dusun Kerten RT 007, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta	
	<p>Ibu datang ke RS MK 18 Januari 2023 jam 05.00 WIB. Ny. F umur 31 tahun G2P1AB0AH1 Umur Kehamilan 39 Minggu mengeluh perut kram terasa seperti kenceng-kenceng sejak pukul 03.00 WIB.</p> <p>Riwayat Kehamilan, Persalinan dan nifas yang lalu yaitu ini merupakan kehamilan keduanya, dan ibu mengatakan tidak pernah keguguran. Anak pertama lahir tahun 2015 di tolong oleh Dokter di RSKIA secara spontan dan di induksi atas indikasi KPD, BB lahir: 3500 gram, perempuan, tidak ada komplikasi dan ASI eksklusif.</p> <p>a. Riwayat Pernikahan Ny. F mengatakan ini merupakan pernikahan pertama dengan Tn. N, dan suami mengatakan ini juga pernikahan pertama. Menikah saat berusia 23 tahun, dengan suami 8 tahun.</p> <p>b. Riwayat menstruasi Menarche umur 14 tahun. Siklus 298 hari, tidak teratur. Lama 7 hari. Sifat Darah: Encer. Flour Albus: tidak. Dysmenorhoe: tidak. Banyak Darah ganti pembalut 2-3 kali sehari.</p>		

	<p>HPHT : 18-04-2022, HPL: 25-01-2023, umur kehamilan 39 minggu.</p> <p>c. Riwayat KB Ny.F mengatakan belum pernah memakai KB.</p> <p>d. Riwayat kesehatan : Ibu mengatakan bahwa ibu tidak pernah/tidak sedang menderita penyakit menular (TBC, Hepatitis, PMS), menurun (DM,Asma,Hipertensi), dan menahun (jantung, paru, ginjal). Tetapi ayah kandungnya memiliki riwayat DM.</p> <p>e. Pola nutrisi : Makan sehari 3x, jenisnya nasi, sayur dan lauk(telur/ayam/daging). Minum air putih kurang lebih 8 gelas perhari dan teh 1 gelas/hari, tidak ada keluhan. Ny.F tidak mempunyai alergi obat ataupun makanan.</p> <p>f. Pola Aktivitas: Melakukan pekerjaan rumah tangga, wirausaha salon kecantikan, dan mengajar (fleksibel)</p> <p>g. Pola istirahat : tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 8 jam.</p> <p>h. Psikososial : Kehamilan ini diinginkan suami istri dan keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan ibu tentang persalinan Ibu mengatakan sudah mengetahui tentang persalinan. Bahwa masa persalinan membutuhkan gizi, istirahat dan semangat yang cukup untuk melahirkan bayi dan ari-arinya. 2. Pengetahuan ibu tentang kondisi/keadaan yang dialami sekarang Ibu mengatakan mengetahui bahwa keadaannya sekarang normal tanda persalinan dan tidak ada permasalahan. 3. Penerimaan ibu dan keluarga terhadap kehamilan saat ini Ibu mengatakan menerima kehamilan saat ini dan keluarga serta suami mendukung dan senang.
<p>O</p>	<p>a. Pemeriksaan umum</p> <p>Keadaan umum : baik Kesadaran : composmentis BB sekarang : 59 kg BB sebelum hamil : 49 kg TTV : Dalam batas normal Lila TM I : 24 cm TB : 155 cm IMT : $49 / 1,55^2 = 20,39$ (kategori normal)</p> <p>b. Pemeriksaan fisik: tidak ada kelainan ataupun komplikasi</p> <p>c. Pemeriksaan Penunjang Trimester II (ANC terpadu) tanggal 17/08/2022 di Puskesmas Imogiri 1</p> <p>Hb : 9,7 g/dL HIV : NR GDS : 85 mg/Dl Sifilis : NR</p>

	<p>Golongan darah: B+ HBsAg: NR</p> <p>Protein urine : Negatif</p> <p>Trimester III (26/12/2022 di Puskesmas Imogiri 1)</p> <p>Hb: 11,4 gr/dl, GDS: 82 mg/dl, Protein Urine: Negatif.</p> <p>USG (13 Januari 2023)</p> <p>janin tunggal hidup intrauterine presentasi kepala sudah masuk PAP, TBJ: 3250 gram, air ketuban cukup dan plasenta letak fundus anterior. Ibu juga mengatakan telah membuat janji untuk bersalin di RS MK.</p>
A	<p>Ny F umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 umur kehamilan 39 minggu janin tunggal, hidup, intrauterine presentasi kepala dalam persalinan kala I fase laten dengan persalinan normal</p>
P	<p>Tanggal 18 Januari 2023 Jam 05.00 WIB (dilakukan oleh Bidan jaga di RS MK berdasarkan pengkajian subjektif Ny. F)</p> <p>Memeriksa nadi ibu, kontraksi dan DJJ setiap 30 menit, serta tekanan darah, pembukaan, dan penurunan kepala setiap 4 jam atau jika ada indikasi.</p>

CATATAN PERKEMBANGAN

Tgl / Jam	DATA SUBJEKTIF	DATA OBJEKTIF	ANALISA	PENATALAKSANAN	
				JAM	KEGIATAN
18/01/ 2023 14.00 WIB	Ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin sering.	Keadaan umum: baik Kesadaran: composmentis TTV: dalam batas normal VT: Ø 4 cm	Ny F umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 umur kehamilan 39 minggu janin tunggal, hidup, intrauterine presentasi kepala dalam persalinan kala I fase aktif dengan persalinan normal	14.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu tentang keadaan ibu dan janin yaitu, TTV dalam batas normal, pembukaan 4 cm, DJJ normal. Ibu mengerti dan mengetahui kondisi diri maupun bayinya 2. Mengajukan keluarga ibu untuk memberikan asupan nutrisi dan minuman yang manis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu. Ibu makan nasi dan minum air putih dan teh 3. Mengajukan suami dan keluarga untuk mendampingi ibu dan memberi semangat Ibu didampingi dan sambil memijat punggung ibu. 4. Memeriksa nadi ibu, kontraksi dan DJJ setiap 30 menit, serta tekanan darah, pembukaan, dan penurunan kepala setiap 4 jam atau jika ada indikasi. Hasil telah di dokumentasikan. 5. Menyiapkan partus set, lingkungan, dan petugas serta peralatan bayi dan ibu. Semua yang dibutuhkan telah siap.
18/01/ 2023 18.00 WIB	Ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin kuat dan sering serta keluar lendir darah	Keadaan umum: baik Kesadaran: composmentis TTV: dalam batas normal VT: Ø 8 cm	Ny F umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 umur kehamilan 39 minggu janin tunggal, hidup, intrauterine presentasi	18.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu tentang keadaan ibu dan janin yaitu, TTV dalam batas normal, pembukaan 8 cm, DJJ normal. Ibu mengerti dan mengetahui kondisi diri maupun bayinya. 2. Memeriksa nadi ibu, kontraksi dan DJJ setiap 30 menit, serta tekanan darah, pembukaan, dan penurunan kepala setiap 4 jam atau jika ada indikasi.

	dari jalan lahir		kepala dalam persalinan kala I fase aktif dengan persalinan normal		Hasil telah di dokumentasikan.
18/01/2023 21.20 WIB	Ibu mengatakan kenceng-kencengnya semakin sering, keluar air-air yang tidak tertahankan dan ada keinginan untuk meneran seperti ingin BAB.	Keadaan umum: baik Kesadaran: composmentis TTV: dalam batas normal VT: Ø 10 cm, AK (+) jernih, STLD (+).	Ny F umur 31 tahun G2P1Ab0Ah1 umur kehamilan 39 minggu janin tunggal, hidup, intrauterine presentasi kepala dalam persalinan kala II dengan persalinan normal	21.20	Bayi lahir spontan, Jenis Kelamin: Perempuan, pukul 22.00 WIB.
18-01-2023 22.00 WIB	Ibu mengatakan perut mulas	Keadaan umum: baik Kesadaran ibu composmentis TTV dalam batas normal, abdomen dan genitalia dalam batas normal.	Ny F Umur 31 tahun P2AB0AH2 dalam persalinan kala III persalinan normal	22.00	Plasenta lahir lengkap pukul 22.10 WIB
18-01-2023	Ibu mengatakan perut mulas	Keadaan umum: baik Kesadaran: compos	Ny F Umur 31 tahun P2AB0AH2	22.25	1. Melakukan penjahitan Telah dilakukan 2. Melakukan pemantauan kala IV.

22.25 WIB	dan perih di jalan lahir	mentis Tanda vital ibu dalam batas normal. Abdomen tidak ada kelainan dan perdarahan dalam batas normal	dalam persalinan kala IV persalinan normal		Telah dilakukan dan telah dicatat pada partograf
--------------	-----------------------------	---	---	--	--

**ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR NORMAL PADA
BY.NY.F USIA 1 JAM DI RS MK**

TANGGAL/JAM : 18 Januari 2023 Jam 23.00 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan buku KIA pasien Ny.F)

S	Ibu mengatakan melahirkan anak keduanya. Bayi lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.00 WIB, umur kehamilan 39 Minggu, jenis kelamin perempuan lahir menangis kuat, tonus otot baik, bernafas normal.
O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan Umum : Baik 2. Penilaian awal <ol style="list-style-type: none"> a. Menangis Kuat : Ya b. Warna Kulit : Kemerahan c. Tonus Otot : Bergerak Aktif 3. Pemeriksaan Antropometri <ol style="list-style-type: none"> a. Berat Badan : 3300 gram b. Panjang Badan : 50 cm c. Lingkar Kepala : 34 cm d. Lingkar Dada : 33 cm e. Lila : 10.5 cm 4. Tanda – Tanda Vital Dalam batas normal 5. Pemeriksaan fisik Tidak ada kelainan 6. Reflek Tidak ada kelainan
A	By.Ny.F usia 1 jam bayi baru lahir normal, cukup bulan sesuai masa kehamilan
P	<p>18 Januari 2023 Jam 23.00 WIB (dilakukan oleh Bidan jaga di RS MK berdasarkan pengkajian subjektif Ny. F)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penimbangan atau pengukuran bayi, memberi salep mata antibiotic profilaksis untuk mencegah infeksi mata, dan vitamin K 1 mg untuk mencegah perdarahan secara intramuskular di paha kiri anterolateral. Telah dilakukan antropometri dan diberi tetes mata dan injeksi Vit K 1 mg.

	<p>2. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir secara menyeluruh meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan head to toe. TTV dalam batas normal dan keadaan fisik bayi normal.</p> <p>3. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, memberikan suntikan imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis B pada bayi di paha kanan anterolateral secara IM. Imunisasi telah diberikan dan bayi menangis.</p> <p>4. Menjaga kehangatan suhu bayi dengan menyelimuti menggunakan kain dan memakaikan kepala bayi dengan topi. Bayi dalam keadaan hangat.</p> <p>5. Melakukan pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir dengan memantau dan mencegah keadaan yang lebih buruk pada bayi baru lahir normal. Telah dilakukan.</p> <p>6. Melakukan rawat gabung bayi dengan ibu di ruang perawatan nifas. Telah dilakukan</p>
--	---

PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Jalan Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 55143 Telp (0274) 374331

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. F UMUR 31 TAHUN P2AB0AH2 8 JAM POST PARTUM DENGAN NIFAS NORMAL DI RS MK DAN KUNJUNGAN RUMAH

TANGGAL/JAM : 19 Januari 2023 Jam 06.00 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan buku KIA pasien Ny.F)

S	Identitas		
	BIODATA	Istri	Suami
	Nama :	Ny F	Tn. N
	Umur :	31 tahun	40 Tahun
	Pendidikan :	D4/S1	D4/S1 ilmu pemerintahan
	Pekerjaan :	Guru/wirausaha	Ketua RT/wirausaha
	Agama :	Islam	Islam
	Suku/ Bangsa :	Jawa/ Indonesia	Jawa/ Indonesia
	Alamat :	Dusun Kerten RT 007, Desa Imogiri, Kecamatan	

	<p style="text-align: center;">Imogiri, Bantul, Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan utama Ibu melahirkan tanggal 18 Januari 2023 jam 22.00 WIB. Ibu mengatakan masih terasa sedikit lelah, perut masih terasa mulas dan sakit pada bagian jalan lahir. Ibu mengatakan sudah BAK ke kamar mandi, tetapi belum BAB. 2. Riwayat persalinan sekarang Tempat persalinan : RS MK Tanggal persalinan : 18 Januari 2023 Jenis persalinan : Spontan Penolong : Bidan Plasenta : Lengkap Lama persalinan kala II : 40 menit Komplikasi: tidak ada 3. Riwayat bayi baru lahir Lahir : Normal Tanggal : 18 Januari 2023 BB/PB : 3300 gram / 50 cm LK/LD/Lila : 34 cm/ 33 cm/ 10.5 cm Jenis kelamin : Perempuan Apgar Score : 8/9/10 Komplikasi : tidak ada 4. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari <ol style="list-style-type: none"> a. Nutrisi: Makan: 1x, porsi 1 piring jenisnya nasi, sayur, lauk. Minum: 2x, 1 gelas, jenisnya air putih dan teh manis b. Istirahat: ibu mengatakan selama 8 jam setelah melahirkan sudah tidur kurang lebih 1,5 jam c. Pola eliminasi : BAB dan BAK tidak ada keluhan d. Pola aktivitas : Ibu mengatakan sudah bisa duduk dan jalan
O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum : baik b. Kesadaran : composmentis c. Vital sign : dalam batas normal 2. Pemeriksaan fisik Dalam batas normal dan tidak ada komplikasi
A	Ny F Umur 31 tahun P2AB0AH2 8 jam post partum dengan nifas normal

P

Tanggal: 19 Januari 2023 Jam 06.00 WIB (dilakukan oleh Bidan jaga di RS MK berdasarkan pengkajian subjektif Ny. F)

1. Memberitahu tentang hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam kondisi normal dan menjelaskan mengenai keluhannya adalah hal yang normal dimasa nifas.
Ibu mengerti dan mengetahui kondisinya
2. Menganjurkan ibu untuk makan makanan bergizi, makanan yang mengandung protein, vitamin dan mineral, seperti telur, ikan laut, sayur dan sebagainya serta minum air mineral setiap selesai menyusui.
Ibu akan melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk tidak menahan BAK dan BAB agar kondisi ibu cepat dalam pemulihan dan tidak mengalami infeksi.
Ibu mengerti.
4. Melakukan hubungan bounding antara ibu dan bayinya.
Ibu melakukan bounding
5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup apabila bayinya tidur, ibu juga tidur agar stamina ibu tetap terjaga.
Ibu mengerti
6. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan pada bayinya agar nutrisi bayi baik.
Ibu mengerti dan berencana memberikan ASI secara eksklusif
7. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya minimal 2 jam sekali agar kebutuhan nutrisi bayi baik.
Ibu mengerti
8. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan genetaliannya yaitu dengan cara mengganti pembalut sesering mungkin/ganti pembalut 3-4 kali perhari untuk mencegah terjadinya infeksi.
Ibu mengerti dan akan melakukannya
9. Menjelaskan tanda bahaya masa nifas kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya nifas seperti pusing, demam, kontraksi uterus lembek dan perdarahan yang keluar seperti air keran mengalir untuk segera melapor pada bidan jaga.
Ibu dan keluarga mengerti
10. Memberikan terapi obat yaitu vitamin A 100.000 unit diminum 1x1 sebanyak 2 kapsul untuk mencegah perdarahan, amoxilin 500 mg diminum 3x1 sebanyak 15 tablet untuk mencegah infeksi, paracetamol 500 mg diminum 3x1 sebanyak 10 tablet untuk meringankan rasa nyeri jalan lahir dan tablet tambah darah diminum 1x1 sebanyak 10 tablet untuk mengganti kehilangan darah selama persalinan.
Ibu bersedia meminum sesuai anjuran.
11. Memindahkan ibu ke ruang perawatan nifas bersama bayinya.
Ibu dan bayi telah rawat gabung di ruang nifas.
12. Memperbolehkan ibu pulang dari RS sesuai advice dokter.

Ibu pulang tanggal 20 Januari 2023 jam 11.00 WIB.

CATATAN PERKEMBANGAN 1

TANGGAL/JAM : 24 Januari 2023 Jam 14.30 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien Ny.F)

S	Ibu mengatakan bekas jahitan masih sedikit sakit, dan ASI nya lancar, ibu memberikan ASI secara on demand atau sesuai keinginan bayi. Ibu tidak minum jamu atau melakukan budaya yang berkaitan pada masa nifas karena dalam keluarganya tidak menganut budaya atau kebiasaan seperti itu. Ibu sudah bisa BAK dan BAB. Ibu mengatakan belum ada rencana ber-KB.
O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum : baik b. Kesadaran : composmentis c. Vital sign : Tekanan darah : 120/70, Nadi: 78x/menit, Respirasi: 20x/menit, Suhu: 36,5 C 2. Pemeriksaan fisik <p>Mata : Sklera putih konjungtiva merah mudah</p> <p>Payudara : Simetris, bersih, payudara menggantung, puting menonjol, ada hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, ASI keluar (peralihan/transisi)</p> <p>Abdomen : tidak ada bekas operasi, pertengahan antara simpisis dan pusat, kontraksi keras, kandung kemih kosong</p> <p>Genetalia : terdapat luka perineum baik dan tidak ada pengeluaran nanah.dan PPV dalam batas normal</p> <p>Lochea : sanguilenta, warna merah kekuningan, bau khas</p>
A	Ny. F umur 31 tahun P2Ab0Ah2 6 hari post partum dengan nifas normal
P	<p>Tanggal: 24 Januari 2023 Jam 14.30 WIB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik. Ibu mengetahui kondisinya 2. Menjelaskan pada ibu mengenai keluhannya bahwa nyeri jahitan jalan

lahir merupakan hal yang normal karena sedang dalam masa penyembuhan sehingga ibu tidak perlu khawatir dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya.

Ibu dapat memahaminya

3. Mengajarkan teknik menyusui yang baik dan benar untuk memaksimalkan pemberian ASI pada bayi dengan cara ibu berbaring atau duduk bersandar. Sebelum dan setelah menyusui, ibu mengeluarkan asi lalu dioleskan pada puting. Bayi disanggah dengan satu tangan, kepala bayi berada di bagian siku ibu dan bokong bayi di lengan bagian bawah ibu. Perut ibu dan bayi menempel dengan kepala bayi menghadap ke payudara ibu, telinga dan bahu bayi berada dalam satu garis lurus. Ibu memegang payudara dengan jari tangan membentuk huruf C dengan ibu jadi di atas dan empat jari lain menopang payudara. Rangsang bayi untuk membuka mulutnya dengan menempelkan puting pada pipi atau sudut mulut bayi, jika mulut bayi sudah terbuka segera masukkan payudara ke dalam mulut bayi. Lepaskan sanggahan tangan pada payudara jika bayi sudah menghisap. Amati bayi selama menyusu dan masukkan jari kelingking ke sudut mulut bayi sambil menekan lidah atau menekan dagu bayi kebawah untuk melepaskan isapan bayi pada payudara ibu. Kemudian oleskan ASI kembali pada puting setelah menyusui.

Ibu telah mempraktekkan langsung pada bayinya.

4. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif tanpa memberikan makanan lain kepada bayinya minimal selama 6 bulan dan ASI diberikan minimal tiap 2 jam atau jika bayi memintanya.

Ibu mengerti dan akan melakukannya.

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar nutrisi ibu baik dan tinggi protein agar mempercepat penyembuhan luka jahitan perineum. Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut:

- a. Mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari.
- b. Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup.
- c. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari.
- d. Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, setidaknya selama 40 hari pascapersalinan.
- e. Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

Ibu mengerti dan akan melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh terutama alat kelaminnya serta menganjurkan ibu untuk mengganti pembalut 3-4 kali/hari untuk mencegah terjadinya infeksi.

Ibu mengerti dan akan melakukannya

	<p>7. Memberitahu ibu kegawatdaruratan dirumah seperti terjadi perdarahan yang banyak, rahim ibu tidak berkontraksi dengan baik (lembek), payudara keras nyeri hingga kemerahan, terdapat masalah dengan bayi seperti bayi kuning, tali pusat berdarah bernanah dan bau, bayi sulit tidur, demam, dan diare. Ibu memahaminya dan akan segera ke fasilitas kesehatan apabila terjadi.</p> <p>8. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan konsumsi tablet tambah darah dari bidan. Ibu bersedia melakukannya</p> <p>9. Memberikan KIE tentang KB, jenis, kelebihan, kekurangan dan efek sampingnya kepada ibu. Ibu dapat memahaminya dan akan mendiskusikannya kembali dengan suami.</p> <p>10. Menjadwalkan kunjungan ulang 1 atau 2 minggu lagi atau bila ada keluhan. Ibu mengerti dan mengetahui kapan harus periksa kembali ke fasilitas kesehatan.</p>
--	--

CATATAN PERKEMBANGAN 2

TANGGAL/JAM : 1 Februari 2023 Jam 13.30 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien Ny.F)

S	Ibu mengatakan keadaannya sudah membaik dapat beraktivitas seperti biasa dan tidak ada keluhan. Ibu mengatakan dirinya belum memutuskan perihal KB dengan suaminya.
O	<p>1. Pemeriksaan umum</p> <p>a. Keadaan umum : baik</p> <p>b. Kesadaran : composmentis</p> <p>c. Vital sign : Tekanan darah : 110/70 mmHg, N:86 kali/menit, R:20 kali/menit, S: 36,7 °C</p> <p>2. Pemeriksaan fisik</p> <p>Mata : Sklera putih konjungtiva merah mudah</p> <p>Payudara : Simetris, bersih, payudara menggantung, puting menonjol, ada hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, ASI keluar (matur)</p> <p>Abdomen : tidak ada bekas operasi, TFU sudah tidak teraba, kontraksi keras</p> <p>Genetalia : terdapat luka perineum sudah kering dan baik</p>

	Lochea : alba, warna putih, bau khas
A	Ny. F umur 31 tahun P2Ab0Ah2 14 hari post partum dengan nifas normal
P	<p>Tanggal: 1 Februari 2023 Jam 13.30 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik. Ibu mengetahui kondisinya 2. Mengingatkan kembali kebutuhan nutrisi pada masa nifas yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ibu mengerti dan telah makan makanan yang bergizi 3. Menganjurkan ibu kembali untuk tetap menyusui bayinya sampai 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan. Ibu akan tetap menyusui bayinya sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping 4. Menganjurkan ibu untuk tetap meneruskan pola kehidupan atau aktifitas sehari-hari yang sudah dilaksanakan dengan baik. Ibu mengerti 5. Menganjurkan ibu ke tenaga kesehatan apabila terdapat tanda-tanda seperti demam tinggi, perdarahan tidak normal, dan sakit kepala yang hebat. Ibu akan segera periksa apabila terdapat tanda-tanda di atas. 6. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan konsumsi tablet tambah darah dari bidan. Ibu bersedia melakukannya 7. Memotivasi ibu agar tetap ber-KB secara dini untuk memberikan jarak kehamilan dengan anak keduanya agar lebih fokus merawat bayinya saat ini. Ibu memahaminya dan mengatakan masih akan diskusi kembali dengan suaminya. 8. Memberikan motivasi pada ibu untuk ber-KB jangka panjang pasca nifas berakhir yang tidak mengganggu produksi ASI seperti suntik progestin, implant, dan IUD sesuai kondisi ibu. Ibu mengerti dengan penjelasan bidan dan akan mendiskusikannya kembali bersama suami. 9. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang ke fasilitas kesehatan 2 minggu lagi atau bila ada keluhan. Ibu mengerti dan mengetahui kapan harus periksa kembali ke fasilitas kesehatan. 10. Menjadwalkan kunjungan terakhir nifas untuk memastikan KB dan jika

ada masalah terkait kesehatan ibu maupun bayinya. Ibu bersedia dilakukan kunjungan lagi.

CATATAN PERKEMBANGAN 3

TANGGAL/JAM : 15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien Ny.F)

S	Ibu mengatakan tidak ada keluhan dan beraktivitas seperti biasa. Ibu mengatakan suami dan dirinya ingin KB yang tidak memakai alat dan tidak ingin yang jangka panjang karena ada rencana program hamil kembali sedangkan menstruasi ibu tidak teratur dan sebelumnya sulit untuk hamil anak keduanya ini.
O	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum : baik Kesadaran : composmentis Vital sign : TD : 120/80 mmHg, N:78 kali/menit, R: 20 kali/menit, S: 36,5 °C Pemeriksaan fisik <p>Mata : Sklera putih konjungtiva merah mudah</p> <p>Payudara : Simetris, bersih, payudara menggantung, puting menonjol, ada hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, ASI keluar (matur)</p> <p>Abdomen : tidak ada bekas operasi, TFU sudah tidak teraba</p> <p>Genetalia : terdapat luka perineum sudah kering dan baik</p> <p>Lochea : alba, warna putih, bau khas</p>
A	Ny. F umur 31 tahun P2Ab0Ah2 28 hari post partum dengan nifas normal
P	<p>15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik. Ibu mengetahui kondisinya Mengingatkan kembali kebutuhan nutrisi pada masa nifas yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ibu mengerti dan telah makan makanan yang bergizi Menganjurkan ibu untuk tetap meneruskan pola kehidupan atau aktifitas sehari-hari yang sudah dilaksanakan dengan baik. Ibu mengerti Menganjurkan ibu ke tenaga kesehatan apabila terdapat tanda-tanda seperti demam tinggi, perdarahan tidak normal, dan sakit kepala yang hebat.

	<p>Ibu akan segera periksa apabila terdapat tanda-tanda di atas.</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan konsumsi tablet tambah darah dari bidan. Ibu bersedia melakukannya</p> <p>6. Memberikan konseling KB kembali kepada ibu agar dapat ber-KB pasca nifas berakhir lalu menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi terbagi menjadi 3 jenis yaitu alamiah, hormonal dan non hormonal. Alamiah seperti MAL, metode kalender dan suhu basal. KB hormonal seperti pil, suntik dan implant. Sedangkan KB non hormonal seperti IUD, kondom dan MOW/MOP. Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan dan mengatakan ingin menggunakan KB alamiah.</p> <p>7. Menjelaskan kepada ibu mengenai metode KB alamiah, jenis-jenisnya, kekurangan dan kelebihanannya. Ibu paham dan ingin KB alami yaitu MAL.</p> <p>8. Menjelaskan kepada ibu mengenai KB MAL, keefektifannya, caranya, kelebihan dan kekurangannya. Ibu paham dan bersedia menerapkan KB MAL dari saat ini.</p> <p>9. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila ada keluhan atau ingin mengganti metode KB ke fasilitas terdekat. Ibu paham dan bersedia</p>
--	---

PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Jalan Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 55143 Telp (0274) 374331

**ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY F USIA 1 HARI CUKUP BULAN,
SESUAI MASA KEHAMILAN, NORMAL DI RS MK DAN KUNJUNGAN
RUMAH**

TANGGAL/JAM : 19 Januari 2023 Jam 23.00 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan buku KIA pada pasien Ny.F)

S	Identitas		
	Nama Bayi : Ny. F		
	Usia : 1 hari		
	Jenis Kelamin : Perempuan		
	BIODATA		
		Ibu	Ayah
	Nama :	Ny F	Tn. N
	Umur :	31 tahun	40 Tahun
	Pendidikan :	D4/S1	D4/S1 ilmu pemerintahan
	Pekerjaan :	Guru/wirausaha	Ketua RT/wirausaha
	Agama :	Islam	Islam
	Suku/ Bangsa :	Jawa/ Indonesia	Jawa/ Indonesia
	Alamat :	Dusun Kerten RT 007, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta	
	1. Keluhan utama		
	Ibu mengatakan bayinya lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, umur kehamilan 39 Minggu, sudah BAB 1 kali dan BAK 2 kali.		
	2. Riwayat persalinan sekarang		
	Tempat persalinan : RS MK		
	Tanggal persalinan : 18 Januari 2023		
	Jenis persalinan : Spontan		
	Penolong : Bidan		
Plasenta : Lengkap			
Lama persalinan kala II : 40 menit			
Komplikasi: tidak ada			
3. Riwayat bayi baru lahir			
Lahir : Normal			
Tanggal : 18 Januari 2023 jam 22.00 WIB			

	<p>BB/PB : 3300 gram / 50 cm LK/LD/Lila : 34 cm/ 33 cm/ 10.5 cm Jenis kelamin : Perempuan Apgar Score : 8/9/10 Komplikasi : tidak ada</p> <p>4. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari Nutrisi : bayi menyusu dengan kuat dan sering, tidak ada keluhan Pola eliminasi : BAB : 1x, warna coklat kehitaman, konsistensi lembek, tidak ada keluhan BAK : 2x, warna jernih, tidak ada keluhan Riwayat imunisasi : ibu mengatakan sudah diberi imunisasi Hb0 setelah bayi lahir</p>
O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan Umum : Baik 2. Pemeriksaan Antropometri <ol style="list-style-type: none"> a. Berat Badan : 3300 gram b. Panjang Badan : 50 cm 3. Tanda – Tanda Vital Dalam batas normal 4. Pemeriksaan fisik Tidak ada kelainan 5. Reflek Tidak ada kelainan
A	Bayi Ny F usia 1 hari cukup bulan, sesuai masa kehamilan, normal.
P	<p>19 Januari 2023 Jam 23.00 WIB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik. Ibu mengerti. 2. Menganjurkan ibu untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi seperti mencuci tangan sebelum meneteki (menyusui) bayinya. Ibu mengerti. 3. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebutuhan nutrisi bayi seperti memberikan ASI secara on demand/sesuai kebutuhan bayi minimal setiap 2-3 jam untuk pemenuhan gizi. Semakin sering bayi disusui maka akan semakin lancar produksi ASI sehingga dapat mencukupi kebutuhan asupan dan mempercepat pertumbuhan serta perkembangan bayi. Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran bidan. 4. Menjelaskan mengenai ASI eksklusif yaitu memberikan ASI saja tanpa

	<p>minuman/makanan tambahan apapun kecuali obat hingga bayinya berusia 6 bulan, manfaatnya untuk membentuk antibodi/daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak mudah terkena penyakit dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bayi.</p> <p>Ibu paham dan bersedia</p> <p>5. Memberikan KIE tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.</p> <p>6. Memberikan KIE perawatan tali pusat yaitu dengan membersihkan tali pusat bayi saat mandi lalu dikeringkan dan dibiarkan saja tidak perlu diolesi minyak dan lain-lain, prinsipnya tetap bersih dan kering. Ibu mengerti dan akan melakukannya.</p> <p>7. Menganjurkan ibu untuk melanjutkan imunisasi selanjutnya yaitu imunisasi BCG yang sudah dapat diberikan saat usia 1 bulan, manfaatnya untuk mencegah penyakit TBC. Ibu mengerti dan akan melakukannya.</p> <p>8. Menganjurkan ibu untuk kontrol rutin bayi pada rentang usia 3-7 hari atau kunjungan ke-2. Ibu paham.</p> <p>9. Memperbolehkan bayi pulang sesuai advice dokter. Bayi dipulangkan bersama dengan ibu pada 20 Januari 2023 jam 11.00 WIB.</p>
--	--

CATATAN PERKEMBANGAN 1

TANGGAL/JAM : 24 Januari 2023 Jam 14.30 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik bayi)

S	<p>Identitas</p> <p>Nama Bayi : By. A</p> <p>Usia : 6 hari</p> <p>Jenis Kelamin : Perempuan</p> <p>1. Keluhan utama</p> <p>Ibu mengatakan bayi lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.00, umur kehamilan 39 minggu jenis kelamin perempuan. Lahir menangis, tonus otot baik, bernafas normal. Saat ini tidak ada keluhan. BAK dan BAB lancar dalam batas normal, menyusu kuat. Ibu mengatakan tali pusat bayi telah puput tadi pagi.</p> <p>2. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari</p> <p>Nutrisi : bayi menyusu dengan kuat dan sering, tidak ada keluhan</p>
----------	---

	<p>Pola eliminasi : BAB : 3-4x sehari, warna coklat kehitaman, konsistensi lembek, tidak ada keluhan</p> <p>BAK : 5-6x sehari, warna jernih, tidak ada keluhan</p> <p>Riwayat imunisasi : ibu mengatakan sudah diberi imunisasi Hb0 setelah bayi lahir</p>
O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan Umum : Baik 2. Tanda – Tanda Vital <ul style="list-style-type: none"> Denyut Jantung Bayi : 130 x/menit Pernapasan : 45 x/menit Suhu : 36,6°C BB: 3400 gram PB: 50 cm 3. Pemeriksaan fisik <ul style="list-style-type: none"> Kulit : Berwarna kemerahan Umbilikal : Telah puput tadi pagi (24 Januari 2023) Anus : Terdapat lubang anus
A	Bayi A usia 6 hari cukup bulan, sesuai masa kehamilan, normal.
P	<p>24 Januari 2023 Jam 14.30 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik. Ibu mengerti dan mengetahui kondisinya. 2. Mengajukan kepada ibu untuk membawa bayinya ke tenaga kesehatan atau posyandu untuk diimunisasi sesuai umur bayinya dan membawa buku KIA apabila imunisasi. Ibu mengerti dan bersedia bayinya untuk diimunisasi. 3. Menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya ASI Eksklusif untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi setiap 2 jam selama 6 bulan. Ibu mengerti dan akan melakukannya. 4. Mengajukan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya dengan mandi setidaknya 2 kali/hari. Ibu mengerti dan telah melakukannya. 5. Mengajukan ibu untuk menjaga kebersihan bayi seperti sering mengganti popok untuk mencegah terjadinya ruam popok. Ibu mengerti. 6. Mengajukan ibu agar menjaga dan mempertahankan suhu tubuh bayi tetap hangat dengan menyelimuti dan pasang topi. Ibu mengerti dan akan melakukannya.

	<p>7. Memberikan KIE tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, meliputi tidak mau menyusui, kejang-kejang, lemah, sesak nafas (lebih dari 60x/menit dan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam), bayi merintih atau menangis terus menerus, tali pusat kemerahan sampai dinding perut (berbau dan bernanah), demam tinggi, mata bayi bernanah, diare/buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari, kulit dan mata bayi kuning, dan tinja bayi berwarna pucat saat buang air. Menganjurkan ibu untuk membawa bayi ke tenaga kesehatan apabila mendapatkan salah satu tanda diatas. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.</p> <p>8. Menganjurkan ibu untuk rutin mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan. Ibu mengerti.</p> <p>9. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang ke fasilitas terdekat saat usia bayi 8-28 hari/kunjungan ke-3 sekaligus imunisasi BCG. Ibu paham.</p>
--	--

CATATAN PERKEMBANGAN 2

TANGGAL/JAM : 15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik bayi serta buku KIA)

S	<p>Identitas Nama Bayi : By. A Usia : 28 hari Jenis Kelamin : Perempuan</p> <p>Ibu mengatakan bayi lahir spontan tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.00 di RS MK, umur kehamilan 39 minggu, jenis kelamin perempuan. Lahir spontan menangis, tonus otot baik, bernafas normal. Saat ini tidak ada keluhan. BAK dan BAB lancar dalam batas normal, menyusu kuat dan telah imunisasi BCG di Bidan tanggal 12 Februari 2023.</p>
O	<p>Keadaan Umum : Baik Tanda – Tanda Vital: Denyut Jantung Bayi : 137 x/menit Pernapasan : 44 x/menit Suhu : 36,6°C BB: 3700 gram, PB: 51 cm, kulit kemerahan.</p>

A	Bayi A usia 28 hari cukup bulan, sesuai masa kehamilan, normal.
P	<p>15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik. Ibu mengerti dan mengetahui kondisinya. 2. Menganjurkan kepada ibu untuk membawa bayinya ke tenaga kesehatan atau posyandu untuk diimunisasi selanjutnya sesuai umur bayi dan membawa buku KIA apabila imunisasi. Ibu mengerti dan bersedia bayinya untuk diimunisasi. 3. Menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya ASI Eksklusif untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi setiap 2 jam selama 6 bulan. Ibu mengerti dan akan melakukannya. 4. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya dengan mandi setidaknya 2 kali/hari. Ibu mengerti dan telah melakukannya. 5. Menganjurkan ibu agar menjaga dan mempertahankan suhu tubuh bayi tetap hangat dengan menyelimuti dan pasang topi. Ibu mengerti dan akan melakukannya. 6. Menganjurkan ibu untuk rutin mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan. Ibu mengerti 7. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas terdekat apabila ada keluhan dengan bayinya. Ibu paham.

CATATAN PERKEMBANGAN KB

TANGGAL/JAM : 15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.

(Data berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien Ny.F)

S	<p>BIODATA</p> <p>Nama : Ny F</p> <p>Umur : 31 tahun</p> <p>Pendidikan : D4/S1</p> <p>Pekerjaan : Guru/wirausaha</p> <p>Agama : Islam</p> <p>Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia</p> <p>Alamat : Dusun Kerten RT 007, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta</p>	<p>Istri</p> <p>Suami</p> <p>Tn. N</p> <p>40 Tahun</p> <p>D4/S1 ilmu pemerintahan</p> <p>Ketua RT/wirausaha</p> <p>Islam</p> <p>Jawa/ Indonesia</p>
----------	--	---

	<p>Ibu mengatakan suami dan dirinya ingin KB yang tidak memakai alat dan tidak ingin yang jangka panjang karena ada rencana program hamil kembali sedangkan menstruasi ibu tidak teratur dan sebelumnya sulit untuk hamil anak keduanya ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Riwayat menstruasi Menarche umur 14 tahun. Siklus 28 hari, teratur. Lama 5-7 hari. Sifat Darah: Encer. Flour Albus: tidak. Dysmenorhoe: tidak. Banyak Darah ganti pembalut 2-3 kali sehari. HPHT : belum mendapat menstruasi. b. Riwayat KB Ny.F mengatakan belum pernah memakai KB. c. Riwayat kesehatan Ibu mengatakan bahwa ibu tidak pernah/tidak sedang menderita penyakit menular (TBC, Hepatitis, PMS), menurun (DM, Asma, Hipertensi), dan menahun (jantung, paru, ginjal). Tetapi ada riwayat keluarga dengan DM yaitu ayah kandung.
O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum : baik b. Kesadaran : composmentis c. Vital sign : TD : 120/80 mmHg, N:78 kali/menit, R: 20 kali/menit, S: 36,5 °C d. BB saat ini : 54 kg
A	Ny. F umur 31 tahun P2Ab0Ah2 akseptor baru KB alamiah (MAL)
P	<p>15 Februari 2023 Jam 14.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik. Ibu mengetahui kondisinya 2. Memberikan konseling KB kembali kepada ibu agar dapat ber-KB pasca nifas berakhir lalu menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi terbagi menjadi 3 jenis yaitu alamiah, hormonal dan non hormonal. Alamiah seperti MAL, metode kalender dan suhu basal. KB hormonal seperti pil, suntik dan implant. Sedangkan KB non hormonal seperti IUD, kondom dan MOW/MOP. Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan dan mengatakan ingin menggunakan KB alamiah. 3. Menjelaskan kepada ibu mengenai metode KB alamiah, jenis-jenisnya, kekurangan dan kelebihanannya. Ibu paham dan ingin KB alami yaitu MAL.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="419 297 1402 383">4. Menjelaskan kepada ibu mengenai KB MAL, keefektifannya, caranya, kelebihan dan kekurangannya.
Ibu paham dan bersedia menerapkan KB MAL dari saat ini.<li data-bbox="419 421 1402 535">5. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila ada keluhan atau ingin mengganti metode KB ke fasilitas terdekat.
Ibu paham dan bersedia |
|--|---|

Lampiran 2. *Informed Consent***INFORMED CONSENT (SURAT PERSETUJUAN)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fari Nurkhasanah
 Tempat/Tanggal Lahir : 31 tahun .
 Alamat : Dusun Kerten RT 07, Imogiri, Bantul . DIY .

Bersama ini menyatakan kesediaan sebagai subjek dalam praktik Continuity of Care (COC) pada mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Bidan T.A. 2020/2021. Saya telah menerima penjelasan sebagai berikut:

1. Setiap tindakan yang dipilih bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental ibu dan bayi. Namun demikian, setiap tindakan mempunyai risiko, baik yang telah diduga maupun yang tidak diduga sebelumnya.
2. Pemberi asuhan telah menjelaskan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan asuhan kebidanan dan menghindari kemungkinan terjadinya risiko agar diperoleh hasil yang optimal.
3. Semua penjelasan tersebut di atas sudah saya pahami dan dijelaskan dengan kalimat yang jelas, sehingga saya mengerti arti asuhan dan tindakan yang diberikan kepada saya. Dengan demikian terdapat kesepahaman antara pasien dan pemberi asuhan untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari.

Demikian surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Desember 2023 ..

Mahasiswa


 Magsyithoh

Klien


 Fari Nurkhasanah

Lampiran 3. Pernyataan telah selesai CoC

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pembimbing Klinik : *Bian Fusanawati, A.Md.,Keb*
 Instansi : Puskesmas ~~PMB~~ *Imogiri I Bantul*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : *Maysyithoh*
 NIM : *407124532152*
 Prodi : Pendidikan Profesi Bidan
 Jurusan : Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Telah selesai melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan dalam rangka praktik kebidanan holistik Continuity of Care (COC)

Asuhan dilaksanakan pada tanggal *12/12/22* sampai dengan *15/02/2023*.

Judul asuhan: *Asuhan Berkesinambungan pada Ny.F usia 31 tahun G1P0A0 UK 33 minggu 6 hari dengan Anemia sedang di Puskesmas Imogiri I Bantul.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, *8 April 2022*

(Pembimbing Klinik)

Bian Fusanawati, A.Md.,Keb


Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan


KUNJUNGAN HAMIL





KUNJUNGAN PERSALINAN, NIFAS, KB DAN NEONATUS











Lampiran 5. Jurnal

Jurnal Jurnakemas

Volume 2 Nomor 1, Februari 2022

E-ISSN 2808-5264



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ANEMIA PADA IBU
HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMADUA KECAMATAN
SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN**

Helmita Sari¹, Yarmaliza¹, Zakiyuddin¹

¹ Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar
Email: helmitasari7645@gmail.com

ABSTRAK

Penyebab anemia pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi dalam tubuh. Anemia defisiensi zat besi merupakan anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, asam folat dan vitamin B12 dikarenakan asupan yang tidak adekuat atau ketersediaan zat besi yang rendah. Penelitian bersifat analitik dengan pendekatan cross-sectional, dimana variabel bebas dan terikat diteliti pada saat yang bersamaan saat penelitian dilakukan. Diwilayah puskesmas samadua kabupaten aceh selatan ibu hamil yang mengalami anemia semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2017 ada 55 ibu hamil yang mengalami anemia, tahun 2018 ada 6 ibu hamil yang mengalami anemia, dan tahun 2019 ada 16 ibu hamil yang mengalami anemia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil. Penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan pada 19 November – 26 Desember 2020. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 207 orang. Hasil penelitian berdasarkan analisis bivariat menunjukkan pengaruh Asupan zat besi (Fe) (Pvalue = 0,026), Tingkat pendapatan (Pvalue = 0,015), pengetahuan (pvalue = 0,055), dukungan keluarga (Pvalue = 0,049). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ($P < 0.05$) yaitu ada pengaruh antara Asupan zat besi (Fe), Tingkat pendapatan, pengetahuan, dukungan keluarga dengan anemia pada ibu hamil.

Kata Kunci: Kejadian, Anemia, Asupan Zat Besi(Fe)

HUBUNGAN POLA SEKSUAL IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI (KPD) DI RSUD KEPAHIANG TAHUN 2019

Elza Wulandari^{1,*}, Yuni Ramadhaniati², Choralina Eliagita³, Nining
Rahayu⁴

^{1,2,3,4}Prodi Kebidanan STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu

¹elzawulandari@gmail.com; ²yuniramadhaniati@gmail.com; ³choralinaeliagita03@gmail.com ;
⁴ningrahayu10@gmail.com

* corresponding author

Abstrak

Ketuban Pecah Dini (KPD) termasuk penyebab peningkatan angka kematian ibu dengan faktor resiko antara lain riwayat kehamilan sebelumnya dengan KPD, flora servikovaginal, defisiensi Cu Zn Vitamin C, merokok, aktivitas seksual, sindroma ehlers danlos, trauma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola seksual ibu hamil dengan kejadian KPD di RSUD Kepahiang. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan desain *Case Control* dengan pendekatan retrospektif. Populasi adalah seluruh ibu bersalin di RSUD Kepahiang pada bulan Mei Tahun 2019 yang berjumlah 75 orang dan yang mengalami KPD 20 Orang. Sampel sebanyak 40 orang yang terdiri dari sampel kasus 20 orang ibu yang mengalami KPD diambil menggunakan teknik *total sampling* serta sampel kontrol 20 orang ibu bersalin tidak mengalami KPD yang diambil menggunakan teknik *systematic random sampling*. Data dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji *Chi Square (χ^2)* dan *Contingency Coefficient (C)*. Hasil penelitian ada hubungan antara pola seksual ibu hamil dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Kepahiang dengan kategori hubungan erat.

Kata kunci: KPD; Pola Seksual; Ibu Hamil

Relationship between Sexual Patterns of Pregnant Women and the Occurrence of Premature Rupture of Membranes (KPD) in Kepahiang District Hospital

Abstract

Premature rupture of membranes (KPD) includes causes of increased maternal mortality with risk factors including a history of previous pregnancy with KPD, cervicovaginal flora, Cu Zn Vitamin C deficiency, smoking, sexual activity, ehlers danlos syndrome, trauma. The purpose of this study was to determine the relationship of sexual patterns of pregnant women with the incidence of KPD in Kepahiang Regional Hospital. This type of research is analytic research with Case Control design with a retrospective approach. The population was all women giving birth in Kepahiang Regional Hospital in May 2019, amounting to 75 people and experiencing 20 people with KPD. A sample of 40 people consisting of a case sample of 20 mothers who experienced KPD were taken using a total sampling technique and a control sample of 20 mothers who did not experience a

JURNAL KEBIDANAN
Vol 6, No 4, Oktober 2020 : 446-452

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG KONSUMSI NUTRISI DAN PERAN SUAMI TERHADAP KELANCARAN PRODUKSI ASI PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEDAN AREA SELATAN KOTA MEDAN TAHUN 2020

Maimunah R¹, Nopita Yanti Sitorus²

^{1,2}Program Studi D-III Kebidanan STIKes Flora,

¹email :mumunrieto@gmail.com

²email nopistr27@gmail.com

ABSTRACT

Background : The puerperium / breastfeeding period is an important period for the growth and development of babies, especially through the lactation process. Babies often do not get breast milk optimally because the mother's milk production is not smooth, which is thought to be due to the mother's lack of knowledge about nutritional consumption and the husband's lack of role in providing support.

Purpose: The purpose of this study was to analyze the relationship between maternal knowledge about nutritional consumption and the role of husbands with the smooth production of breast milk.

Methods : This research is a quantitative study with a cross sectional approach. The research was conducted in the working area of the South Area Medan Health Center. The study population was all mothers who breastfed their children aged 0–12 months and the sample was obtained 33 people. Accidental sampling. Data analysis used univariate analysis, bivariate analysis with chi-square test at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$).

Result : The results showed that the knowledge of postpartum mothers about nutritional consumption and the role of husbands were related to the smooth production of breast milk in the South Area Medan Health Center in 2020, $p < 0.05$. Mothers with good knowledge and good husbands' roles tend to produce milk smoothly compared to mothers with less knowledge and their husbands who have less role to play during childbirth / breastfeeding

Conclusion: The role of the partner is related to the smooth production of breast milk in the South Area Medan Health Center in 2020, $p = 0.001 < 0.05$. Husbands who are good during the postpartum period / breastfeeding make the mother's milk production smooth compared to husbands who do not play a role during the postpartum / breastfeeding period.

Suggestion: Mothers can ask their husbands for help during the postpartum / breastfeeding period by actively providing assistance that can make postpartum / breastfeeding mothers more comfortable so that they can facilitate milk production.

Key words: Knowledge, Role of Husband, Smooth Breastfeeding Production

JURNAL KEBIDANAN
Vol 6, No 4, Oktober 2020 : 446-452

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG KONSUMSI NUTRISI DAN PERAN SUAMI TERHADAP KELANCARAN PRODUKSI ASI PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEDAN AREA SELATAN KOTA MEDAN TAHUN 2020

Maimunah R¹, Nopita Yanti Sitorus²

^{1,2}Program Studi D-III Kebidanan STIKes Flora,

¹email :mumunrieto@gmail.com

²email nopistr27@gmail.com

ABSTRACT

Background : The puerperium / breastfeeding period is an important period for the growth and development of babies, especially through the lactation process. Babies often do not get breast milk optimally because the mother's milk production is not smooth, which is thought to be due to the mother's lack of knowledge about nutritional consumption and the husband's lack of role in providing support.

Purpose: The purpose of this study was to analyze the relationship between maternal knowledge about nutritional consumption and the role of husbands with the smooth production of breast milk.

Methods : This research is a quantitative study with a cross sectional approach. The research was conducted in the working area of the South Area Medan Health Center. The study population was all mothers who breastfed their children aged 0–12 months and the sample was obtained 33 people. Accidental sampling. Data analysis used univariate analysis, bivariate analysis with chi-square test at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$).

Result : The results showed that the knowledge of postpartum mothers about nutritional consumption and the role of husbands were related to the smooth production of breast milk in the South Area Medan Health Center in 2020, $p < 0.05$. Mothers with good knowledge and good husbands' roles tend to produce milk smoothly compared to mothers with less knowledge and their husbands who have less role to play during childbirth / breastfeeding

Conclusion: The role of the partner is related to the smooth production of breast milk in the South Area Medan Health Center in 2020, $p = 0.001 < 0.05$. Husbands who are good during the postpartum period / breastfeeding make the mother's milk production smooth compared to husbands who do not play a role during the postpartum / breastfeeding period.

Suggestion: Mothers can ask their husbands for help during the postpartum / breastfeeding period by actively providing assistance that can make postpartum / breastfeeding mothers more comfortable so that they can facilitate milk production.

Key words: Knowledge, Role of Husband, Smooth Breastfeeding Production

ABSTRAK

Pendahuluan : Masa nifas/menyusui merupakan masa yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi terutama melalui proses laktasi. Bayi sering tidak mendapatkan ASI secara optimal dikarenakan produksi ASI ibu tidak lancar yang diduga karena kurangnya pengetahuan ibu tentang konsumsi nutrisi dan suami kurang berperan dalam memberikan dukungan.

Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu tentang konsumsi nutrisi dan peran suami dengan kelancaran produksi ASI.

Metode : Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Medan Area Selatan. Populasi penelitian adalah seluruh ibu yang menyusui anaknya usia 0–12 bulan dan sampel diperoleh 33 orang. Penarikan sampel secara aksidental (*accidental sampling*). Analisis data menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan uji *chi-square* pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Hasil : Hasil penelitian bahwa pengetahuan ibu nifas tentang konsumsi nutrisi dan peran suami berhubungan dengan kelancaran produksi ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Area Selatan tahun 2020, p

Breastfeeding Knowledge and Behavior in Lactational Amenorrhea Method (LAM) as a Natural Contraceptive

Muhammad¹, Reza Bintangdari Johan^{2*}, Sri Ratna Ningsih¹

¹Master of Midwifery Program, Faculty of Health Sciences, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, ²Diploma III of Midwifery Program, Faculty of Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, Indonesia

Abstract

The lactational amenorrhea method (LAM) is a natural contraceptive that is highly effective after the three essential criteria are fulfilled. However, there is a significantly low adoption resulting from poor knowledge and correct practices. This study aimed to determine the correlation between knowledge and behavior of breastfeeding mothers on breastfeeding as a natural contraceptive. This was an analytic observational study with a cross-sectional design involving 89 breastfeeding mothers and was performed from January to March 2018. Furthermore, data were collected using a questionnaire, and the results showed knowledge of breastfeeding mothers to be good (59.6%) and not good (51.7%). However, the individual's behavior towards the implementation of LAM was not good (48.3%) and good (40.4%). Based on the statistical test, there was a correlation between knowledge and behavior of breastfeeding mothers, with a *p*-value of 0.006 (OR = 3.463; 95% CI = 1.411 – 8.498). In brief, knowledge of LAM amongst the participants is good, despite the poor application in terms of behavior. Also, a relationship was also established between the knowledge and behavior of breastfeeding mothers as a natural contraceptive.

Keywords: behavior, breastfeeding, knowledge, lactational amenorrhea