

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Didapatkan gambaran yang menunjukkan tingginya kadar bilirubin total pada pasien tuberkulosis yang mendapat terapi OAT.
2. Dari 32 sampel serum penderita tuberkulosis yang mendapat terapi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) diperoleh rata-rata kadar bilirubin total sebesar 1,92 mg/dL.
3. Kadar bilirubin total tinggi sebanyak 12 sampel (37,5%) dan kadar bilirubin total normal sebanyak 20 sampel (62,5%).

#### **B. Saran**

1. Bagi penderita tuberkulosis  
Bagi penderita tuberkulosis yang mendapat terapi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) disarankan untuk melakukan monitoring atau evaluasi fungsi hati salah satu pemeriksaannya yaitu bilirubin total.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan hal yang sama yaitu memeriksa serum penderita tuberkulosis yang mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan mencantumkan hasil pemeriksaan kadar bilirubin total sebelumnya.