

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar bayi dilahirkan dengan jenis persalinan dengan *section caesarea*, dan usia ibu 20-35 tahun.
2. Sebagian besar bayi dilahirkan dengan usia kehamilan 37-42 minggu
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis persalinan dengan kejadian ikterus neonatorum dan tidak ada hubungan antara usia ibu dengan ikterus neonatorum
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia kehamilan dengan kejadian ikterus neonatorum di RSUD Kasih Ibu Purworejo Tahun 2022.

B. Saran

1. Bagi RSUD Kasih Ibu Purworejo

Diharapkan RSUD Kasih Purworejo mengadakan seminar mengenai ikterus neonatorum yang diikuti oleh bidan sehingga menambah pengetahuan dan bidan bisa memberikan konseling tentang faktor resiko ikterus neonatorum kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

2. Bagi Bidan RSUD Kasih Ibu Purworejo

Diharapkan untuk mempertahankan serta meningkatkan upaya menanggulangi mencegah terjadinya prematuritas dengan konseling, informasi, dan edukasi (KIE) kepada ibu hamil mengenai faktor risiko ikterus neonatorum.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian ulang dengan lebih baik dari segi materi yaitu biaya penelitian, teknis pengumpulan data, pengambilan data, dan desain penelitian serta dapat mengungkap semua faktor-faktor penyebab ikterus neonatorum.