

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini tentang hubungan tingkat kecemasan pasien dengan tekanan darah pada pencabutan gigi dewasa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah responden terbanyak berdasarkan nilai tingkat kecemasan sebelum diberikan media video AOS (*Anxiety In Oral Surgery*) adalah kecemasan ringan dengan jumlah 18 responden (51,4%)
2. Jumlah responden terbanyak berdasarkan nilai tingkat kecemasan sesudah diberikan media video AOS (*Anxiety In Oral Surgery*) adalah tidak ada kecemasan dengan jumlah 29 responden (82,9%)
3. Ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan media video terhadap tingkat kecemasan pada pasien pra odontektomi. Hasil Uji *T-test* didapatkan nilai *p value* = ,000 dapat dikatakan nilai *p value* penelitian ini menunjukkan nilai *p value* $< \alpha$ (0,05)

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan adanya penerapan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko peningkatan kecemasan saat melakukan tindakan odontektomi . Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi tenaga kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk tenaga kesehatan khususnya perawat gigi untuk memperhatikan tingkat kecemasan pada pasien yang akan dilakukan tindakan odontektomi.

2. Bagi pasien

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman responden tentang ada perbedaan media video *AOS* (anxiety in oral surgery) terhadap tingkat kecemasan pada pasien praodontektomi.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan tambahan wawasan mengenai kesehatan gigi dan mulut khususnya tentang ada perbedaan media video *AOS* (anxiety in oral surgery) terhadap tingkat kecemasan pada pasien praodontektomi penelitian ini dapat dikembangkan dengan judul lain yang serupa tetapi dengan variable-variabel yang berbeda.