



TUGAS AKHIR

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S
USIA 37 TAHUN G3P2A0AH2 DENGAN PRESENTASI
BOKONG DAN FAKTOR RESIKO UMUR
DI PMB SETYO ARI SUSANTI
PURWOREJO**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Praktik Kebidanan Komunitas dalam Konteks
Continuity of Care (COC)

ENDAH WAHYU PANCANINGTYAS
NIM. P07124523113

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
2024**



TUGAS AKHIR

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S
USIA 37 TAHUN G3P2A0AH2 DENGAN PRESENTASI
BOKONG DAN FAKTOR RESIKO UMUR
DI PMB SETYO ARI SUSANTI
PURWOREJO**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Praktik Kebidanan Komunitas dalam Konteks
Continuity of Care (COC)

ENDAH WAHYU PANCANINGTYAS
NIM. P07124523113

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Endah Wahyu Pancaningtyas

NIM : P07124523113

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Maret 2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S
USIA 37 TAHUN G3P2A0AH2 DENGAN PRESENTASI
BOKONG DAN FAKTOR RESIKO UMUR
DI PMB SETYO ARI SUSANTI
PURWOREJO**

Disusun Oleh

**ENDAH WAHYU PANCANINGTYAS
P07124523113**

Telah dipertahankan dalam seminar di depan Penguji
Pada tanggal : 22 April 2024

SUSUNAN PENGUJI

Pembimbing Akademik

Linda Nur Wahyuni, S.Tr.Keb., Bdn

Pembimbing Klinik

Setyo Ari Susanti, Amd.Keb
NIP. 197504162003122004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kebidanan

Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.Si, Tr. Keb
NIP. 197511232002122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Penulisan laporan *Continuity Of Care* (COC) dilakukan dalam rangka memenuhi Tugas Akhir. Laporan ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Iswantoro, S.Pd. M.Kes, sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
2. Ibu Heni Puji Wahyuningsih, S.Si.T.Bdn, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk menyusun Tugas Akhir.
3. Ibu Munica Rita Hernayanti, S.SiT.M.Kes, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyusun Tugas Akhir.
4. Ibu Linda Nur Wahyuni, S.Tr.Keb., Bdn selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan waktunya serta masukan kepada kami dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Setyo Ari Susanti, Amd.Keb selaku Pembimbing Klinik yang telah memberikan izin dan bimbingan bagi kami untuk praktek di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh sebab itu, menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Demikian yang bisa penulis sampaikan, semoga Tugas Akhir ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

Purworejo, Februari 2024

Penulis

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S
USIA 37 TAHUN G3P2A0AH2 DENGAN PRESENTASI
BOKONG DAN FAKTOR RESIKO UMUR
DI PMB SETYO ARI SUSANTI
PURWOREJO**

SINOPSIS

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dan anak indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pengawasan dan pemberian asuhan yang tepat perlu dilakukan oleh bidan demi terwujudnya kesehatan ibu dan bayi karena bidan sebagai penggerak dan mitra yang paling dekat dengan wanita. Salah satu strategi yang diupayakan adalah pemberian asuhan secara berkesinambungan dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur minimal 6 kali selama hamil, pertolongan persalinan di tenaga kesehatan, melakukan kunjungan neonatus, ibu pasca bersalin dan memilih alat kontrasepsi yang sesuai. Ny.S Merupakan salah seorang ibu hamil yang mendapatkan asuhan kebidanan berkesinambungan sejak masa hamil hingga pemilihan kontrasepsi yang akan digunakan pada masa nifas di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo.

Asuhan kebidanan kehamilan Ny. S dilakukan 3 kali pada tanggal 10 Januari 2024, 17 Januari 2024, 24 Januari 2024 dengan keluhan kadang terasa sesak jika tidur terlentang. Pada tanggal 30 Januari 2024 proses persalinan Ny. S terjadi pada usia kehamilan 40 minggu ditolong oleh dokter SpOG, proses persalinan berjalan dengan cara *Sectio Caesarea* (SC) dengan metode ERACS di RS Budi Sehat Purworejo atas indikasi presentasi bokong, faktor resiko umur dan taksiran berat janin lebih dari 3500 gram. Bayi Ny. S lahir 30 Januari 2024 Pukul 08.08 WIB secara SC dengan kondisi sehat dan normal, BB 3.900 gram, PB 52 cm, Lk 35 Cm, Ld 34 Cm dan Lila 12 Cm dan tidak ditemukan kelainan fisik. Masa nifas Ny.S berlangsung normal dengan dilakukan kunjungan 4x pada tanggal 30 Januari 2024 sampai tanggal 29 Februari 2024, hasil pemantauan kondisi ibu dalam kondisi normal dan berjalan secara baik. Ny. S sudah melakukan kontrasepsi mantap yaitu MOW bersamaan dengan tindakan persalinan SC. Sedangkan pemantauan neonatus dilakukan 3x pada tanggal 30 Januari 2024 sampai tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil kondisi bayi Ny S baik. Ny. S berencana memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. Secara keseluruhan asuhan kebidanan berkesinambungan sejak kehamilan Trimester III hingga menjadi akseptor KB pada Ny. S berjalan dengan baik. Diharapkan untuk ke depannya pelayanan KIA dan KB dilakukan secara berkesinambungan kepada semua ibu hamil dan calon ibu sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Saran untuk bidan agar dapat meningkatkan asuhan berkesinambungan dengan cara memantau secara ketat ibu dan janin sehingga ketika ditemukan komplikasi dapat dilakukan tindakan tepat sesuai prosedur dan kewenangan bidan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SINOPSIS	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup	5
D. Manfaat.....	5
BAB II KAJIAN KASUS DAN TEORI	
A. Kajian Kasus	6
B. Kajian Teori.....	10
BAB III PEMBAHASAN	
A. Asuhan Kebidanan Kehamilan	104
B. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin	113
C. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dan Neonatus.....	116
D. Asuhan Kebidanan Pada Nifas Dan KB.....	120
E. Analisis	127
F. Penatalaksanaan	128
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ukuran TFU berdasarkan Usia Kehamilan	12
Gambar 2. Klasifikasi Presentasi Bokong.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skrining Imunisasi TT	25
Tabel 2 Interval Dalam Perlindungan Imunisasi TT	26
Tabel 3 Faktor Risiko yang terdapat dalam Kategori I	34
Tabel 4 Faktor Risiko yang terdapat dalam Kategori II	35
Tabel 5 Faktor Risiko yang terdapat dalam Kategori III.....	36
Tabel 6 Involusi Uterus	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SOAP dan Catatan perkembangan	141
Lampiran 2 Infomed Consent Pasien Tugas Akhir	174
Lampiran 3 Surat keterangan Telah Selesai COC.....	175
Lampiran 4 Dokumentasi	176
Lampiran 5 Buku KIA	180
Lampiran 6 Kartu KB.....	181
Lampiran 7 Jurnal yang digunakan sebagai Referensi.....	182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses kehamilan dan persalinan pada kebanyakan wanita merupakan proses yang dilalui dengan kegembiraan dan suka cita. Pada dasarnya kehamilan, persalinan, nifas, dan Bayi Baru Lahir (BBL) merupakan suatu keadaan yang alamiah dan fisiologis namun dalam prosesnya terdapat kemungkinan keadaan tersebut berubah menjadi keadaan patologis yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi, sehingga diperlukan asuhan kebidanan sesuai dengan standar secara menyeluruh dan berkesinambungan. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan ibu merupakan kunci bagi kesehatan generasi penerusnya, ibu yang sehat ketika hamil, aman ketika melahirkan, pada umumnya akan melahirkan bayi yang sehat. Keberhasilan upaya kesehatan ibu dan anak indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator ini tidak hanya melihat program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tetapi juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat pada suatu Negara.¹

Berdasarkan WHO sekitar 830 wanita meninggal akibat komplikasi terkait kehamilan atau persalinan di seluruh dunia setiap hari. Sekitar 303.000 wanita meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan. Angka kematian ibu di negara berkembang adalah 239 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan 12 per 100.000 kelahiran hidup di negara maju.² Target AKI pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal (AKN) kurang dari 12 per 1000 kelahiran pada tahun 2030. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2021 terkait COVID-19 sebanyak 2.982 kasus, perdarahan sebanyak 1.330 kasus, dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.077 kasus.³ AKI di Jawa Tengah pada tahun 2020 terdapat 1.021 kasus. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 2017-2019 namun pada tahun 2020 ini terlihat mulai naik lagi

dan tahun 2021 sudah mencapai 199 per 100.000 kelahiran hidup. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan 22 kasus AKI selama tahun 2021.⁴

Penyebab tingginya AKI dan AKB di Indonesia terdapat beberapa faktor terutama pada ibu hamil. Hasil penelitian Nuraisya (2018) mendapatkan Sebagian besar responden (63%) mengalami kehamilan berisiko tinggi (skor 6-10) dan sebagian kecil (37%) berisiko rendah (skor 2-6), sebagian besar (67%) mengalami penyulit dan sebagian kecil (33%) normal.⁵

Beberapa faktor yang menjadi risiko pada ibu hamil antara lain usia ibu ketika hamil. Usia ibu hamil saat hamil >35 tahun merupakan salah satu faktor risiko tinggi ibu hamil. Apabila kehamilan diatas usia 35 tahun dapat mempengaruhi kondisi ibu, usia ibu hamil > 35 tahun memiliki hubungan signifikan dengan preeklamsia, kelahiran bayi premature, berat badan lahir rendah, presentasi janin abnormal dan *Sectio Caesarea* (SC).⁶

Letak sungsang atau presentasi bokong adalah janin yang letaknya memanjang (membujur) dalam rahim, kepala berada di fundus dan bokong di bawah.⁷ Kematian perinatal langsung yang disebabkan karena persalinan presentasi bokong sebesar 4-5 kali dibanding presentasi kepala. Sebab kematian perinatal pada persalinan presentasi bokong yang terbanyak adalah prematuritas dan penanganan persalinan yang kurang sempurna, dengan akibat hipoksia atau perdarahan di otak. Trauma lahir pada presentasi bokong banyak dihubungkan dengan usaha untuk mempercepat persalinan dengan tindakan-tindakan untuk mengatasi macetnya persalinan.⁸

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kelainan letak presentasi bokong, diantaranya paritas ibu dan bentuk panggul ibu. Angka kejadian presentasi bokong jika dihubungkan dengan paritas ibu maka kejadian terbanyak adalah pada ibu dengan multigravida dibanding pada primigravida, sedangkan jika dihubungkan dengan panggul ibu maka angka kejadian presentasi bokong terbanyak adalah pada panggul sempit atau pada primigravida, dikarenakan fiksasi kepala janin yang tidak baik pada Pintu Atas Panggul.⁸

Pengawasan dan pemberian asuhan yang tepat perlu dilakukan oleh bidan demi terwujudnya kesehatan ibu dan bayi karena bidan sebagai penggerak dan mitra yang paling dekat dengan wanita. Salah satu strategi yang diupayakan adalah pemberian asuhan secara berkesinambungan. Perawatan berkesinambungan adalah strategi kesehatan yang efektif primer memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan mereka dan perawatan kesehatan mereka. Asuhan *Continuity of Care* dilakukan mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga Keluarga Berencana (KB) pada ibu.

Bidan diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh klien sehingga asuhan yang diberikan tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penerapan asuhan secara berkesinambungan (*continuity of care*) pada ibu hamil trimester III, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan pemilihan KB. Berdasarkan ruang lingkup asuhan yang diberikan pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB maka penulis melakukan penyusunan Asuhan Berkesinambungan pada Ny. S usia 37 tahun G3P2A0AH2 dengan Presentasi Bokong dan Faktor Resiko Umur di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memahami dan melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III usia > 36 minggu, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, neonatus, dan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) secara berkesinambungan atau *Continuity of Care* dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dan dokumentasi dengan pendekatan metode SOAP.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan asuhan pada kehamilan trimester III meliputi pengkajian pada ibu hamil, menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas, merencanakan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care*,

melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang sudah disusun, melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan, mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan.

- b. Melakukan asuhan pada persalinan dan bayi baru lahir meliputi pengkajian pada ibu bersalin dan bayi baru lahir, menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas, merencanakan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care*, melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang sudah disusun, melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan, mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan.
- c. Melakukan asuhan pada nifas meliputi pengkajian pada ibu nifas, menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas, merencanakan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care*, melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang sudah disusun, melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan, mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan.
- d. Melakukan asuhan pada neonatus meliputi pengkajian pada neonatus, menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas, merencanakan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care*, melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang sudah disusun, melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan, mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan.
- e. Melakukan asuhan pada Keluarga Berencana meliputi pengkajian pada calon aseptor KB, menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas, merencanakan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care*, melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang sudah disusun, melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan, mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup asuhan kebidanan dan sasaran pelayanan bidan meliputi kehamilan trimester III, masa Persalinan, masa nifas, Bayi Baru Lahir (BBL), Neonatus, Anak Balita, kesehatan reproduksi dan KB. Pada Asuhan COC ini dibatasi hanya asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III, masa persalinan, masa nifas, BBL dan Keluarga Berencana (KB), secara *Continuity of Care*.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan manajemen kasus dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu secara *continuity of care* dalam masa hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi ibu/ keluarga

Mendapat pelayanan asuhan kebidanan secara komprehensif yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

b. Bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan

Meningkatkan pengetahuan tentang standar pelayanan kebidanan dan dapat memberikan pelayanan asuhan kebidanan secara komprehensif yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, khususnya pada ibu hamil dengan presentasi bokong dan faktor resiko umur.

c. Bagi Bidan di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo

Dapat memberikan informasi tambahan dalam penerapan asuhan kepada ibu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya pada ibu hamil dengan presentasi bokong dan faktor resiko umur.

BAB II

KAJIAN KASUS DAN TEORI

A. Kajian Kasus

Ny. S usia 37 tahun, pendidikan terakhir SMA kegiatan sehari-hari menjadi ibu rumah tangga. Ny. S sudah menikah dengan Tn. saat usia 21 tahun, Usia pernikahan kurang lebih 16 tahun. Ny. S tinggal bersama suaminya di desa Rasukan RT 02 RW 01, Ngombol, Purworejo. Berdasarkan riwayat menstruasi, siklus menstruasi ibu teratur 28 hari, lama menstruasi 7 hari, tidak ada keputihan dan saat menstruasi tidak mengalami nyeri haid/dismenorea. Hari pertama haid terakhir (HPHT): 23 April 2023, dan HPL: 30 Januari 2024. Ny. S mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi, asma, DM, ginjal, TBC, IMS maupun HIV/AIDS dan tidak ada yang memiliki riwayat bayi kembar, dan tidak merokok, dan tidak minum obat-obatan terlarang. Ny. S mengeluh sering sesak napas dan nyeri perut bagian bawah.

Berdasarkan hasil penapisan awal yang dilakukan pada Ny. S di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo pada tanggal 10 Januari 2024, diketahui Ny.S hamil anak ke3, pernah melahirkan 2 kali, tidak pernah keguguran (Ny.S G3 P2Ab0Ah2), umur 37 tahun, usia kehamilan 36 minggu 4 hari. Hasil screening menggunakan kartu skor poedji rochjati, diperoleh nilai Skor 14, yaitu Faktor Resiko Kelompok I dan II yaitu umur ibu lebih dari 35 tahun dan kehamilan dengan letak sungsang sehingga Ny.S dikategorikan kehamilan dengan resiko sangat tinggi. Riwayat persalinan ibu yang lalu yaitu pada tahun 2008 anak pertama dengan berat lahir 3.300 gr, cara persalinan dengan Vakum Ekstraksi (VE) atas indikasi mengejan ibu tidak adekuat, jenis kelamin perempuan disusui selama 2 tahun tidak ada komplikasi dan kehamilan kedua pada tahun 2014 dengan berat lahir 3.400 gr , dengan cara spontan jenis kelamin perempuan dan disusui selama 2 tahun tidak ada komplikasi. Ibu pernah menggunakan KB Kondom pada tahun 2009 dan berhenti pada tahun 2012

karena hamil. Pada tahun 2014 menggunakan IUD sampai tahun 2022. Status imunisasi TT Ny.S yaitu TT5, Ny. S sudah melakukan pemeriksaan ANC terpadu pada saat pertama kali datang ke Puskesmas (K1) tanggal 20 Juni 2023 usia kehamilan 8 minggu dengan hasil : Hb : 12,3 g/dl.GDS : 86 Protein urine : (-) negatif,HbSAg : (-) Non reaktif. HIV: (-) Non reaktif Sifilis: (-) Non reaktif.

Pada saat pengkajian didapatkan bahwa ibu rutin melakukan ANC di Puskesmas Tulungagung, Puskesmas Ngombol, PMB, dan USG oleh dokter di RS Budi Sehat Purworejo. Ibu melakukan ANC juga di RS Budi Sehat Purworejo dikarenakan ibu berencana melahirkan di rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi ibu dan janin dalam keadaan baik akan tetapi posisi janin presentasi bokong, ibu disarankan melahirkan dengan cara SC karena faktor resiko umur dan janin dengan presentasi bokong.

Dari pemeriksaan didapatkan objektif yaitu BB sebelum hamil: 48 kg, BB saat ini: 62 kg, TB : 150 cm, Lila sebelum hamil : 24 cm dan Lila saat ini 25 Cm, TD : 110/80 mmHg, N : 80 x/menit, RR : 20 x/menit, S : 36,6 C. Hasil pemeriksaan fisik bagian kepala normal tidak ada kelainan, bentuk wajah simetris, bagian leher tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, pada bagian payudara putting susu menonjol, belum ada pengeluaran kolostrum, bagian ekstremitas tangan dan kaki bentuk simetris tidak oedema/bengkak, tidak ada kelainan. Hasil pemeriksaan abdomen, tinggi fundus 32 cm, pada perut ibu bagian atas teraba bagian bulat keras dan melenting yaitu kepala janin, pada pada perut ibu bagian kiri teraba bagian yang keras seperti papan yaitu punggung janin, pada bagian perut bagian kanan teraba bagian-bagian terkecil janin, di perkirakan adalah ekstremitas janin, pada bagian perut bagian bawah teraba bagian bulat, lunak dan tidak melenting yaitu bokong janin, bagian terbawah janin belum masuk panggul, TBJ: 3255 gram, DJJ: 144x/menit. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas tanggal 20 Desember 2023 : Hb : 12 gr/dl, Protein Urine : Negatif. berdasarkan pemeriksaan USG 05 November 2023 diperoleh: Janin tunggal, presentasi bokong, AK cukup, plasenta di fundus, dan TBJ 1.224 gram, UK 28 Minggu 6 Hari.

Ny. S diberikan oleh Puskesmas Tablet Fe, Vitamin C, masing masing 15 butir di minum sekali sehari, Tablet Fe dan Vitamin C diminum malam hari, sedangkan Calcium 10 butir di minum pagi hari. Ny.S juga di berikan KIE penyebab sesak napas dan cara mengatasi ketidaknyamanan tersebut, Ny. S juga diberikan KIE tentang resiko kehamilan dengan faktor resiko umur dan presentasi bokong. KIE teknik kneechest untuk penanganan presentasi bokong, KIE tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester III memberikan KIE tentang persiapan persalinan, tanda tanda persalinan,dan ibu di minta untuk kontrol ulang 1 minggu lagi atau jika ada keluhan.

Pada tanggal 17 Januari 2024 dilakukan kunjungan rumah pada usia kehamilan 37 minggu 5 hari, keluhan ibu tidak ada. Hasil pemeriksaan abdomen, tinggi fundus 33 cm, pada perut ibu bagian atas teraba bagian bulat keras dan melenting kemungkinan kepala janin, pada pada perut ibu bagian kiri teraba bagian yang keras seperti papan, pada bagian perut bagian kanan teraba bagian-bagian terkecil janin, di perkirakan adalah ekstremitas janin, pada bagian perut bagian bawah teraba bagian bulat, lunak dan tidak melenting, dipikirkan bokong janin dan sudah masuk pintu atas panggul. Ibu dijadwalkan kontrol ke Rumah Sakit pada tanggal 24 Januari 2024.

Ny. S diberikan KIE perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi persalinan, persiapan persalinan, tanda tanda persalinan, KIE KB Pasca persalinan dan Ny.S di minta mempersiapkan persalinan di rumah sakit.

Ny.S melakukan USG pada tanggal 24 Januari 2024 diperoleh hasil Janin tunggal, presentasi bokong, AK cukup, plasenta di fundus, dan TBJ 3.700 gram. Ny.S disarankan untuk melahirkan di RS secara SC tanggal 30 Januari 2024 atau jika ada tanda-tanda persalinan untuk segera periksa ke rumah sakit.

Pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Ny.S datang ke RS Budi Sehat Purworejo bersama suami karena sudah dijadwalkan pada tanggal 30 Januari pukul 08.00 WIB untuk dilakukannya persalinan dengan tindakan SC dengan indikasi presentasi bokong dan faktor resiko umur. Semua data subjektif pada persalinan, nifas, bayi baru lahir dan neonatus didapatkan dari data sekunder yang diperoleh dari catatan medis Ny.S ketika di RS Budi Sehat

Purworejo dan hasil wawancara dengan Ny.S. Didapatkan hasil bahwa bayi Ny. S berjenis kelamin perempuan lahir 30 Januari 2024 Pukul 08.08 WIB dengan berat 3.900 gr dan panjang badan 52 cm. Bayi baru dilakukan rawat gabung dengan ibu pada 30/01/2024 pada pukul 15.00 wib, dan ibu serta bayi diizinkan pulang kerumah pada hari kamis 01/02/2024 siang (KF I dan KN I ibu serta bayi masih di Rumah Sakit).

Kunjungan KF II pada nifas hari ke-4 (Tanggal 03/02/2024) didapatkan TD ibu 118/79 mmHg, Nadi :82 x/menit, Respirasi: 20 x/menit, Suhu: 36,5°C, Payudara: Simetris, Puting susu menonjol tidak lecet dan ASI (+) colustrum sedikit, TFU teraba 3 jari di bawah pusat, Luka SC masih sedikit terasa sakit, lochea sanguinolenta dan jumlah perdarahan normal. Bidan melakukan skrining *Edinburgh postnatal depression scale* (EPDS) dengan hasil 0. Bidan memberikan KIE cara mengatasi keluhannya, mengajarkan ibu cara menyusui yang benar, mengevaluasi dan memperbaiki posisi menyusui, mengajarkan suami dan keluarga cara pijat oksitosin, KIE nutrisi pada ibu menyusui, KIE perawatan luka post SC, Sedangkan pada pemeriksaan KN II pada hari ke 4, diperoleh tali pusat bayi belum puput dan tidak terdapat ikterus neonatorum. KIE yang diberikan adalah menjaga kehangatan bayi, menyusui *on demand* dan sesering mungkin, KIE perawatan tali pusat serta KIE tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir.

Kunjungan KF III pada nifas hari ke-8 (Tanggal 07/02/2024) didapatkan TD ibu 112/69 mmHg, Nadi :83 x/menit, Respirasi: 20 x/menit, Suhu: 36.6oC, Payudara: Simetris, Puting susu menonjol tidak lecet dan ASI (+) produksi sudah banyak daripada saat hari ke-4, TFU teraba pertengahan pusat simfisis, Luka SC sudah tidak sakit dan sudah kering (Ny.S sudah kontrol ke Rumah Sakit dan perban sudah dilepas), lochea serosa dan jumlah perdarahan normal. Bidan memberikan KIE cara mengatasi keluhannya, mengevaluasi dan memperbaiki posisi menyusui, menganjurkan suami dan keluarga untuk melakukan pijat oksitosin agar ASI lebih lancar, KIE nutrisi pada ibu menyusui. Sedangkan pada pemeriksaan KN III pada hari ke-8 tali pusat bayi sudah puput dan tidak terdapat ikterus neonatorum. KIE yang

diberikan adalah menjaga kehangatan bayi, menyusui on demand, KIE Imunisasi dan KIE tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir.

KF IV pada nifas hari ke 30 yaitu tanggal 29/02/2024 dilakukan kunjungan rumah. Bidan melakukan skrining *Edinburgh postnatal depression scale* (EPDS) dengan hasil 0. Selain itu bidan juga memberikan KIE tentang perawatan bayi, nutrisi ibu, ASI Eksklusif dan Pemberian konseling KB pascasalin. Berdasarkan hasil konseling sejak saat hamil Ny.S berencana memakai KB MOW bersamaan operasi SC dengan alasan merupakan kontrasepsi mantap dan karena faktor resiko umur serta Ny.S sudah tidak ingin mempunyai anak dan tidak mempengaruhi produksi ASI.

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar *Continuity of Care* (COC)

a. Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 4 menyebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.⁹

Continuity of care merupakan hal yang mendasar dalam model praktik kebidanan untuk memberikan asuhan yang holistik, membangun kemitraan yang berkelanjutan untuk memberikan dukungan, dan membina hubungan saling percaya antara bidan dengan klien. Menurut *Reproductive, Maternal, Newborn, And Child Health* (RMNCH). “*Continuity of care*” meliputi pelayanan terpadu bagi ibu dan anak dari prakehamilan hingga persalinan, periode postnatal dan masa kanak-kanak. Asuhan disediakan oleh keluarga dan masyarakat melalui layanan rawat jalan, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya.¹⁰

Continuity of care dalam kebidanan adalah serangkaian kegiatan

peladenan yang berkelanjutan dan menyeluruh mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan bayi baru lahir serta pelayanan keluarga berencana yang menghubungkan kebutuhan kesehatan perempuan khususnya dan keadaan pribadi setiap individu.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas, *Continuity of Care / COC* atau asuhan kebidanan berkesinambungan merupakan asuhan yang diberikan kepada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir atau neonates, serta pemilihan metode kontrasepsi atau KB secara komprehensif sehingga mampu untuk menekan AKI dan AKB.

b. Filosofi COC

Filosofi model *continuity of care* menekankan pada kondisi alamiah yaitu membantu perempuan agar mampu melahirkan dengan intervensi minimal dan pemantauan fisik, kesehatan psikologis, spiritual dan sosial perempuan dan keluarga.¹² Siklus persalinan merupakan paket pelayanan yang meliputi pelayanan yang berkelanjutan selama hamil, bersalin dan pasca persalinan.

Continuity of care dalam pelayanan kebidanan dapat memberdayakan perempuan dan mempromosikan keikutsertaan dalam pelayanan mereka juga meningkatkan pengawasan pada mereka sehingga perempuan merasa di hargai.¹³

c. Jenis Pelayanan COC

Continuity Of Care memiliki tiga jenis pelayanan yaitu :

- 1) Manajemen
- 2) Informasi
- 3) Hubungan

Kesinambungan manajemen melibatkan komunikasi antar perempuan dan bidan. Kesinambungan informasi menyangkut ketersediaan waktu yang relevan. Kedua hal tersebut penting untuk mengatur dan memberikan pelayanan kebidanan.

2. Konsep Dasar Teori Kehamilan

a. Definisi

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester yaitu Trimester pertama 0-12 minggu, Trimester kedua 13-28 minggu dan Trimester ketiga 29 sampai 42 minggu.¹⁴

b. Adaptasi Fisiologis pada Ibu Hamil


1) Sistem Reproduksi

a) Uterus

Untuk akomodasi pertumbuhan janin, Rahim membesar akibat hipertrofi dan hiperplasi otot polos Rahim, serabut-serabut kolagennya menjadi higroskopik, endometrium menjadi desidua. Ukuran pada kehamilan cukup bulan adalah 30x25x20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Berat uterus naik secara luar biasa dari 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan (40 minggu).

**Gambaran Tinggi Fundus Uteri (TFU)
Dikonversikan dengan Usia Kehamilan (UK)**

- Sebelum minggu 11 fundus belum teraba dari luar.
- Minggu 12, 1-2 jari diatas symphysis.
- Minggu 16, pertengahan antara sym-pst
- Minggu 20, tiga jari dibawah pusat
- Minggu 24, setinggi pusat
- minggu 28, tiga jari diatas pusat
- Minggu 32, pertengahan proc xymphoideus – pusat
- Minggu 36, tiga jari dibawah proc.xypoideus
- Minggu 40 pertengahan antara proc xyphoideus-pusat.



Gambar1. Ukuran TFU berdasarkan Usia Kehamilan

b) Serviks Uteri

Serviks bertambah vaskularisasinya dan menjadi lunak (*soft*) yang disebut dengan tanda Goodell. Kelenjar endoservikal membesar dan mengeluarkan banyak cairan mucus, oleh karena penambahan dan pelebaran pembuluh darah, warnanya menjadi livid yang disebut tanda Chadwick.

c) Vagina Dan Vulva

Vagina dan vulva mengalami perubahan karena pengaruh estrogen. Akibat dari hipervaskularisasi vagina dan vulva terlihat lebih merah atau kebiruan. Warna livid pada vagina dan portio serviks disebut tanda Chadwick.

d) Ovarium

Saat ovulasi terhenti masih terdapat korpus luteum graviditas sampai terbentuknya plasma yang mengambil alih pengeluaran estrogen dan progesterone (kira-kira pada kehamilan 16 minggu dan korpus luteum graviditas berdiameter kurang lebih 3 cm). kadar relaksin disirkulasi maternal dapat ditentukan dengan meningkat dalam trimester pertama. Relaksin mempunyai pengaruh menenangkan hingga pertumbuhan janin menjadi baik hingga aterm.

e) Dinding Perut (Abdominal Wall)

Pembesaran Rahim menimbulkan peregangan dan menyebabkan robeknya serabut elastis dibawah kulit sehingga timbul striae gravidarum. Kulit perut pada linea alba bertambah pigmentasinya dan disebut linea Nigra.

f) Payudara

Beberapa Perubahan payudara pada ibu hamil diantaranya payudara menjadi lebih besar, Areola payudara makin hitam karena hiperpigmentasi, Glandula montgomery tampak menonjol dipermukaan areola mammae, Pada kehamilan 12 minggu ke atas dari puting susu akan keluar cairan putih jernih (kolostrum) yang berasal dari kelenjar asinus yang mulai bereaksi, Pengeluaran ASI belum terjadi karena prolactin ini ditekan oleh PIH (Prolaktin Inhibing Hormone), Setelah persalinan dengan dilahirkannya plasenta maka pengaruh estrogen, progesterone dan somatomotropin terhadap hipotalamus hilang sehingga prolactin dapat dikeluarkan dan laktasi terjadi. Perkembangan

payudara ini terjadi karena pengaruh hormon saat kehamilan yaitu estrogen, progesterone dan somatomotropin.

2) Sistem Endokrin

Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang berada dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran dan hasil sekresinya disebut hormone.

3) Sistem Kekebalan

HCG mampu menurunkan respon imun pada perempuan hamil. Selain itu kadar IgG, IgA dan IgM serum menurun mulai dari minggu ke-10 kehamilan hingga mencapai kadar terendah pada minggu ke-30 dan tetap berada pada kadar ini, hingga aterm.

4) Sistem Perkemihan

Ureter membesar, tonus otot-otot saluran kemih menurun akibat pengaruh estrogen dan progesterone. Kencing lebih sering (polyuria), laju filtrasi meningkat hingga 60%-150%. Dinding saluran kemih bisa tertekan oleh perbesaran uterus, menyebabkan hidroureter dan mungkin hidronefrosis sementara. Kadar kreatinin, urea dan asam urat dalam darah mungkin menurun namun ini dianggap normal.

5) Sistem Pencernaan

Estrogen dan hCG meningkat, dengan efek samping mual dan muntah-muntah. Selain itu, terjadi juga perubahan peristaltik dengan gejala sering kembung, konstipasi, lebih sering lapar/perasaan ingin makan terus (mengidam), juga akibat peningkatan asam lambung. System Musculoskeletal Estrogen dan realksasi memberi efek maksimal pada relaksasi otot dan ligament pelvic pada akhir kehamilan. Relaksasi ini digunakan oleh pelvis untuk meningkatkan kemampuannya dalam menguatkan posisi janin di akhir kehamilan dan saat kelahiran. Ligamen pada simipisis pubis dan sakroiliaka akan menghilang karena berelaksasi sebagai efek dari estrogen.

Lemahnya dan membesarnya jaringan menyebabkan terjadinya hidrasi pada trimester akhir. Simpisis pubis melebar hingga 4 mm pada usia gestasi 32 minggu dan sakrokoksigeus tidak teraba, diikuti terabanya koksigeus sebagai pengganti bagian belakang.

6) Sistem Kardiovaskuler

Selama hamil,kecepatan darah meningkat (jumlah darah yang dialirkan oleh jantung dalam setiap denyutnya) sebagai hasil dari peningkatan curah jantung. Ini meningkatkan volume darah dan oksigen keseluruh organ dan jaringan ibu untuk pertumbuhan janin. Pada kehamilan uterus menekan vena kava sehingga mengurangi darah vena yang akan kembali ke jantung. Curah jantung mengalami pengurangan sampai 23-30% dan tekanan darah bisa turun 10-15% yang bisa menyebabkan pusing,mual dan muntah. Vena kava menjadi miskin oksigen di akhir kehamilan sejalan dengan meningkatnya distensi dan tekanan padavena kaki, vulva,rectum dan pelvis yang akan menyebabkan edema dibagian kaki, vena dan hemoroid.

7) Sistem integument

Pada kulit terjadi perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh Melanophore Homron lobus hipofisis anterior dan pengaruh kelenjar suprarenalis. Hiperpigmentasi ini terjadi pada striae gravidarum livide atau alba,areola mammae, papilla mammae, line nigra, chloasma gravidarum. Setelah persalinan,hiperpigmentasi akan menghilang.

8) Metabolisme

Dengan terjadinya kehamilan, metabolisme tubuh mengalami perubahan yang mendasar dimana kebutuhan nutrisi menjadi makin tinggi untuk pertumbuhan janin dan persiapan pemberian ASI.

9) Berat badan dan indeks Masa Tubuh (IMT)

Peningkatan berat badan ibu selama kehamilan menandakan adanya adaptasi ibu terhadap pertumbuhan janin. Analisis dari

berbagai penelitian menunjukkan bahwa berat badan yang bertambah berhubungan dengan perubahan fisiologi yang terjadi pada kehamilan dan lebih dirasakan pada ibu primigravida untuk menambah berat badan pada masa kehamilan. Perkiraan peningkatan berat badan :

- a) 4 kg dalam kehamilan 20 minggu
- b) 8,5 dalam 20 minggu kedua (0,4kg/minggu dalam trimester akhir)
- c) Totalnya sekitar 12,5 kg

$IMT = \frac{BB}{TB}$ (BB dalam satuan kg, TB dalam satuan meter) IMT di klasifikasikan dalam 4 kategori :

- a) IMT rendah (26-29)
- b) IMT Normal (19,8-26)
- c) IMT Tinggi (>26-29)
- d) IMT obesitas (>29)

Peningkatan BB total selama hamil yang disarankan berdasarkan BMI Sebelum hamil:

- a) IMT Rendah (12,5-18 kg)
- b) IMT Normal (11,5-16 kg)
- c) IMT Tinggi (7,0-11,5 kg)
- d) IMT obesitas (± 6 kg)

10) Sistem Pernapasan

Pada kehamilan terjadi perubahan system respirasi untuk bisa memenuhi kebutuhan O₂. Disamping itu terjadi desakan diafragma akibat dorongan rahim yang membesar pada usia kehamilan 32 minggu. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan sampai 25 % dari biasanya.

11) Sistem persarafan

Pada ibu hamil akan ditemukan rasa sering kesemutan atau

acroestesia pada ekstremitas disebabkan postur tubuh ibu yang membungkung. Oedema pada trimester III edema menekan saraf perifer bawah ligament carpal pergelangan tangan menimbulkan carpal turner sindrom yang ditandai dengan parestisia dan nyeri pada tangan yang menyebar ke siku.

c. Adaptasi Psikologis Kehamilan Trimester III

Periode ini disebut periode menunggu dan waspada sebab pada saat ini ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, menunggu tanda-tanda persalinan. Perhatian ibu berfokus pada bayinya, gerakan janin dan membesarnya uterus meningkatkan pada bayinya. Sehingga ibu selalu waspada untuk melindungi bayinya dari bahaya, cedera dan akan menghindari benda yang dianggapnya membahayakan bayinya. (Marmi,2014) mengemukakan adaptasi Psikologis yang dialami ibu hamil pada trimester ke III disebut sebagai periode penantian dengan penuh kewaspadaan diantaranya:¹⁵

- 1) Rasa tidak nyaman timbul Kembali, merasa dirinya jelek, aneh dan tidak menarik.
- 2) Merasakan tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu.
- 3) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatanya.
- 4) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya.
- 5) Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya.
- 6) Merasa kehilangan perhatian.
- 7) Perasaan mudah terluka (sensitif).

d. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil pada Trimester III

Adapun kebutuhan dasar ibu hamil trimester III meliputi:¹⁶

1) Oksigen

Kebutuhan oksigen adalah kebutuhan yang utama pada manusia termasuk ibu hamil. Pada saat kehamilan ibu bisa mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen yang akanberakibat pada

bayi yang dikandung. Untuk mencegah hal tersebut ibu hamil dapat melakukan beberapa hal, seperti latihan senam nafas melalui senam hamil, tidur dengan bantal yang lebih tinggi, dan dengan tidak makan terlalu banyak.

Kebutuhan oksigen pada ibu selama kehamilan terjadi peningkatan yaitu 20-25%. Ibu hamil dengan anemia kebutuhannya lebih besar, hal ini terkait Hb yang berkurang menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen atau tidak tercukupinya pemenuhan oksigen dalam tubuh, sehingga akan mengganggu proses metabolisme.

2) Nutrisi

Pada trimester ini ibu hamil membutuhkan bekal energi yang memadai. Hal ini sebagai salah satu cadangan energi untuk mempersiapkan persalinan kelak. Seperti kalori, vitamin B6, yodium, vitamin (B1, B2, dan B3) dan air.

3) Personal hygiene

Untuk menjaga personal hygiene, ibu hamil dianjurkan mandi setidaknya dua kali sehari karena ibu hamil cenderung untuk mengeluarkan banyak keringat. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah dimulai dari kebersihan rambut dan kulit kepala, kebersihan payudara, kebersihan pakaian, kebersihan vulva, kebersihan kuku tangan dan kaki.

4) Eliminasi

Pada trimester III frekuensi BAK meningkat karena penurunan kepala ke PAP, sedangkan ibu hamil akan mudah terjadi obstipasi pada BAB karena hormon progesteron meningkat.

e. Ketidaknyamanan ibu hamil Trimester III

1) Sakit Bagian Belakang

Nyeri punggung pada kehamilan harus segera diatasi karena bisa mengakibatkan nyeri punggung jangka panjang, meningkatkan kecenderungan nyeri punggung pascapartum dan nyeri punggung kronis yang akan lebih sulit untuk diobati atau disembuhkan. Salah

satu cara untuk mengatasi nyeri punggung dan meningkatkan kesehatan selama kehamilan adalah dengan melakukan olah raga ringan seperti seperti senam hamil.¹⁷

Sakit pada daerah tubuh belakang (punggung-pinggang), karena meningkatnya beban berat dari bayi dalam kandungan yang dapat memengaruhi postur tubuh sehingga menyebabkan tekanan ke arah tulang belakang.¹⁷

Cara mengatasinya :

- a) Pakailah sepatu tumit rendah
 - b) Hindari mengangkat beban berat
 - c) Dengarkan isyarat tubuh, berhentilah mengangkat sesuatu jika anda merasakan ketegangan pada bagian punggung atau pinggang.
 - d) Berdiri dan berjalan dengan punggung dan bahu yang tegak karena sekarang beban berada di perut, dan tetap menjaga postur tubuh.
 - e) Mintalah pertolongan untuk melakukan pekerjaan rumah sehingga ibu tak perlu membungkuk terlalu sering. Selalu berusaha mempraktikkan postur yang benar untuk setiap kegiatan.
 - f) Gunakan kasur yang nyaman.
 - g) Tetap berolah raga ringan
- 2) Kontraksi Perut

Braxton-Hicks kontraksi atau kontraksi palsu ini berupa rasa sakit di bagian perut yang ringan, tidak teratur, dan akan hilang bila duduk atau istirahat.¹⁸

3) Bengkak

Perut dan bayi yang kian membesar selama kehamilan akan meningkat tekanan pada daerah kaki dan pergelangan kaki dan kadang membuat tangan membengkak. Ini disebut edema, yang disebabkan oleh perubahan hormon yang menyebabkan retensi

cairan.

4) Sulit tidur

Membesarnya janin, gerakan yang makin lincah, dan tekanan pada kandung kemih yang memaksa ibu hamil sering kencing adalah faktor utama pengganggu tidur. Cara mengatasinya : posisi yang dianjurkan pada fase ini adalah tidur miring ke kiri atau ke kanan.

f. Tanda bahaya Kehamilan Lanjut

Tanda bahaya pada kehamilan lanjut adalah sebagai berikut :

1) Perdarahan Pervaginam

a) Plasenta previa adalah keadaan dimana implantasi plasenta terletak pada atau didekat serviks, dan menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Tanda dan gejala : Perdarahan tanpa rasa nyeri dan usia gentasi > 22 minggu, perdarahan awal biasanya berupa bercak dan umumnya berhenti secara spontan, Jumlah perdarahan yang terjadi tergantung dari jenis plasenta previa dan darah berupa darah segar atau kehitaman dengan bekuan dan kadang disertai dengan syok, tidak ada kontraksi uterus, dan bagian terendah janin tidak masuk pintu atas panggul dan lebih sering disertai dengan kelainan letak, kondisi janin bisa normal atau terjadi gawat janin, Plasenta previa biasanya terjadi pada grande multipara.

b) Solusio plasenta adalah lepasnya plasenta sebelum waktunya. Secara normal plasenta lepas setelah anak lahir. Tanda dan gejala : Perdarahan yang tampak keluar atau tidak tampak keluar karena terkumpulnya dibelakang plasenta, warna darah kehitaman ada bekuan jika solusio relatif baru dan jika ostium terbuka terjadi perdarahan berwarna merah segar, pada solusio dengan perdarahan yang tak tampak mempunyai tanda yang lebih khas yaitu rahim keras seperti papan karena seluruh perdarahan tertahan didalam dan umumnya berbahaya karena perdarahan yang keluar, nyeri abdomen pada saat dipegang,

terjadi gawat janin atau bahkan bunyi jantung biasanya tidak ada, Solusio plasenta banyak terjadi pada kasus ibu hamil dengan hipertensi, trauma abdomen, polihidramnion, gemelli dan defisiensi gizi, terjadi anemia berat.

- c) Keluar Cairan Pervaginam, ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Kehamilan normal apabila tidak berupa perdarahan banyak, air ketuban maupun leukorhe patologis. Penyebab besar persalinan prematur adalah ketuban pecah sebelum waktunya. Insidensi dalam cairan ketuban pecah dini 10 % mendekati dari semua persalinan dan 4 % pada kehamilan kurang 34 minggu. Penyebab : Pervaginam serviks inkompeten, ketegangan rahim berlebihan (kehamilan ganda, hidramnion), kelainan bawaan dari selaput ketuban, infeksi.
- d) Nyeri Abdomen yang Hebat, yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa berarti apendisitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang panggul, persalinan preterm, gastritis, penyakit kandung empedu, uterus yang irritable, obruptio plasenta, ISK atau infeksi lain.

Beberapa tanda bahaya dalam kehamilan berdasarkan buku gerakan janin berkurang, bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang, air ketuban pecah sebelum waktunya, perdarahan pada kehamilan muda ataupun tua.¹⁴

g. Konsep Dasar Teori Antenatal Care (ANC)

1) Pengertian ANC

Antenatal Care adalah upaya preventif program pelayanan kesehatan obstetri optimalisasi luaran maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan selama kehamilan.¹⁹

2) Tujuan ANC

- a) Mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik maupun mental ibu dan bayi dengan pendidikan, nutrisi, kebersihan diri, serta proses kelahiran bayi.
 - b) Mendeteksi dan penatalaksanaan komplikasi medis, beda, atau obstetri selama kehamilan.
 - c) Memantau kemajuan kehamilan, memastikan kesejahteraan ibu, dan tumbuh kembang janin.
 - d) Mengembangkan persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi.
 - e) Membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, menjalankan nifas normal, serta merawat anak secara fisik, psikologis, dan sosial.
 - f) Mempersiapkan ibu dan keluarga dapat berperan dengan baik dalam memelihara bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal.¹⁹
- 3) Frekuensi kunjungan ANC
- a) Minimal 1 kali pada trimester I
 - b) Minimal 1 kali pada trimester II
 - c) Minimal 2 kali pada trimester III.¹⁵

Sedangkan menurut Kemenkes RI, Tahun 2020 dan sesuai dengan anjuran WHO menjelaskan bahwa Frekuensi pemeriksaan ANC pada kehamilan normal minimal dilakukan sebanyak 6x dengan rincian 2x di Trimester 1, 1x di Trimester 2, dan 3x di Trimester 3. Minimal 2x diperiksa oleh dokter saat kunjungan 1 di Trimester 1 dan saat kunjungan ke 5 di Trimester.^{20,21}

Tujuan setiap kunjungannya adalah: ANC ke-1 di Trimester 1 : skrining faktor risiko dilakukan oleh Dokter dengan menerapkan protokol kesehatan. Jika ibu datang pertama kali ke bidan, bidan tetap melakukan pelayanan antenatal seperti biasa, kemudian ibu dirujuk ke dokter untuk dilakukan skrining.^{20,21}

ANC ke-2 di Trimester 1, ANC ke-3 di Trimester 2, ANC ke-4 di

Trimester 3, dan ANC ke-6 di Trimester 3 : Dilakukan tindak lanjut sesuai hasil skrining. Tatap muka didahului dengan janji temu/terregistrasi dengan skrining anamnesa melalui media komunikasi (telepon)/secara daring untuk mencari faktor risiko dan gejala COVID-19.^{20,21}

ANC ke-5 di Trimester 3 Skrining faktor risiko persalinan dilakukan oleh Dokter dengan menerapkan protokol kesehatan. Skrining dilakukan untuk menetapkan : 1. faktor risiko persalinan, 2. menentukan tempat persalinan, dan 3. menentukan apakah diperlukan rujukan terencana atau tidak.^{20,21}

4) Tempat pelayanan ANC

Ibu hamil dapat melaksanakan pemeriksaan kehamilan di sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, praktek mandiri bidan dan dokter praktek.^{20,21}

5) Standar ANC yang diprogramkan

Standar pelayanan ANC meliputi standar 10T, sehingga ibu hamil yang datang memperoleh pelayanan komprehensif dengan harapan antenatal care dengan standar 10T dapat sebagai daya ungkit pelayanan kehamilan dan diharapkan ikut andil dalam menurunkan angka kematian ibu.²²

6) Pelayanan sesuai standar, yaitu 10 T

Sesuai dengan kebijakan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PPIBI) dan Kebijakan Kementerian Kesehatan RI yang tertuang di buku KIA tahun 2020 ada sepuluh standar pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang dikenal dengan 10T. Pelayanan atau asuhan standar minimal 10T adalah sebagai berikut:²⁰

a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan (T1)

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9-kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya

menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Pengukuran tinggi badan ibu hamil dilakukan untuk deteksi faktor risiko terhadap kehamilan. Jika kurang dari 145 cm meningkatkan risiko terjadinya Cephalopelvic Disproportion (CPD) atau panggul sempit.

b) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas /LILA) (T2)

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester I untuk skrining ibu hamil berisiko Kekurangan Energi Kronik (KEK). KEK disini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama (beberapa bulan/tahun) dimana LILA kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK akan dapat melahirkan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

c) Ukur tekanan darah (T3)

Tekanan darah yang normal 100/70 – 140/90 mmHg, pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah melebihi 140/90 mmHg) perlu diwaspadai pada kehamilan dan terjadinya preeklampsia (hipertensi disertai edema wajah dan atau tungkai bawah; dan atau proteinuria).

d) Ukur tinggi fundus uteri (T4)

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu.

e) Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) (T5)

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester III

bagian bawah janin bukan kepala, atau kepala janin belum masuk ke panggul berarti ada kelainan letak, panggul sempit atau ada masalah lain. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120/menit atau DJJ cepat lebih dari 160/menit menunjukkan adanya gawat janin.

f) Beri imunisasi Tetanus Toksoid (TT) (T6)

Pada kunjungan pertama ANC, dilakukan skrining status imunisasi TT ibu hamil, apabila diperlukan, diberikan imunisasi pada saat pelayanan antenatal. Tujuan dari imunisasi TT ini yaitu untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir serta melengkapi status imunisasi TT.

Tabel 1 Skrining imunisasi TT

Riwayat Imunisasi Ibu Hamil	Imunisasi Yang Didapat	Status Yang Diberikan
Imunisasi Dasar Lengkap	DPT-Hb 1 DPT-Hb 2 DPT-Hb 3	T1 dan T2
Anak Sekolah Kelas 1 SD	DT	T3
Kelas 2 SD	Td	T4
Kelas 3 SD	Td	T5
Calon Pengantin, Masa Hamil	TT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika ada status T diatas yang tidak terpenuhi ▪ Lanjutkan urutan T yang belum terpenuhi ▪ Perhatikan interval pemberian

Sumber : PP IBI, 2016

Tabel 2 Interval dalam Perlindungan TT Imunisasi

Imunisasi	Pemberian Imunisasi	Selang waktu pemberian minimal	Masa Perlindungan
TT WUS	T1	-	-
	T2	4 minggu setelah T1	3 tahun
	T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
	T4	1 tahun setelah T3	10 tahun
	T5	3 tahun setelah T4	25 tahun

Sumber: PP IBI, 2016: 60.

g) Beri tablet tambah darah (tablet besi) (T7)

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah (tablet zat besi) dan Asam Folat minimal 90 tablet selama kehamilan diberikan sejak kontak pertama.

h) Periksa laboratorium (rutin dan khusus) (T8)

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal, pemeriksaan dibagi menjadi pemeriksaan laboratorium wajib dan atas indikasi sebagai berikut:

Pemeriksaan rutin

(1) Pemeriksaan golongan darah

Pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil tidak hanya untuk mengetahui jenis golongan darah ibu melainkan juga untuk mempersiapkan calon pendonor darah yang sewaktu-waktu diperlukan apabila terjadi situasi kegawatdaruratan.

(2) Pemeriksaan kadar haemoglobin darah (Hb)

Pemeriksaan kadar haemoglobin darah ibu hamil dilakukan minimal sekali pada trimester pertama dan sekali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak

selama kehamilannya karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang janin dalam kandungan.

(3) Pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Pemeriksaan HIV terutama untuk daerah dengan risiko tinggi kasus HIV dan ibu hamil yang dicurigai menderita HIV. Ibu hamil setelah menjalani konseling kemudian diberi kesempatan untuk menetapkan sendiri keputusannya untuk menjalani tes HIV.

(4) Pemeriksaan protein dalam urine

Pada ibu hamil dilakukan pada trimester kedua dan ketiga atas indikasi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui adanya proteinuria pada ibu hamil. Proteinuria merupakan salah satu indikator terjadinya preeklampsia pada ibu hamil.

(5) Pemeriksaan Hbsag

Semua Ibu hamil secara rutin harus menjalani pemeriksaan HBsAg pada kunjungan awal / trimester I dalam setiap kehamilan, ibu hamil yang berstatus HBsAg positif, bayinya harus dijamin mendapatkan vaksinasi atau imunoglobulin sesuai kebutuhan.

(6) Pemeriksaan dengan indikasi

(a) Pemeriksaan kadar gula darah (bila ada indikasi)

(b) Pemeriksaan darah malaria (untuk daerah endemis malaria)

(c) Pemeriksaan tes Sifilis (bila ada indikasi)

(d) Pemeriksaan BTA

Pemeriksaan BTA dilakukan pada ibu hamil yang dicurigai menderita penyakit tuberkulosis sebagai pencegahan agar infeksi tuberkulosis tidak mempengaruhi kesehatan janin.

(e) Pemeriksaan protein dalam urin (Bila ada indikasi)
Pemeriksaan protein dalam urine pada ibu hamil dilakukan pada trimester kedua dan ketiga atas indikasi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui adanya proteinuria pada ibu hamil. Proteinuria merupakan salah satu indikator terjadinya preeklampsia pada ibu hamil.

i) Tatalaksana atau penanganan Kasus (T9)

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan.

j) Temu wicara (Konseling) (T10)

Temu wicara dan konseling dilakukan setiap kunjungan antenatal yang meliputi kesehatan ibu, perilaku hidup sehat, peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta kesiapan menghadapi komplikasi, asupan gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak menular, penawaran untuk melakukan testing dan konseling HIV, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, KB pasca persalinan, imunisasi dan peningkatan kesehatan intelegensia pada kehamilan.

7) Pelayanan Antenatal Terintegrasi

Merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan menanyakan tanda-tanda penting yang terkait dengan kehamilan dan penyakit yang kemungkinan diderita ibu hamil.^{23,21}

a) Muntah berlebihan

Rasa mual dan muntah bisa muncul pada kehamilan muda terutama pada pagi hari namun kondisi ibu biasanya hilang setelah

kehamilan berumur 3 bulan. Keadaan ini tidak perlu dikhawatirkan, kecuali kalau memang cukup berat, sehingga tidak dapat makan dan berat badan menurun terus.

b) Pusing

Pusing biasa muncul pada kehamilan muda. Apabila pusing sampai mengganggu aktivitas sehari-hari maka perlu diwaspadai.

c) Sakit Kepala

Sakit kepala yang hebat atau yang menetap timbul pada ibu hamil mungkin dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin.

d) Perdarahan

Perdarahan waktu hamil, walaupun hanya sedikit sudah merupakan tanda bahaya sehingga ibu hamil harus waspada.

e) Sakit perut hebat

Nyeri perut yang hebat dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin.

f) Demam

Demam tinggi lebih dari 2 hari atau keluarnya cairan berlebihan dari liang rahim dan kadang-kadang berbau merupakan salah satu tanda bahaya pada kehamilan.

g) Batuk lama

Batuk lama lebih dari 2 minggu, perlu ada pemeriksaan lanjut dan dapat dicurigai ibu hamil menderita TB.

h) Berdebar-debar

Jantung berdebar-debar pada ibu hamil merupakan salah satu masalah pada kehamilan yang harus diwaspadai.

i) Cepat Lelah

Dalam dua atau tiga bulan pertama kehamilan, biasanya timbul rasa lelah, ngantuk yang berlebihan dan pusing, yang biasanya terjadi pada sore hari. Kemungkinan ibu menderita kurang darah

j) Sesak nafas atau sukar bernafas

Pada akhir bulan kedelapan ibu hamil sering merasa sedikit sesak

bila bernafas karena bayi menekan paru-paru ibu. Namun apabila hal ini terjadi berlebihan maka perlu diwaspadai.

k) Keputihan yang berbau

Keputihan yang berbau merupakan salah satu tanda bahaya pada ibu hamil.

l) Gerakan janin

Gerakan bayi mulai dirasakan ibu pada kehamilan akhir bulan keempat. Apabila gerakan janin belum muncul pada usia kehamilan ini, gerakan yang semakin berkurang atau tidak ada gerakan janin maka ibu hamil harus waspada.

m) Perilaku berubah selama hamil

Perilaku berubah selama hamil seperti gaduh gelisah, menarik diri, bicara sendiri, tidak mandi dan sebagainya. Selama kehamilan, ibu bisa mengalami perubahan perilaku. Hal ini disebabkan karena perubahan hormonal. Pada kondisi yang mengganggu kesehatan ibu dan janinnya maka akan dikonsultasikan ke psikiater.

n) Riwayat Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) selama kehamilan

Informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan terutama ibu hamil seringkali sulit untuk digali. Korban kekerasan selalu mau berterus terang pada kunjungan pertama, yang mungkin disebabkan oleh rasa takut atau belum mampu mengemukakan masalahnya kepada orang lain, termasuk petugas kesehatan. Dalam keadaan ini, petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali korban dan memberikan dukungan agar mau membuka diri.

8) Pedoman Program Perencanaan Pencegahan Komplikasi (P4K)

a) Pengertian

P4K dengan stiker adalah kepanjangan dari Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi

komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.¹⁴

b) Tujuan umum adanya program P4K

Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat.¹⁴

c) Tujuan khusus adanya program P4K antara lain

(1) Terdatanya status ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di setiap rumah ibu hamil yang memuat informasi tentang lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan, calon pendonor darah, transportasi yang akan digunakan serta pembiayaan.¹⁴

(2) Adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca persalinan yang sesuai dan disepakati ibu hamil, suami, keluarga dan bidan.¹⁴

(3) Terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas.¹⁴

(4) Meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat baik formal maupun non formal, dukun atau pendamping persalinan dan kelompok masyarakat dalam perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dengan stiker, dan KB pasca salin sesuai dengan perannya masing-masing.¹⁴

d) Manfaat P4K antara lain:

(1) Mempercepat berfungsinya desa siaga.

(2) Meningkatkan cakupan pelayanan Antenatal Care (ANC)

sesuai standar.

- (3) Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil.
- (4) Meningkatkan kemitraan bidan dan dukun.
- (5) Tertanganinya kejadian komplikasi secara dini.
- (6) Meningkatnya peserta KB pasca salin.
- (7) Terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi.
- (8) Menurunnya kejadian kesakitan dan kematian ibu serta bayi.

21

e) Terapi Yang Diberikan Pada Ibu Hamil Selama Masa Kehamilan

(1) Kalk (Calcium lactate)

Calcium lactate atau kalsium laktat adalah obat untuk mencegah atau mengobati rendahnya kadar kalsium dalam darah pada orang-orang yang tidak mendapatkan cukup kalsium dalam makanannya. Calcium lactate biasanya digunakan oleh ibu hamil dan menyusui, serta penderita penyakit yang diakibatkan tingkat kalsium rendah seperti osteoporosis, hipoparatiroidisme, dan penyakit otot tertentu. Kalk ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan kalsium terutama bagi ibu hamil. Kalk diberikan dengan dosis 1x1. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan yang berlebihan akan mengganggu metabolisme.^{14,21}

(2) Tablet Besi (Fe)

Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah (haemoglobin). Penyerapan besi dipengaruhi oleh banyak faktor. Protein hewani dan vitamin C meningkatkan penyerapan, sedangkan kopi, teh, susu, coklat, minuman bersoda dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh, jadi waktu dan tepatnya untuk minum Fe yaitu pada malam hari menjelang tidur hal ini untuk mengurangi rasa mual dan timbul setelah ibu meminumnya.^{14,21}

3. Kajian Teori Skrining Faktor Resiko Kehamilan

Kehamilan dan persalinan selalu mempunyai risiko, dengan kemungkinan bahaya yang terjadi komplikasi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas (Kemenkes, 2014). Kehamilan risiko tinggi adalah keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi.²⁴ Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung.²⁵ Karakteristik ibu hamil diketahui bahwa faktor penting penyebab risiko tinggi pada kehamilan terjadi pada kelompok usia 35 tahun dikatakan usia tidak aman karena saat bereproduksi pada usia 35 tahun dimana kondisi organ reproduksi wanita sudah mengalami penurunan kemampuan untuk bereproduksi, tinggi badan kurang dari 145 cm, berat badan kurang dari 45 kg, jarak anak terakhir dengan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun, jumlah anak lebih dari 4. Faktor penyebab risiko kehamilan apabila tidak segera ditangani pada ibu dapat mengancam keselamatan bahkan dapat terjadi hal yang paling buruk yaitu kematian ibu dan bayi

Faktor risiko adalah kondisi pada ibu hamil yang dapat menyebabkan kemungkinan risiko/bahaya terjadinya komplikasi pada persalinan yang dapat menyebabkan kematian atau kesakitan pada ibu dan/bayinya.²⁶ Adapun Kehamilan risiko tinggi dibagi menjadi 3 kategori menurut Rochjati (2014), yaitu:²⁷

- a. Kehamilan Risiko Rendah (KRR) dengan jumlah skor 2 merupakan kehamilan yang tidak disertai oleh faktor risiko atau penyulit sehingga kemungkinan besar ibu akan melahirkan secara normal dengan ibu dan janinnya dalam keadaan hidup sehat.
- b. Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) dengan skor 6-10 merupakan kehamilan yang disertai satu atau lebih faktor risiko/penyulit baik yang berasal dari ibu maupun janinnya sehingga memungkinkan terjadinya kegawatan saat kehamilan maupun persalinan namun tidak darurat.
- c. Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRTS) dengan jumlah skor >12

Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST) merupakan kehamilan dengan faktor risiko:

- 1) Perdarahan sebelum bayi lahir, dimana hal ini akan memberikan dampak gawat dan darurat pada ibu dan janinnya sehingga membutuhkan rujukan tepat waktu dan penanganan segera yang adekuat untuk menyelamatkan dua nyawa.
- 2) Ibu dengan faktor risiko dua atau lebih, dimana tingkat kegawatannya meningkat sehingga pertolongan persalinan harus di rumah sakit dengan ditolong oleh dokter spesialis

Puji Rochjati dalam Manuaba et al. (2013) menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ibu hamil risiko tinggi yaitu seperti primi muda berusia kurang dari 16 tahun, primipara tua berusia lebih dari 35 tahun, primipara sekunder dengan usia anak terkecil diatas 5 tahun, tinggi badan kurang dari 145cm, riwayat kehamilan yang buruk (pernah keguguran, pernah persalinan premature, lahir mati, dan riwayat persalinan dengan tindakan seperti ekstraksi vakum, ekstraksi forsep, dan operasi sesar), pre-eklamsia, eklamsia, gravida serotinus, kehamilan dengan pendarahan antepartum, kehamilan dengan kelainan letak, kehamilan dengan penyakit ibu yang mempengaruhi kehamilan.²⁷

Ibu hamil berusia 35 tahun atau lebih, dimana pada usia tersebut terjadi perubahan pada jaringan alat – alat kandungan dan jalan lahir tidak lentur lagi. Selain itu ada kecenderungan didapatkan penyakit lain dalam tubuh ibu. Bahaya yang dapat terjadi tekanan darah tinggi dan pre-eklamsia, ketuban pecah dini, persalinan tidak lancar atau macet, perdarahan setelah bayi lahir.

Tabel 3. Faktor risiko yang terdapat dalam kelompok 1

No	Faktor Risiko (FR I)	Batasan Kondisi Ibu
1	Primi Muda	Terlalu mud, hamil pertama ≤ 16 tahun
2	Primi Tua	a. Terlalu tua, hamil pertama umur ≥ 35 tahun b. Terlalu lambat hamil, setelah kawin ≥ 4 tahun
3	Primi Tua Sekunder	Terlalu lama punya anak lagi, terkecil ≥ 10 tahun

4	Anak Terkecil <2 tahun	Terlalu cepat punya anak lagi, terkecil ≥ 2 tahun
5	Grande Multi	Terlalu banyak punya anak, 4 atau lebih
6	Umur >35 tahun	Terlalu tua, hamil umur 35 tahun atau lebih
7	Tinggi Badan <145 cm	Terlalu pendek dengan ibu hamil pertama; hamil kedua atau lebih, tetapi belum pernah melahirkan normal/spontan dengan bayi cukup bulan dan hidup
8	Pernah gagal kehamilan	a. Hamil kedua, pertama gagal b. Hamil ketiga/lebih mengalami gagal (abortus, lahir mati) 2 kali
9	Pernah melahirkan dengan:	a. Pernah melahirkan dengan tarikan tang/vakum b. Pernah uri dikeluarkan oleh penolong dari dalam rahim c. Pernah diinfus/transfusi pada perdarahan pasca persalinan
10	Pernah Operasi Sesar	Pernah melahirkan bayi dengan operasi sesar sebelum kehamilan ini

Sumber: Rochjati, 2011²⁸

Tabel 4 Faktor risiko yang terdapat dalam kelompok II

No	Faktor Risiko (FR II)	Batasan Kondisi Ibu
1	Penyakit ibu hamil	
	a. Anemia	Pucat, lemas badan, lekas lelah, lesu, mata berkunang-kunang
	b. Malaria	Panas tinggi, menggigil keluar keringat, sakit kepala
	c. Tuberkulosa paru	Batuk lama tidak sembuh-sembuh, batuk darah, badan lemah, lesu dan kurus
	d. Payah jantung	Sesak nafas, jantung berdebar-debar, kaki bengkak
	e. Kencing manis	Diketahui diagnosa dokter dengan pemeriksaan laboratorium
	f. PMS, dll	Diketahui diagnosa dokter dengan pemeriksaan laboratorium
2	Preeklamsia ringan	Bengkak tungkai dan tekanan darah tinggi
3	Hamil kembar/gemeli	Perut ibu sangat besar, gerak anak terasa dibanyak tempat
4	Hamil kembar air/Hidramnion	Perut ibu sangat membesar, gerak anak kurang terasa karena air ketuban terlalu banyak, biasanya anak kecil
5	Hamil bulan/hamil serotinus	Ibu hamil 9 bulan dan lebih 2 minggu belum melahirkan

6	Janin mati di dalam Rahim	Ibu hamil tidak merasakan gerakan anak lagi, perut mengecil
7	Letak sungsang	Rasa berat menunjukkan letak dari kepala janin di atas perut; kepala bayi ada di atas dalam rahim
8	Latak lintang	Rasa berat menunjukkan letak kepala janin di samping perut; kepala bayi dalam rahim terletak di sebelahh kanan atau kiri.

Tabel 5 Faktor risiko yang terdapat dalam kelompok III

No	Faktor Risiko (FR II)	Batasan Kondisi Ibu
1	Perdarahan sebelum bayi lahir	Mengelurkan darah pada waktu hamil, sebelum melahirkan bayi
2	Preklampsia berat Eklampsia	Pada hamil 6 bulan lebih; sakit kepala/pusing, bengkak tungkai/wajah, tekanan darah tinggi, pemeriksaan urine ada albumin Ditambah dengan terjadi kejang-kejang

4. Presentasi Bokong

a. Pengertian

Presentasi Bokong atau Letak sungsang adalah suatu keadaan dimana posisi janin memanjang (membujur) dalam rahim dengan kepala berada pada bagian atas rahim (fundus uteri) dan bokong berada dibagian bawah ibu.^{29,30}

b. Etiologi

Penyebab terjadinya letak sungsang berdasarkan faktor janin adalah:³⁰

1) Gemeli (kehamilan ganda)

Kehamilan dengan dua janin atau lebih dalam rahim, sehingga menyebabkan terjadinya perebutan tempat. Setiap janin berusaha mencari tempat yang lebih nyaman, sehingga ada kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar (yakni bokong janin) berada di bagian bawah rahim.

2) Hidramnion

Didefinisikan jumlah air ketuban melebihi normal (lebih 2000 cc) sehingga hal ini bisa menyebabkan janin bergerak lebih leluasa walau

sudah memasuki trimester ketiga.

3) Hidrocephalus

Keadaan dimana terjadi penimbunan cairan serebrospinalis dalam ventrikel otak, sehingga kepala menjadi besar serta terjadi pelebaran sutura-sutura dan ubun-ubun. Karena ukuran kepala janin terlalu besar dan tidak dapat berakomodasi dibagian bawah uterus, maka sering ditemukan dalam letak sungsang.

Selain faktor janin, penyebab terjadinya letak sungsang berdasarkan faktor ibu yaitu srbagai berikut:

1) Plasenta previa

Keadaan dimana plasenta berimplantasi pada tempat abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir (osteum uteri internal). Akibatnya keadaan ini menghalangi turunnya kepala janin ke dalam pintu atas panggul sehingga janin berusaha mencari tempat yang lebih luas yakni dibagian atas rahim.

2) Panggul sempit

Sempitnya ruang panggul mendorong janin mengubah posisinya menjadi sungsang.

3) Multiparitas

Ibu atau wanita yang pernah melahirkan bayi beberapa kali (lebih dari 4 kali), sehingga rahimnya sudah sangat elastis, keadaan ini membuat janin berpeluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya.

4) Kelainan uterus

Kelainan uterus seperti uterus arkuatus, uterus bikornis, mioma uteri. Adanya kelainan didalam uterus akan mempengaruhi posisi dan letak janin dalam rahim, janin akan berusaha mencari ruang / tempat yang nyaman.

c. Klasifikasi Presentasi Bokong

Gambar 2 Klasifikasi Presentasi Bokong



- 1) Presentasi bokong murni (*frank breech*) yaitu letak sungsang dimana kedua kaki terangkat ke atas sehingga ujung kaki setinggi bahu atau kepala janin (gambar a).
- 2) Presentasi bokong kaki sempurna (*complete breech*) yaitu letak sungsang dimana kedua kaki dan tangan menyilang sempurna dan di samping bokong dapat diraba kedua kaki (gambar b).
- 3) Presentasi bokong kaki tidak sempurna (*incomplete breech*) yaitu letak sungsang dimana hanya satu kaki di samping bokong, sedangkan kaki yang lain terangkat ke atas (gambar c).

d. Diagnosis

Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan abdominal pada palpasi di bagian bawah teraba bagian yang kurang keras dan kurang bundar, sementara di fundus teraba bagian yang keras, bundar dan melenting. Denyut jantung janin terdengar di atas pusat. Pemeriksaan USG atau rontgen dapat mengetahui letak yang sebenarnya pada pemeriksaan pervaginam teraba bagian lunak anus juga akan teraba bagian sacrum.³¹

e. Golongan resiko tinggi kehamilan letak sungsang³¹

- 1) Kehamilan sungsang pada kasus infertilitas
- 2) Kehamilan sungsang dengan riwayat obstetri buruk: sering mengalami abortus/ keguguran, persalinan prematur, IUFD.
- 3) Kehamilan sungsang dengan perdarahan
- 4) Kehamilan sungsang dengan hipertensi/ tekanan darah tinggi
- 5) Kehamilan sungsang dengan umur ibu kurang dari 20 tahun atau

diatas 35 tahun

- 6) Kehamilan sungsang yang terjadi pada ibu primigravida
- 7) Kehamilan sungsang dengan penyakit sistemik ibu : penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru
- 8) Kehamilan sungsang inpartu dengan keadaan abnormal : bayi besar, ketuban pecah dini/ ketuban pecah awal, terjadi prolapsus funikuli, bayi prematur, infeksi pada ibu, terjadi distres janin.

5. Konsep Dasar Persalinan

a. Definisi Persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lahir lain dengan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).³²

Persalinan dianggap normal jika terjadi pada kehamilan usia cukup bulan (>37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum inpartu jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan serviks.³³ Persalinan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Persalinan spontan

Persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir.

2) Persalinan buatan

Persalinan yang dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya dengan ekstraksi vakum, forsep, ataupun sectio caesarea.

3) Persalinan anjuran

Persalinan yang berlangsung dengan pemberian obat untuk merangsang timbulnya kontraksi, misalnya dengan pemecahan ketuban, pemberian pitocin, atau prostaglandin.³⁴

b. Tanda-tanda Persalinan

1) Tanda pendahuluan adalah:16

- a) Ligenting atau setting atau dropping, yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul.
- b) Perut kelihatan lebih melebar dan fundus uteri turun.
- c) Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karena kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin.
- d) Perasaan nyeri di perut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-kontraksi lemah uterus, kadang-kadang disebut “*false labor pains*”.
- e) Serviks menjadi lembek; mulai mendatar; dan sekresinya bertambah, mungkin bercampur darah (*bloody show*).

2) Tanda Pasti Persalinan meliputi:

- a) Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering, dan teratur.
- b) Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karena robekan- robekan kecil pada serviks.
- c) Kadang-kadang, ketuban pecah dengan sendirinya.
- d) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada pembukaan.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu faktor power, faktor passenger, faktor passage, dan factor psyche:³⁵

a) Faktor Power (Kekuatan)

Power adalah kekuatan janin yang mendorong janin keluar. Kekuatan yang mendorong janin keluar dalam persalinan ialah his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma dan aksi dari ligament, dengan kerja sama yang baik dan sempurna.

b) Faktor Passanger (Bayi)

Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor janin,yang meliputi sikap janin, letak janin, presentasi janin, bagian terbawah janin, dan posisi janin.

c) Faktor Passage (Jalan Lahir)

Passage atau faktor jalan lahir dibagi atas: Bagian keras: tulang-tulang panggul (rangka panggul) dan bagian lunak: otot-otot, jaringan-jaringan, dan ligament- ligament.

d) Faktor *Psyche* (Psikis)

Psikis ibu bersalin sangat berpengaruh dari dukungan suami dan anggota keluarga yang lain untuk mendampingi ibu selama bersalin dan kelahiran anjurkan merreka berperan aktif dalam mendukung dan mendampingi langkah-langkah yang mungkin akan sangat membantu kenyamanan ibu, hargai keinginan ibu untuk didampingi, dapat membantu kenyamanan ibu, hargai keinginan ibu untuk didampingi.³⁵

e) Posisi Ibu (*Positioning*)

Posisi ibu dapat memengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Perubahan posisi yang diberikan pada ibu bertujuan untuk menghilangkan rasa letih, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi.³⁵

4) Tahap Persalinan

Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 kala, yaitu:³⁶

a) Kala I

Inpartu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar kanalis servikalis karena pergeseran pergeseran ketika serviks mendatar dan membuka.

Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0-10 cm atau pembukaan lengkap. Proses ini terjadi dua fase yakni fase laten selama 8 jam dimana serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif selama 7 jam dimana serviks membuka dari 3-10 cm. Kontraksi lebih kuat dan sering terjadi selama fase aktif. Pada permulaan his kala pembukaan berlangsung tidak

begitu kuat sehingga atau ibu bersalin masih dapat berjalan-jalan.

Pemantauan kemajuan persalinan dilakukan dengan menggunakan partograf, pemantauan DJJ setiap 30 menit sekali, tekanan darah diperiksa selama 4 jam sekali, suhu selama 2 jam sekali, nadi selama 30 menit, pemeriksaan dalam dilakukan 4 jam sekali, dan DJJ yang normal adalah 100x/ menit-180x/ menit.

b) Kala II

Kala II merupakan kala pengeluaran bayi dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Uterus dengan kekuatan hisnya ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida.³⁷ Diagnosis persalinan ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm.

Tanda dan gejala persalinan kala II adalah:³⁵

- (1) Ibu ingin mengejan. Keinginan untuk mengejan akibat tertekannya pleksus Frankenhauser
- (2) Perineum menonjol
- (3) Vulva vagina dan sphincter anus membuka
- (4) Jumlah pengeluaran air ketuban meningkat. Menjelang akhir kala I ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak.
- (5) His semakin kuat dan lebih cepat dengan interval 2 sampai 3 menit dengan durasi 50 sampai 60 detik.
- (6) Pembukaan lengkap (10 cm) :Pada primigravida berlangsung rata-rata 1.5 jam dan multipara rata-rata 0.5 jam.

c) Kala III

Kala III adalah waktu untuk pelepasan plasenta dan pengeluaran plasenta. Setelah kala II yang berlangsung tidak

lebih dari 30 menit, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 sampai 10 menit. Dengan lahirnya bayi dan proses retraksi uterus, maka plasenta lepas dari lapisan *nitabusch*. Pelepasan plasenta diperkirakan dengan melihat beberapa tanda meliputi uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke arah segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang, terdapat semburan darah tiba-tiba.¹³ Plasenta dan selaput ketuban harus diperiksa secara teliti setelah dilahirkan, bagian plasenta lengkap atau tidak. Bagian permukaan maternal yang normal memiliki 6 sampai 20 kotiledon. Jika plasenta tidak lengkap maka disebut ada sisa plasenta serta dapat mengakibatkan perdarahan yang banyak dan infeksi.³⁵

d) Kala IV

Kala empat merupakan tahapan persalinan berupa tindakan observasi 2 jam pertama post partum, sejak plasenta lahir sampai keadaan ibu menjadi stabil. Pemantauan dilakukan karena banyak perdarahan terjadi pada 2 jam pertama persalinan.³⁸

6. Konsep Dasar Teori Nifas

a. Definisi

Masa nifas berasal dari bahasa latin, yaitu puer artinya bayi dan parous artinya melahirkan atau masa sesudah melahirkan. Asuhan kebidanan masa nifas adalah penatalaksanaan asuhan yang diberikan pada pasien mulai dari saat setelah lahirnya bayi sampai dengan kembalinya tubuh dalam keadaan seperti sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil.³⁹

Masa Nifas dimulai setelah 2 jam postpartum dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan baik secara fisiologi maupun psikologis akan pulih dalam waktu 3 bulan.

Masa nifas dibagi dalam 4 tahap, yaitu:^{40,41}

1) Periode immediate postpartum

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini merupakan fase kritis, sering terjadi insiden perdarahan postpartum karena atonia uteri. Oleh karena itu, bidan perlu melakukan pemantauan secara kontinu, yang meliputi; kontraksi uterus, pengeluaran lochea, kandung kemih, tekanan darah dan suhu.

2) Periode early postpartum (>24 jam-1 minggu)

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lochea tidak berbau busuk, tidak demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik.

3) Periode late postpartum (>1 minggu-6 minggu)

Pada periode ini bidan tetap melakukan asuhan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling perencanaan KB.

4) Remote puerperium

Remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat terutama bila selama hamil atau bersalin memiliki penyulit atau komplikasi.

b. Perubahan Fisiologis Masa Nifas

Perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas meliputi hal-hal berikut ini:

1) Perubahan pada sistem reproduksi

a) Involusi

Involusi adalah kembalinya uterus pada ukuran, tonus dan posisinya sebelum hamil. Mekanisme involusi uterus:

- (1) Iskemia miometrium, hal ini disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus menerus dari uterus setelah pengeluaran plasenta sehingga membuat uterus menjadi relatif anemi dan menyebabkan serat otot atrofi.
- (2) Atrofi jaringan yang terjadi sebagai reaksi penghentian hormon estrogen saat pelepasan plasenta.
- (3) Autolisis, merupakan proses penghancuran diri sendiri yang

terjadi di dalam otot uterus. Enzim proteolitik akan memendekkan jaringan otot yang telah mengendur hingga panjangnya 10 kali panjang sebelum hamil dan lebarnya 5 kali lebih lebar sebelum hamil yang terjadi selama kehamilan. Proses autolisis ini terjadi karena penurunan hormon estrogen dan progesteron.

- (4) Efek Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterus sehingga akan menekan pembuluh darah yang mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke uterus.

Proses ini membantu untuk mengurangi suplai darah pada tempat implantasi plasenta serta mengurangi perdarahan. Dalam keadaan normal berat uterus setelah kelahiran kurang lebih 1 kg sebagai akibat involusi. Satu minggu setelah melahirkan beratnya menjadi kurang lebih 500 gram, pada akhir minggu kedua setelah persalinan menjadi kurang lebih 300 gram, setelah itu menjadi 100 gram atau kurang.⁴²

Tabel 6 Involusi Uteri

Involusi Uteri	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus
Plasenta lahir	Setinggi pusat	1000 gram	12,5 cm
7 hari (minggu 1)	Pertengahan pusat dan simpisis	500 gram	7,5 cm
14 hari (minggu 2)	Tidak teraba	350 gram	5 cm
6 minggu	Normal	60 gram	2,5 cm

b) Pengeluaran lochea dan pengeluaran pervaginam

Lochea berasal dari bahasa latin, yang digunakan untuk menggambarkan perdarahan pervaginam setelah persalinan. Macam-macam lochea.⁴²

- 1) Lochea rubra (cruenta)

Berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, dan mekonium selama 2 hari pasca persalinan.

2) Lochea sanguilenta

Berwarna merah kuning berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 pasca persalinan.

3) Lochea serosa

Lochea ini bentuk serum dan berwarna merah jambu kemudian menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pasca persalinan.

4) Lochea alba

Dimulai dari hari ke-14, berbentuk seperti cairan putih serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua.

c) Serviks

Serviks mengalami involusi bersama-sama uterus. Setelah persalinan, ostium uteri eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 jari tangan, setelah 6 minggu persalinan serviks akan menutup.⁴²

d) Vulva, vagina dan perineum

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu post partum, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae padavagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali. Hymen tampak sebagai carunculae myrtiformis, yang khas pada ibu multipara.³⁹

Ukuran vagina agak sedikit lebih besar dari sebelum persalinan. Perubahan pada perineum post partum terjadi pada saat perineum mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi secara spontan maupun dilakukan episiotomi dengan indikasi tertentu. Meskipun demikian, latihan otot perineum dapat mengembalikan tonus tersebut dan dapat mengencangkan vagina hingga tingkat

tertentu. Hal ini dapat dilakukan pada masa nifas dengan latihan atau senam nifas.⁴²

2) Perubahan pada tanda-tanda vital

Frekuensi nadi ibu secara fisiologis pada kisaran 60-80 kali permenit. Perubahan nadi yang menunjukkan frekuensi bradikardi (100 kali permenit) menunjukkan adanya tanda syok atau perdarahan. Frekuensi dan intensitas nadi merupakan tanda vital yang sensitif terhadap adanya perubahan keadaan umum ibu. Perubahan suhu secara fisiologis terjadi pada masa segera setelah persalinan, yaitu terdapat sedikit kenaikan suhu tubuh pada kisaran 0,2-0,5°C, dikarenakan aktivitas metabolisme yang meningkat saat persalinan, dan kebutuhan kalori yang meningkat saat persalinan. Perubahan suhu tubuh berada pada kisaran 36,5°C-37,5°C. Namun kenaikan suhu tubuh tidak mencapai 38°C, karena hal ini sudah menandakan adanya tanda infeksi. Perubahan suhu tubuh ini hanya terjadi beberapa jam setelah persalinan, setelah ibu istirahat dan mendapat asupan nutrisi serta minum yang cukup, maka suhu tubuh akan kembali normal.⁴³

Setelah kelahiran bayi, harus dilakukan pengukuran tekanan darah. Jika ibu tidak memiliki riwayat morbiditas terkait hipertensi, superimposed hipertensi serta preeklampsia/eklampsia, maka biasanya tekanan darah akan kembali pada kisaran normal dalam waktu 24 jam setelah persalinan. Pada keadaan normal, frekuensi pernapasan relatif tidak mengalami perubahan pada masa postpartum, berkisar pada frekuensi pernapasan orang dewasa 12-16 kali permenit.⁴¹

3) Perubahan pada sistem kardiovaskuler

Perubahan volume darah bergantung pada beberapa faktor, misalnya kehilangan darah selama melahirkan dan mobilisasi, serta pengeluaran cairan ekstrasvaskuler (edema fisiologis). Kehilangan darah merupakan akibat penurunan volume darah total yang cepat, tetapi terbatas. Setelah itu terjadi perpindahan normal cairan tubuh

yang volume darah menurun dengan lambat. menyebabkan Pada minggu ke-3 dan ke-4 setelah bayi lahir, volume darah biasanya menurun sampai mencapai volume darah sebelum hamil.⁴¹

Pada persalinan pervaginam, ibu kehilangan darah sekitar 300-400 cc. Pada persalinan dengan tindakan SC, maka kehilangan darah dapat dua kali lipat. Perubahan pada sistem kardiovaskuler terdiri atas volumedarah (blood volume) dan hematokrit (haemoconcentration). Pada persalinan pervaginam, hematokrit akan naik sedangkan pada persalinan dengan SC, hematokrit cenderung stabil dan kembali normal setelah 4-6 minggu postpartum. Tiga perubahan fisiologi sistem kardiovaskuler postpartum yang terjadi pada wanita antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a) Hilangnya sirkulasi uteroplasenta yang mengurangi ukuran pembuluh darah maternal 10-15%.
- b) Hilangnya fungsi endokrin plasenta yang menghilangkan stimulus vasodilatasi.
- c) Terjadinya mobilisasi air ekstravaskuler yang disimpan selama wanita hamil.

Denyut jantung, volume dan curah jantung meningkat sepanjang masa hamil. Segera setelah wanita melahirkan, keadaan ini meningkat bahkan lebih tinggi selama 30-60 menit karena darah yang biasanya melintasi sirkulasi uteroplasenta tiba-tiba kembali ke sirkulasi umum. Nilai ini meningkat pada semua jenis kelahiran. Curah jantung biasanyatetap naik dalam 24-48 jam postpartum dan menurun ke nilai sebelum hamil dalam 10 hari. Frekuensi jantung berubah mengikuti pola ini. Resistensi vaskuler sistemik mengikuti secara berlawanan. Nilainya tetap di kisaran terendah nilai pada masa kehamilan selama 2 hari postpartum dan kemudian meningkat ke nilai normal sebelum hamil.⁴¹

Perubahan faktor pembekuan darah yang disebabkan kehamilan menetap dalam jangka waktu yang bervariasi selama nifas.

Peningkatan fibrinogen plasma dipertahankan minimal melewati minggu pertama, demikian juga dengan laju endap darah. Kehamilan normal dihubungkan dengan peningkatan cairan ekstraseluler yang cukup besar, dan diuresis postpartum merupakan kompensasi yang fisiologis untuk keadaan ini. Ini terjadi teratur antara hari ke-2 dan ke-5 dan berkaitan dengan hilangnya hipervolemia kehamilan residual. Pada preeklampsia, baik retensi cairan antepartum maupun diuresis postpartum dapat sangat meningkat.

4) Perubahan pada sistem hematologic

Pada hari pertama post partum, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun tetapi darah lebih mengental dengan peningkatan viskositas, dan juga terjadi peningkatan faktor pembekuan darah serta terjadi leukositosis dimana jumlah sel darah putih dapat mencapai 15.000 selama persalinan dan akan tetap tinggi dalam beberapa hari pertama darimasa postpartum. Jumlah sel darah putih tersebut masih bisa naik lagi hingga 25.000-30.000, terutama pada ibu dengan riwayat persalinan lama. Kadar hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit akan sangat bervariasi pada awal-awal masa postpartum sebagai akibat dari volume plasenta dan tingkat volume darah yang berubah-ubah. Semua tingkatan ini akan dipengaruhi oleh status gizi dan hidrasi ibu. Kira-kira selama persalinan normal dan masa postpartum terjadi kehilangan darah sekitar 250-500 ml. Penurunan volume dan peningkatan sel darah merah pada kehamilan diasosiasikan dengan peningkatan hematokrit dan hemoglobin pada hari ke-3 sampai 7 postpartum dan akan kembali normal dalam 4 sampai 5 minggu postpartum.⁴¹

Selama kehamilan, secara fisiologi terjadi peningkatan kapasitas pembuluh darah digunakan untuk menampung aliran darah yang meningkat, yang diperlukan oleh plasenta dan pembuluh darah uteri. Penarikan kembali estrogen menyebabkan diuresis yang terjadi secara cepat sehingga mengurangi volume plasma kembali pada proporsi

normal. Aliran ini terjadi dalam 2-4 jam pertama setelah kelahiran bayi. Selama masa ini, ibu mengeluarkan banyak sekali jumlah urine. Menurunnya hingga menghilangnya hormon progesteron membantu mengurangi retensi cairan yang melekat dengan meningkatnya vaskuler pada jaringan tersebut selama kehamilan bersama-sama dengan trauma masa persalinan. Setelah persalinan, shunt akan hilang dengan tiba-tiba. Volume darah ibu relatif akan bertambah. Keadaan ini akan menyebabkan beban pada jantung meningkat. Keadaan ini dapat diatasi dengan mekanisme kompensasi dengan adanya hemokonsentrasi sehingga volume darah kembali seperti sedia kala. Umumnya, ini akan terjadi pada 3-7 hari post partum. Pada sebagian besar ibu, volume darah hampir kembali pada keadaan semula sebelum 1 minggu postpartum.⁴¹

5) Perubahan pada sistem pencernaan

Sistem pencernaan selama kehamilan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya tingginya kadar progesteron yang dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah, dan melambatkan kontraksi otot-otot polos. Pasca melahirkan, kadar progesteron juga mulai menurun. Namun demikian, faal usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali normal. Beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem pencernaan, antara lain:⁴²

a) Nafsu Makan

Pasca melahirkan biasanya ibu merasa lapar, karena metabolisme ibu meningkat saat proses persalinan, sehingga ibu dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi makanan, termasuk mengganti kalori, energi, darah dan cairan yang telah dikeluarkan selama proses persalinan.

Ibu dapat mengalami perubahan nafsu makan. Pemulihan nafsu makan diperlukan waktu 3-4 hari sebelum faal usus kembali normal. Meskipun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, asupan makanan juga mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari.

b) Motilitas

Secara fisiologi terjadi penurunan tonus dan motilitas otot traktus pencernaan menetap selama waktu yang singkat beberapa jam setelah bayi lahir, setelah itu akan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Pada post partum SC dimungkinkan karena pengaruh analgesia dan anastesia bisa memperlambat pengembalian tonus dan motilitas ke keadaan normal.

c) Pengosongan Usus

Pasca melahirkan, ibu sering mengalami konstipasi. Hal ini disebabkan tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal masa post partum. Pada keadaan terjadi diare sebelum persalinan, enema sebelum melahirkan, kurang asupan nutrisi, dehidrasi, hemoroid ataupun laserasi jalan lahir, meningkatkan terjadinya konstipasi postpartum. Sistem pencernaan pada masa nifas membutuhkan waktu beberapa hari untuk kembali normal. Beberapa cara agar ibu dapat buang air besar kembali teratur, antara lain pengaturan diet yang mengandung serat buah dan sayur, cairan yang cukup, serta pemberian informasi tentang perubahan eliminasi dan penatalaksanaannya pada ibu.⁴¹

6) Perubahan pada sistem musculoskeletal

Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah persalinan. Pembuluh-pembuluh darah yang berada di antara anyaman otot-otot uterus akan terjepit. Proses ini akan menghentikan perdarahan setelah plasenta dilahirkan. Ligamen-ligamen, diafragma pelvis, serta fascia yang meregang pada waktu persalinan, secara berangsur-angsur menjadi pulih kembali ke ukuran normal.

Pada sebagian kecil kasus uterus menjadi retrofleksi karena ligamentum rotundum menjadi kendur. Tidak jarang pula wanita mengeluh kandungannya turun. Setelah melahirkan karena ligamen, fascia, dan jaringan penunjang alat genitalia menjadi kendur. Stabilisasi secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah

persalinan. Sebagai akibat putusnya serat-serat kulit dan distensi yang berlangsung lama akibat besarnya uterus pada waktu hamil, dinding abdomen masih agak lunak dan kendor untuk sementara waktu. Untuk memulihkan kembali jaringan-jaringan penunjang alat genitalia, serta otot-otot dinding perut dan dasar panggul, dianjurkan untuk melakukan latihan atau senam nifas, bisa dilakukan sejak 2 hari post partum.⁴¹

7) Perubahan pada sistem endokrin

Setelah melahirkan, sistem endokrin kembali kepada kondisi seperti sebelum hamil. Hormon kehamilan mulai menurun segera setelah plasenta lahir. Penurunan hormon estrogen dan progesteron menyebabkan peningkatan prolaktin dan menstimulasi air susu. Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu setelah melahirkan melibatkan perubahan yang progresif atau pembentukan jaringan-jaringan baru. Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada sistem endokrin, terutama pada hormon-hormon yang berperan dalam proses tersebut. Berikut ini perubahan hormon dalam sistem endokrin pada masa postpartum.⁴¹

a) Oksitosin

Oksitosin disekresikan dari kelenjar hipofisis posterior. Pada tahap kala III persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah perdarahan. Hisapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan meningkatkan sekresi oksitosin, sehingga dapat membantu uterus kembali ke bentuk normal.

b) Prolaktin

Menurunnya kadar estrogen menimbulkan terangsangnya kelenjar hipofisis posterior untuk mengeluarkan prolaktin. Hormon ini berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang produksi ASI. Pada ibu yang menyusui bayinya, kadar prolaktin tetap tinggi sehingga memberikan umpan balik negatif, yaitu

pematangan folikel dalam ovarium yang ditekan. Pada wanita yang tidak menyusui tingkat sirkulasi prolaktin menurun dalam 14 sampai 21 hari setelah persalinan, sehingga merangsang kelenjar gonad pada otak yang mengontrol ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron yang normal, pertumbuhan folikel, maka terjadilah ovulasi dan menstruasi.

c) Estrogen dan progesterone

Selama hamil volume darah normal meningkat, diperkirakan bahwa tingkat kenaikan hormon estrogen yang tinggi memperbesar hormon antidiuretik yang meningkatkan volume darah. Disamping itu, progesteron mempengaruhi otot halus yang mengurangi rangsangan dan peningkatan pembuluh darah yang sangat mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding vena, dasar panggul, perineum, vulva serta vagina.

d) Hormon plasenta

Human chorionic gonadotropin (HCG) menurun dengan cepat setelah persalinan dan menetap sampai 10% dalam 3 jam hingga hari ke 7 postpartum. Enzyme insulinase berlawanan efek diabetogenik pada saat penurunan hormon human placenta lactogen (HPL), estrogen dan kortisol, serta plasenta kehamilan, sehingga pada masa postpartum kadar gula darah menurun secara bermakna. Kadar estrogen dan progesteron juga menurun secara bermakna setelah plasenta lahir, kadar terendahnya dicapai kira-kira satu minggu postpartum.

Penurunan kadar estrogen berkaitan dengan diuresis ekstraseluler berlebih yang terakumulasi selama masa hamil. Pada wanita yang tidak menyusui, kadar estrogen mulai meningkat pada minggu ke 2 setelah melahirkan dan lebih tinggi dari ibu yang menyusui pada postpartum hari ke 17.

e) Hormon hipofisis dan fungsi ovarium

Waktu mulainya ovulasi dan menstruasi pada ibu menyusui

dan tidak menyusui berbeda. Kadar prolaktin serum yang tinggi pada wanita menyusui berperan dalam menekan ovulasi karena kadar hormon FSH terbukti sama pada ibu menyusui dan tidak menyusui, disimpulkan bahwa ovarium tidak berespon terhadap stimulasi FSH ketika kadar prolaktin meningkat. Kadar prolaktin meningkat secara progresif sepanjang masa hamil. Pada ibu menyusui kadar prolaktin tetap meningkat sampai minggu ke 6 setelah melahirkan. Kadar prolaktin serum dipengaruhi oleh intensitas menyusui, durasi menyusui dan seberapa banyak makanan tambahan yang diberikan pada bayi, karena menunjukkan efektifitas menyusui. Untuk ibu yang menyusui dan tidak menyusui akan mempengaruhi lamanya ia mendapatkan menstruasi. Sering kali menstruasi pertama itu bersifat anovulasi yang dikarenakan rendahnya kadar estrogen dan progesteron. Di antara wanita laktasi sekitar 15% memperoleh menstruasi selama 6 minggu dan 45% setelah 12 minggu dan 90% setelah 24 minggu. Untuk wanita laktasi, 80% menstruasi pertama anovulasi dan untuk wanita yang tidak laktasi, 50% siklus pertama anovulasi.

8) Perubahan pada payudara

Pada saat kehamilan sudah terjadi pembesaran payudara karena pengaruh peningkatan hormon estrogen, untuk mempersiapkan produksi ASI dan laktasi. Payudara menjadi besar ukurannya bisa mencapai 800 gr, keras dan menghitam pada areola mammae di sekitar puting susu, ini menandakan dimulainya proses menyusui. Segera menyusui bayi setelah melahirkan melalui proses inisiasi menyusui dini (IMD), walaupun ASI belum keluar lancar, namun sudah ada pengeluaran kolostrum.³⁹ Proses IMD ini dapat mencegah perdarahan dan merangsang produksi ASI. Pada hari ke 2 hingga ke 3 postpartum sudah mulai diproduksi ASI matur yaitu ASI berwarna. Pada semua ibu yang telah melahirkan proses laktasi terjadi secara alami. Fisiologi menyusui mempunyai dua mekanisme fisiologis

yaitu produksi ASI dan sekresi ASI atau let downreflex.

Selama kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan plasenta tidak ada lagi, maka terjadi positive feedback hormone (umpan balik positif), yaitu kelenjar pituitari akan mengeluarkan hormon prolaktin (hormon laktogenik). Sampai hari ketiga setelah melahirkan, efek prolaktin pada payudara mulai bisa dirasakan. Pembuluh darah payudara menjadi membesar terisi darah, sehingga timbul rasa hangat. Sel-sel acini yang menghasilkan ASI juga mulai berfungsi. Ketika bayi menghisap puting, reflek saraf merangsang kelenjar posterior hipofisis untuk mensekresi hormon oksitosin. Oksitosin merangsang reflek let down sehingga menyebabkan ejeksi ASI melalui sinus laktiferus payudara ke duktus yang terdapat pada puting.³⁹

9) Perubahan pada sistem eliminasi

Pasca persalinan terdapat peningkatan kapasitas kandung kemih, pembengkakan dan trauma jaringan sekitar uretra yang terjadi selama proses melahirkan. Untuk postpartum dengan tindakan SC, efek konduksi anestesi yang menghambat fungsi neural pada kandung kemih. Distensi yang berlebihan pada kandung kemih dapat mengakibatkan perdarahan dan kerusakan lebih lanjut. Pengosongan kandung kemih harus diperhatikan. Kandung kemih biasanya akan pulih dalam waktu 5-7 hari pasca melahirkan.

Sedangkan saluran kemih secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 2-8 minggu tergantung pada keadaan umum ibu atau status ibu sebelum persalinan, lamanya kala II yang dilalui, besarnya tekanan kepala janin saat intrapartum. Dinding kandung kencing pada ibu post partum memperlihatkan adanya edema dan hiperemia. Kadang-kadang odema trigonium, menimbulkan abstraksi dari uretra sehingga terjadi retensi urine. Kandung kencing dalam masa nifas kurang sensitif dan kapasitasnya bertambah, sehingga kandung kencing

penuh atau sesudah kencing masih tertinggal urine residual (normal + 15 cc). Sisa urine dan trauma pada kandung kencing waktu persalinan memudahkan terjadinya infeksi. Dilatasi ureter dan pyelum normal dalam waktu 2 minggu. Urine biasanya berlebihan (poliuria) antara hari kedua dan kelima, hal ini disebabkan karena kelebihan cairan sebagai akibat retensi air dalam kehamilan dan sekarang dikeluarkan. Kadang-kadang hematuria akibat proses katalitik involusi. Acetonuri terutama setelah partus yang sulit dan lama yang disebabkan pemecahan karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi, karena kegiatan otot-otot rahim meningkat. Terjadi proteinuria akibat dari autolisis sel-sel otot. Pada masa hamil, perubahan hormonal yaitu kadar steroid tinggi yang berperan meningkatkan fungsi ginjal. Begitu sebaliknya, pada pasca melahirkan kadar steroid menurun sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal.³⁶

Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu bulan setelah wanita melahirkan. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12 – 36 jam sesudah melahirkan. Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Kemungkinan terdapat spasme sfingter dan edema leher buli-buli ureter, karena bagian ini mengalami kompresi antara kepala janin dan tulang pubis selama persalinan. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12 – 36 jam sesudah melahirkan. Setelah plasenta dilahirkan, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Keadaan ini menyebabkan diuresis. Ureter yang berdilatasi akan kembali normal dalam tempo 6 minggu.

c. Perubahan Psikologis Masa Nifas

Periode kehamilan, persalinan, dan pascanatal merupakan masa terjadinya stress yang hebat, kecemasan, gangguan emosi, dan penyesuaian diri. Periode post partum menyebabkan stress emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat. Menurut Reva Rubin, terdapat tiga fase dalam masa adaptasi

peran pada masa nifas, yaitu:

1) Masa Taking In

Terjadi pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan. Ibu baru pada umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan tubuhnya. Ibu akan mengulang-ulang menceritakan pengalamannya waktu melahirkan. Pada saat ini, ibu memerlukan istirahat yang cukup agar ibu dapat menjalani masa nifas selanjutnya dengan baik. Ibu juga memerlukan nutrisi yang lebih untuk mempercepat pemulihan dan penyembuhan luka, serta persiapan proses laktasi aktif.

2) Masa Taking Hold

Berlangsung pada 3-10 hari postpartum. ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, memandikan, memasang popok, dan sebagainya. Pada masa ini ibu agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut, cenderung menerima nasihat bidan, karena ia terbuka untuk menerima pengetahuan dan kritikan yang bersifat pribadi. Padatahap ini bidan penting memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi dengan memperhatikan komunikasi yang tidak menyinggung perasaan ibu yang membuat tidak nyaman.

3) Masa Letting Go

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu mengambil langsung tanggung jawab dalam merawat bayinya, dia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan ketergantungan bayinya dan terhadap interaksi sosial. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan. Keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini.⁴⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adaptasi pada

masa transisi menuju masa menjadi orang tua pada saat post partum, antara lain:

1) Respon dan dukungan keluarga dan teman

Bagi ibu post partum, apalagi pada ibu yang baru pertama kali melahirkan akan sangat membutuhkan dukungan orang-orang terdekatnya, karena ibu belum sepenuhnya berada pada kondisi stabil, baik fisik maupun psikologisnya. Ibu masih sangat asing dengan perubahan peran barunya yang begitu dramatis terjadi dalam waktu yang begitu cepat, yaitu peran sebagai seorang “ibu”. Dengan respon positif dari lingkungan terdekatnya, akan mempercepat proses adaptasi peran ini sehingga akan memudahkan bagi bidan untuk memberikan asuhan pada ibu postpartum dengan optimal.

2) Hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi

Hal yang dialami oleh ibu ketika melahirkan akan sangat mewarnai alam perasaannya terhadap perannya sebagai ibu. Ibu akhirnya menjadi tahu bahwa masa transisi terkadang begitu berat untuk dilalui dan hal tersebut akan memperkaya pengalaman hidupnya untuk lebih dewasa.

Banyak kasus terjadi, setelah seorang ibu melahirkan anaknya yang pertama, ibu akan bertekad untuk lebih meningkatkan kualitas hubungannya dengan ibunya, karena baru menyadari dengan nyata ternyata pengalaman menjadi ibu adalah tugas yang luar biasa dan mempunyai tanggung jawab yang berat. Ibu mulai merefleksikan pada dirinya bahwa apa yang dialami orang tuanya terdahulu, terutama ibunya adalah sama dengan yang dialaminya sekarang.

3) Pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu atau terdahulu

Walaupun kali ini adalah bukan lagi pengalamannya yang pertama melahirkan bayinya, namun kebutuhan untuk mendapatkan dukungan positif dari lingkungannya tidak berbeda dengan ibu yang baru melahirkan anak pertama. Hanya perbedaannya adalah teknik

penyampaian dukungan yang diberikan lebih kepada support dan apresiasi dari keberhasilannya dalam melewati saat-saat sulit pada persalinannya yang lalu.

4) Pengaruh budaya

Adanya adat istiadat yang dianut oleh lingkungan dan keluarga sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan ibu dalam melewati masa transisi ini. Apalagi jika hal yang tidak sinkron atau berbeda antara arahan dari tenaga kesehatan dengan budaya yang dianut. Dalam hal ini, bidan harus bijaksana dalam menyikapi, namun tidak mengurangi kualitas asuhan kebidanan yang harus diberikan. Keterlibatan keluarga dari awal dalam menentukan bentuk asuhan dan perawatan yang harus diberikan pada ibu dan bayi akan memudahkan bidan dalam pemberian asuhan.⁴⁴

d. Teknik Skrining *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS)

Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) adalah salah satu metode untuk mendeteksi depresi pasca persalinan. Walaupun tidak umum, EPDS dapat dengan mudah digunakan selama 6 minggu pasca persalinan. EPDS berupa kuisioner yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai bagaimana perasaan pasien dalam satu minggu terakhir.⁴⁵

Cara penilaian EPDS yaitu

- 1) Pertanyaan 1, 2, dan 4
Mendapatkan nilai 0, 1, 2, atau 3 dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 0 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 3
- 2) Pertanyaan 3,5 sampai dengan 10
Merupakan penilaian terbalik, dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 3 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 0
- 3) Pertanyaan 10 merupakan pertanyaan yang menunjukkan keinginan bunuh diri.
- 4) Nilai maksimal : 30
- 5) Kemungkinan depresi: nilai 10 atau lebih

Cara pengisian EPDS

- 1) Para ibu diharap untuk memberikan jawaban tentang perasaan yang terdekat dengan pertanyaan yang tersedia dalam 7 hari terakhir.
- 2) Semua pertanyaan kuisisioner harus dijawab
- 3) Jawaban kuisisioner harus berasal dari ibu sendiri. Hindari kemungkinan ibu mendiskusikan pertanyaan dengan orang lain.
- 4) Ibu harus menyelesaikan kuisisioner ini sendiri, kecuali ia mengalami kesulitan dalam memahami bahasa atau tidak bisa membaca.

Keuntungan EPDS yaitu :⁴⁶

- 1) Mudah dihitung (oleh perawat, bidan, petugas kesehatan lain)
- 2) Sederhana
- 3) Cepat dikerjakan (membutuhkan waktu 5-10 menit bagi ibu untuk menyelesaikan EPDS)
- 4) Mendeteksi dini terhadap adanya depresi pasca persalinan
- 5) Lebih diterima oleh pasien
- 6) Tidak memerlukan biaya

Kekurangan EPDS yaitu :⁴⁶

- 1) Tidak bisa mendiagnosis depresi pasca persalinan
- 2) Tidak bisa mengetahui penyebab dari depresi pasca persalinan
- 3) Belum divalidasi di Indonesia

Para ibu yang memiliki skor diatas 10 sepertinya menderita suatu depresi dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Skala ini menunjukkan perasaan sang ibu dalam 1 minggu terakhir. Khusus untuk nomor 10, jawaban: ya, cukup sering, merupakan suatu tanda dimana dibutuhkan keterlibatan segera dari perawatan psikiatri. Wanita yang mengalami gangguan fungsi (dibuktikan dengan penghindaran dari keluarga dan teman, ketidakmampuan menjalankan kebersihan diri, ketidakmampuan merawat bayi) juga merupakan keadaan yang membutuhkan penanganan psikiatri segera. Wanita yang memiliki skor antara 5 dan 9 tanpa adanya pikiran untuk bunuh diri sebaiknya dilakukan evaluasi ulang setelah 2 minggu untuk menentukan apakah episode depresi mengalami perburukan atau membaik. EPDS yang dilakukan pada minggu pertama

pada wanita yang tidak menunjukkan gejala depresi dapat memprediksi kemungkinan terjadinya depresi pasca persalinan pada minggu ke 4 dan 8. EPDS tidak dapat mendeteksi kelainan neurosis, phobia, kecemasan, atau kepribadian, namun dapat dilakukan sebagai alat untuk mendeteksi adanya kemungkinan depresi antepartum. Sensitifitas dan spesifisitas EPDS sangat baik. Dengan menggunakan cut of point > 10 dari total 30, didapatkan nilai sensitifitas 64% dan spesifisitas 85% dalam mendeteksi adanya depresi.⁴⁷

e. Ketidaknyamanan dan Cara Pemulihan dalam Masa Nifas

Ketidaknyamanan pada ibu nifas dapat menyebabkan stress fisik yang bermakna. Terdapat beberapa ketidaknyamanan, hal itu bisa dianggap normal. Ketidaknyamanan itu berupa:

1) Nyeri setelah melahirkan

Nyeri setelah melahirkan disebabkan oleh kontraksi dan relaksasi uterus yang berurutan yang terjadi secara terus menerus. Nyeri ini lebih umum terjadi pada paritas tinggi dan pada wanita menyusui. Alasan nyeri yang lebih berat pada wanita dengan paritas tinggi adalah penurunan tonus otot uterus secara bersamaan, menyebabkan relaksasi intermiten. Berbeda pada wanita primipara yang tonus ototnya masih kuat dan uterus tetap berkontraksi tanpa relaksasi intermiten. Pada wanita menyusui, isapan bayi menstimulasi produksi oksitosin oleh hipofisis posterior. Pelepasan oksitosin tidak hanya memicu refleks *let down* (pengeluaran ASI) pada payudara, tetapi juga menyebabkan kontraksi uterus. Nyeri setelah melahirkan akan hilang jika uterus tetap berkontraksi dengan baik saat kandung kemih kosong. Kandung kemih yang penuh mengubah posisi uterus ke atas, menyebabkan relaksasi dan kontraksi uterus lebih nyeri. Nyeri setelah melahirkan Beberapa wanita merasa nyerinya cukup berkurang dengan mengubah posisi tubuhnya menjadi telungkup dengan meletakkan bantal atau gulungan selimut di bawah abdomen. Kompresi uterus yang konstan

pada posisi ini dapat mengurangi kram secara signifikan. Analgesia efektif bagi sebagian besar wanita yang kontraksinya sangat nyeri, seperti tylenol, ibuprofen.⁴⁴

2) Keringat berlebih

Wanita postpartum mengeluarkan keringat berlebihan karena tubuh menggunakan rute ini dan diuresis untuk mengeluarkan kelebihan cairan interstisial yang disebabkan oleh peningkatan normal cairan intraseluler selama kehamilan.

Cara menguranginya sangat sederhana yaitu dengan membuat kulit tetap bersih dan kering. Keringat berlebih selama masa nifas dapat dikurangi dengan cara menjaga kulit tetap bersih, kering dan menjaga hidrasi yaitu minum segelas air setiap satu jam pada kondisi tidak tidur.⁴⁴

3) Masalah Payudara

ASI memiliki kandungan gizi beragam dan lengkap. Kandungan utama ASI sebanyak 88% adalah air. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan pada bayi. Secara anatomis, setiap kelenjar mammae yang matang atau payudara terdiri dari 15 sampai 25 lobus. Payudara (mammae) adalah kelenjar yang terletak dibawah kulit, diatas otot dada dan fungsinya memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Ada tiga bagian utama payudara, yaitu : Korpus (badan), yaitu bagian yang membesar, kedua adalah areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah dan yang ketiga adalah papile (putting) yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara.⁴⁴

Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Dengan terbentuknya hormone estrogen dan progesterone yang berfungsi untuk maturasi alveoli. Sedangkan hormone prolaktin adalah hormon yang berfungsi untuk produksi ASI. Dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi, refleks prolaktin dan refleks aliran timbul akibat perangsangan puting susu oleh hisapan bayi.³⁹

a) Refleksi Prolaktin

Dalam puting susu terdapat banyak ujung saraf sensorik. Bila dirangsang, timbul impuls yang menuju hipotalamus selanjutnya ke kelenjar hipofisis bagian depan sehingga kelenjar ini mengeluarkan hormone prolactin. Hormone inilah yang berperan dalam produksi ASI di tingkat alveoli.

b) Refleksi aliran (*Let Down Reflex*)

Rangsang puting susu tidak hanya diteruskan sampai ke kelenjar hipofisis depan, tetapi juga ke kelenjar hipofisis bagian belakang, yang mengeluarkan hormone oksitosin. Hormon ini berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di dinding alveolus dan di dinding saluran, sehingga ASI dipompa keluar.³⁹

Sebaiknya menyusui bayi tanpa dijadwal (*on demand*), karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya jika bayi menangis tanpa sebab lain. Payudara dapat dikosongkan bayi yang sehat dalam waktu sekitar 5-7 menit, sedangkan dalam 2 jam ASI di lambung akan kosong. Proses menyusui kadang mengalami kegagalan yang sering disebabkan karena timbulnya berbagai masalah, baik masalah dari ibu maupun bayi. Salah satu faktor dari ibu yaitu cara menyusui yang kurang benar. Cara menyusui yang kurang benar dapat menyebabkan puting susu lecet dan ASI tidak keluar optimal. Hal ini dapat menimbulkan gangguan dalam proses laktasi sehingga pemberian ASI tidak adekuat, pemberian ASI yang tidak adekuat dapat mengakibatkan payudara bengkak (*breast engorgement*) karena sisa ASI pada duktus. Statis pada pembuluh darah akan mengakibatkan meningkatnya tekanan intraduktal yang akan mempengaruhi segmen pada payudara sehingga tekanan seluruh payudara meningkat akibatnya payudara sering terasa penuh,tegang serta terasa nyeri.⁴⁸

Teknik menyusui yang benar adalah bayi menghisap secara naluriah akan tetapi pada awalnya mungkin dia mengalami kesulitan

menemukan puting ibunya. Cara menolong yang paling mudah adalah dengan menempelkan pipinya ke payudara. Kemudian memasukkan puting ke mulut bayi.

Pastikan bayi menghisap seluruh area gelap dari payudara (areola) dan bukan hanya putingnya saja. Ibu dapat aliran air susu dengan cara menekan-nekan areola. Menghentikan hisapan, masukkan sebuah jari disudut mulutnya atau dorong dagunya ke bawah perlahan-lahan dengan ibu jari dan jari telunjuk. Biasanya bayi berhenti menghisap lalu melepaskan puting setelah merasa kenyang.⁴⁸

Puting susu lecet disarankan kepada ibu untuk tetap menyusui pada puting susu yang normal atau yang lecetnya lebih sedikit. Untuk menghindari tekanan luka pada puting, maka posisi menyusui harus sering diubah. Untuk puting susu yang sakit dianjurkan mengurangi frekuensi dan lamanya menyusui. Mengolesi puting susu yang lecet setiap habis menyusui memakai ASI, kemudian diangin-anginkan sebentar agar kering dengan sendirinya, karena ASI berfungsi sebagai pelembut puting sekaligus sebagai anti infeksi. Membersihkan puting susu tidak menggunakan sabun/ alkohol atau zat iritan lainnya. Ibu juga dapat mengoleskan minyak kelapa yang sudah dimasak terlebih dahulu pada puting yang lecet. Menyarankan ibu untuk menyusui lebih sering (8-12 kali dalam sehari), sehingga payudara tidak sampai terlalu penuh dan bayi tidak terlalu lapar akan menyusu tidak terlalu rakus.³⁹

4) Nyeri perineum

Beberapa tindakan dapat mengurangi ketidaknyamanan atau nyeri akibat laserasi atau luka episiotomi dan jahitan laserasi atau episiotomi tersebut. Sebelum tindakan dilakukan, penting untuk memeriksa perineum untuk menyingkirkan komplikasi seperti hematoma. Pemeriksaan ini juga mengindikasikan tindakan lanjutan apa yang mungkin paling efektif.⁴¹

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi nyeri perineum, kompres kantong es bermanfaat untuk mengurangi pembengkakan dan membuat perineum nyaman pada periode segera setelah melahirkan. Manfaat optimal dicapai dengan kompres dingin selama 30 menit. Anestesi topikal sesuai kebutuhan, contoh dari anestesi ini adalah spray Dermoplast, salep Nupercaine, salep nulpacaine. Salep dioleskan selama beberapa hari post partum selama periode penyembuhan akut baik karena jahitan atau jika ada hemoroid. Rendam duduk dua sampai tiga kali sehari dengan menggunakan air dingin. Nyeri post partum hilang dengan penggunaan rendam duduk dingin termasuk penurunan respon pada ujung saraf dan juga vasokonstriksi lokal, yang mengurangi pembengkakan dan spasme otot. Kompres witch hazel dapat mengurangi edema dan merupakan analgesik. Latihan Kegel bertujuan menghilangkan ketidaknyamanan dan nyeri yang dialami wanita ketika duduk atau hendak berbaring dan bangun dari tempat tidur. Latihan Kegel akan meningkatkan sirkulasi ke area perineum sehingga meningkatkan penyembuhan. Latihan ini juga dapat mengembalikan tonus otot panggul. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang paling bermanfaat dan seringkali menghasilkan akibat yang dramatis dalam memfasilitasi kemudahan pergerakan dan membuat wanita lebih nyaman. Pada wanita yang mendapat episiotomi, latihan Kegel ini dapat memberi efek berlawanan sehingga dapat mengakibatkan nyeri.⁴¹

5) Konstipasi

Konstipasi adalah pergerakan feses yang lambat melewati usus besar dihubungkan dengan banyaknya jumlah feses yang kering dan keras yang terkumpul pada colon descendens yang disebabkan oleh absorpsi cairan yang berlebihan (Guyton dan Hall, 2006 dalam Jurnal Media Gizi Indonesia, 2016). Konstipasi post partum dengan gejala seperti rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan, tegang, dan

feses keras adalah kondisi umum yang mempengaruhi kejadian hemoroid dan nyeri di daerah episiotomi. Hal ini akibat pengaruh hormon kehamilan dan penggunaan zat besi sebagai suplemen sehingga dapat meningkatkan resiko konstipasi pada ibu post partum (Turawa et al., 2015) dalam Jurnal Media Gizi Indonesia, 2016).⁴⁹

Masalah konstipasi dapat dikurangi dengan mengonsumsi makanan tinggi serat dan tambahan asupan cairan. Penggunaan laksatif pada wanita yang mengalami laserasi derajat tiga atau empat dapat membantu mencegah wanita mengejan. Namun asuhan sebelum pemberian laksatif, ambulasi dini dapat dilakukan sebelum intervensi tersebut antara lain *pelvic floor muscle training* (PFMT).⁴⁴

Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) merupakan latihan otot dasar panggul yang dianggap mampu menstimulasi pemulihan organ urogenitalia kepada fungsi fisiologisnya pada ibu postpartum. PFMT ini merupakan latihan yang ringan *Pelvic Floor Muscle Training* dapat dilakukan ditempat tidur, sambil berdiri, duduk maupun berbaring, dengan posisi yang nyaman dan rileks. Latihan ini seperti; Ibu seolah-olah menghentikan aliran buang air kecil selama 5 detik, kemudian rileks, dengan merelaksasikan otot sfingter, kemudian seolah-olah mengeluarkan urine kembaliselama 10 detik, latihan ini ulangi sekali lagi untuk 1 (satu) sesi latihan. Latihan dilakukan sebanyak 15 sesi dan 3 (tiga) kali sehari, selama 10-15 menit.⁵⁰

Pelvic floor muscle training merupakan gerakan yang memberikan rangsangan pada serat saraf otot polos, sehingga terjadi metabolisme pada mitokondria, yang menghasilkan adeno tripospat (ATP). Energi yang dihasilkan, meningkatkan kontraksiotot dasar panggul dan rektum, sehingga dapat mengatasi gangguan defekasi pada ibu postpartum. PFMT dapat dilakukan untuk mencegah dan mengobati gangguan pada defekasi padapersalinan spontan. Secara fisiologis rektum yang mengalami penekanan selama akhir kehamilan dan persalinan akan membuat kontraksi

peristaltik, refleksi defekasi terganggu, dengan latihan ini dapat menstimulasi rangsangan untuk defekasi secara cepat.⁵¹ Menurut Uliyah dan Ahmad (2008) dalam Muawanah (2016), makanan yang memiliki kandungan serat tinggi dapat membantu proses percepatan defekasi namun jumlah serat dan jenis serat juga sangat berperan. Serat dapat mencegah dan mengurangi konstipasi karena dapat menyerap air ketika melewati saluran pencernaan sehingga meningkatkan ukuran feses, namun jika asupan air kurang, serat akan menyebabkan konstipasi dan menyebabkan gangguan pada usus besar. Ibu nifas memerlukan asupan cairan >2 liter perhari. Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Sekitar 80% dari kebutuhan individu merupakan kontribusi cairan termasuk air, dan sisanya diperoleh dari makanan. Kebutuhan cairan setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, faktor lingkungan, dan status gizi (Popkin, et al, 2006 dalam Muawanah, 2016).⁴⁹

Salah satu fungsi air sebagai penghancur makanan Potter dan Perry, (2006) dalam Muawanah (2016) menunjukkan konstipasi terjadi pada ibu pasca melahirkan sebanyak 54,5%.⁴⁹

Penelitian Muawanah (2016), tidak ada hubungan asupan serat, cairan dengan kejadian konstipasi pada ibu pasca melahirkan. Asupan serat bagi ibu pasca melahirkan masih jauh dari angka kecukupan yang dianjurkan. Selain asupan serat dan asupan cairan masih banyak faktor yang berpengaruh terhadap kejadian konstipasi seperti hormon, perubahan anatomi dan asupan zat gizi. Hal ini bisa disebabkan karena pada wanita 3 bulan pasca melahirkan masih terjadi peningkatan kadar hormon progesteron yang dapat menyebabkan sistem pencernaan melambat sehingga dapat menimbulkan konstipasi. Dengan mengonsumsi makanan berserat dan minum yang cukup serta aktivitas secara teratur akan membantu mencegah konstipasi.⁴⁹

6) Hemoroid

Jika wanita mengalami hemoroid, mungkin mereka sangat merasakan nyeri selama beberapa hari. Hemoroid yang terjadi selama masa kehamilan dapat menimbulkan traumatis dan menjadi lebih edema selama kala dua persalinan. Menurut Varney H et al (2008) dalam Islami (2010). Untuk mengurangi masalah ini dapat dilakukan dengan cara kantong es dan rendam duduk es.⁵²

f. Tanda Bahaya pada Masa Nifas

Tanda bahaya masa nifas adalah suatu tanda abnormal yang mengindikasikan adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas, apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu.

Konseling mengenai tanda-tanda bahaya masa nifas sangat penting dan perlu, karena masih banyak ibu atau wanita yang sedang hamil atau pada masa nifas belum mengetahui tentang tanda-tanda bahaya masa nifas, baik yang diakibatkan masuknya kuman ke dalam alat kandungan seperti eksogen (kuman datang dari luar), autogen (kuman masuk dari tempat lain dalam tubuh) dan endogen (dari jalan lahir sendiri).⁵³

Menurut Depkes, tanda bahaya yang dapat timbul dalam masa nifas seperti perdarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam, bengkak di muka, tangan atau kaki, disertai kait kepala dan atau kejang, nyeri atau panas di daerah tungkai, payudara bengkak, berwarna kemerahan dan sakit, puting lecet. Ibu mengalami depresi (antara lain menangis tanpa sebab dan tidak peduli pada bayinya).⁵⁴

1) Perdarahan Postpartum

Sejumlah perdarahan berwarna merah terang tiap saat setelah minggu pertama pascapersalinan. Perdarahan post partum adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Menurut waktu terjadinya terbagi atas dua bagian yaitu: Perdarahan postpartum Primer (early postpartum hemorrhage) yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir dan perdarahan postpartum

sekunder (late postpartum hemorrhage) yang terjadi setelah 24 jam, biasanya antara hari ke-5 sampai ke-15 postpartum .

Hal-hal yang menyebabkan perdarahan postpartum adalah atonia uteri, perlukaan jalan lahir serviks maupaun genetalia, terlepasnya sebagian plasenta dari uterus, tertinggalnya sebagian dari plasenta seperti kotiledon atau plasenta subsenturiata, endometritis puerpuralis, penyakit darah.

2) Lokhea yang Berbau Busuk (Bau dari Vagina)

Lokhea ini disebut lochea purulenta yaitu cairan seperti nanah berbau busuk .Hal tersebut terjadi karena kemungkinan adanya:⁵⁵

- a) Tertinggalnya plasenta atau selaput janin karena kontraksi uterus yang kurang baik.
- b) Ibu yang tidak menyusui anaknya, pengeluaran lochea rubra lebih banyak karena kontraksi uterus lebih cepat.
- c) Infeksi jalan lahir, membuat kontraksi uterus kurang baik sehingga lebih lama mengeluarkan lochea dan lochea berbau anyir atau amis.

Bila lochea bernanah atau berbau busuk, disertai nyeri perut bagian bawah kemungkinan diagnosisnya adalah metritis. Metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu. Bila pengobatan terlambat atau kurang adekuat dapat menjadi abses pelvic, peritonitis, syok septik.⁵⁵

3) Sub Involasi Uterus Terganggu

Faktor penyebab sub involusio antara lain sisa plasenta dalam uterus, endometritis, adanya mioma uteri. Pada pemeriksaan bimanual ditemukan uterus lebih besar dan lebih lembek dari seharusnya, fundus masih tinggi, lokea banyak dan berbau dan jarang terdapat pula perdarahan. Pengobatan dilakukan dengan memberikan injeksi methergin setiap hari ditambah ergometrin per oral. Bila ada sisa plasenta lakukan kuretase. Berikan antibiotika sebagai pelindung infeksi.⁵⁵

4) Payudara Berubah Menjadi Merah, Panas dan Terasa Sakit

Mastitis adalah peradangan payudara. Mastitis ini dapat terjadi kapan saja sepanjang periode menyusui, tapi paling sering terjadi antara hari ke-10 dan hari ke-28 setelah kelahiran. Gejala dari mastitis adalah bengkak dan nyeri, payudara tampak merah pada keseluruhan atau ditempat tertentu, payudara terasa keras dan berbenjol-benjol, serta demam dan rasa sakit.¹³

5) Pusing dan Lemas yang berlebihan

Pusing merupakan tanda-tanda bahaya masa nifas, pusing bisa disebabkan karena tekanan darah rendah (sistol <100 mmHg dan diastol >90 mmHg). Pusing dan lemas yang berlebihan dapat juga disebabkan oleh anemia bila kadar haemoglobin <11 gr/dl. Lemas yang berlebihan juga merupakan tanda-tanda bahaya, dimana keadaan lemas disebabkan oleh kurangnya istirahat dan kurangnya asupan kalori sehingga ibu kelihatan pucat, tekanan darah rendah.⁵⁵

6) Suhu Tubuh Ibu >38⁰C

Apabila terjadi peningkatan melebihi 38⁰C berturut-turut selama 2 hari kemungkinan terjadi infeksi. Infeksi nifas adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat genitalia dalam masa nifas.

7) Perasaan Sedih yang Berkaitan dengan Bayinya

Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut dengan baby blue, yang disebabkan perubahan yang dialami ibu saat hamil hingga sulit menerima kehadiran bayinya. Perubahan perasaan merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan, selain itu juga karena perubahan fisik dan emosional selama beberapa bulan kemudian.⁵⁶

Asuhan pada masa nifas sangat diperlukan dalam periode ini karena masa nifas merupakan masa kritis untuk ibu dan bayinya. Tenaga kesehatan paling sedikit melaksanakan 4 kali kunjungan pada masa nifas. Tujuan kunjungan ini diantaranya yaitu untuk menilai status ibu dan bayinya, melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan

bayi. Sehingga diharapkan dengan adanya kunjungan pada ibu nifas, komplikasi yang terjadi pada masa nifas dapat dicegah.⁵⁷

g. Kebutuhan Dasar Masa Nifas

1) Ambulasi Dini

Ambulasi dini adalah kebijaksanaan agar secepat mungkin bidan membimbing ibu post partum bangun dari tempat tidurnya dan membimbing ibu secepat mungkin untuk berjalan. Keuntungan *early ambulation* adalah:³⁹

- a) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan *early ambulation*.
- b) Faal dan kandung kemih lebih baik.
- c) *Early ambulation* memungkinkan kita mengajarkan ibu cara merawat anaknya selama ibu masih di rumah sakit. Misalnya memandikan, mengganti pakaian dan memberi makan. Lebih sesuai dengan keadaan Indonesia (*sosial early ambulation* ekonomis), menurut penelitian-penelitian yang seksama, tidak mempunyai pengaruh yang buruk, tidak menyebabkan perdarahan yang abnormal, tidak mempengaruhi penyembuhan luka episiotomi atau luka di perut, serta tidak memperbesar kemungkinan prolapsus.
- d) Early ambulation tentunya tidak dibenarkan pada ibu post partum dengan penyulit, misalnya anemia, penyakit jantung, penyakit paru-paru, demam, dan sebagainya.

2) Nutrisi

Pada masa nifas masalah nutrisi perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi pada proses penyesuaian. Nutrisi yang diberikan harus bergizi seimbang, cukup kalori, tinggi protein dan banyak mengandung cairan. Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan gizi sebagai berikut:³⁹

- a) Mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari menjadi $\pm 2700 - 3000$ kalori.

- b) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup.
- c) Minum sedikitnya 3-liter air tiap hari.
- d) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, setidaknya selama 40 hari pasca persalinan.
- e) Minum kapsul vitamin A 200.000-unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayi melalui ASI.

3) Personal Hygiene

Pada masa nifas, seorang ibu sangat rentan terhadap penyakit infeksi. Oleh karena itu kebersihan diri sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur dan lingkungan sangat penting untuk menjaga kebersihan diri ibu nifas adalah :³⁶

- a) Anjurkan kebersihan seluruh tubuh, terutama Perineum.
- b) Mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ibu mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu, dari depan ke belakang, kemudian membersihkan daerah sekitar anus.
- c) Anjurkan ibu untuk membersihkan vulva setiap kali setelah BAB atau BAK
- d) Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari dan disetrika.
- e) Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya.
- f) Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah tersebut.

4) Istirahat dan tidur

Hal yang bisa dilakukan pada ibu untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur adalah :³⁶

- a) Anjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan.
- b) Sarankan ibu untuk kembali pada kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur.

Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, yaitu: mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak pendarahan, dan menyebabkan depresi serta ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri.

5) Eliminasi

Ibu diminta untuk buang air kecil (BAK) 6 jam post partum, jika dalam 8 jam post partum belum dapat berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi, kalau ternyata kandung kemih penuh, tidak perlu 8 jam untuk kateterisasi. Ibu post partum diharapkan dapat buang air besar (BAB) setelah hari kedua post partum. Jika hari ketiga belum juga BAB, maka perlu diberi obat pencahar per oral atau per rectal. Jika setelah pemberian obat pencahar masih belum bisa BAB, maka dilakukan klisma (huknah).^{36,37}

6) Perawatan Payudara

Menjaga payudara tetap bersih dan kering serta menggunakan BH yang menyokong payudara, jika puting susu lecet oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap kali selesai menyusui dan tetap menyusui pada puting susu yang lecet, apabila lecet sangat berat istirahatkan selama 24 jam dan untuk menghindarinyeri dapat minum paracetamol 1 kaplet setiap 4–6 jam.⁵⁸

7) Aktivitas Seksual

Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu masa nifas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu

darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu dua jari ke dalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapanpun ibu siap.

- b) Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Keputusan ini bergantung pada pasangan yang bersangkutan.

h. Asuhan Kebidanan Masa Nifas

Asuhan ibu masa nifas adalah asuhan yang diberikan kepada ibu segera setelah kelahiran sampai 6 minggu setelah kelahiran. Tujuan dari asuhan masa nifas adalah untuk memberikan asuhan yang adekuat dan terstandar pada ibu segera setelah melahirkan dengan memperhatikan riwayat selama kehamilan, dalam persalinan dan keadaan segera setelah melahirkan.

Adapun hasil yang diharapkan adalah terlaksananya asuhan segera atau rutin pada ibu post partum termasuk melakukan pengkajian, membuat diagnosa, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan ibu, mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial, tindakan segera serta merencanakan asuhan. Adapun jadwal kunjungan pada masa nifas adalah sebagai berikut.^{39,20}

1) Kunjungan I (6-48 jam setelah persalinan)

- a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri
- b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila perdarahan berlanjut.
- c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.
- d) Pemberian ASI awal.
- e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir
- f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi.

2) Kunjungan II (3 – 7 hari setelah persalinan)

- a) Memastikan involusi uterus berjalan normal : uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, dan tidakada bau
 - b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal
 - c) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat
 - d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit
 - e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan perawatan bayi sehari-hari.
- 3) Kunjungan III (8 – 28 hari setelah persalinan)
- a) Memastikan involusi uterus berjalan normal : uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau
 - b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal
 - c) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat
 - d) Memastikan ibu menyusui dengan baik, dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit
 - e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, talipusat, menjaga bayi tetap hangat dan perawatan bayi sehari-hari.
- 4) Kunjungan IV (29 – 42 hari pasca postpartum)
- a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami atau bayinya
 - b) Memberikan konseling KB secara dini
 - c) Menganjurkan/mengajak ibu membawa bayinya ke posyandu ataupuskesmas untuk penimbangan dan imunisasi.

7. Konsep Dasar Bayi Baru Lahir (BBL)

a. Pengertian

Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus yaitu bayi yang baru saja mengalami proses kelahiran, berusia 0 – 28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ektrauterin) dan toleransi bagi BBL untuk dapat hidup dengan baik.⁵⁹

Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi yang berusia 0-28 hari. Bayi barulahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram.⁶⁰

b. Ciri-Ciri Bayi baru lahir normal

Mempunyai ciri-ciri berat badan lahir 2500-4000 gram, umur kehamilan 37-40 minggu, bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI dengan baik, dan tidak ada cacat bawaan.⁶¹

Bayi baru lahir normal memiliki panjang badan 48-52 cm, lingkardada 30-38 cm, lingkarlengan 11-12 cm, frekuensi denyut jantung 120-160 x/menit, pernapasan 40-60 x/menit, lanugo tidak terlihat dan rambut kepala tumbuh sempurna, kuku agak panjang dan lemas, nilai APGAR >7, refleks-refleks sudah terbentuk dengan baik (rooting, sucking, moro, grasping), organ genitalia pada bayi laki-laki testis sudah berada pada skrotum dan penis berlubang, pada bayi perempuan vagina dan uretra berlubang serta adanya labia minora dan mayora, mekonium sudah keluar dalam 24 jam pertama berwarna hitam kecoklatan.⁶¹

c. Klasifikasi Neonatus

Bayi baru lahir atau neonatus dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu:⁶²

- 1) Neonatus menurut masa gestasinya :
 - a) Kurang bulan (preterm infant) : < 259 hari (37 minggu)
 - b) Cukup bulan (aterm infant) : 259-294 hari (37-42 minggu)
 - c) Lebih bulan (post term infant) : >294 hari (42 minggu/lebih)
- 2) Neonatus menurut berat badan lahir :

- a) Berat lahir rendah: < 2500 gram
 - b) Berat lahir cukup: 2500-4000 gram
 - c) Berat lahir lebih: > 4000 gram
- 3) Neonatus menurut berat lahir terhadap masa gestasi (masa gestasi dan ukuran berat lahir yang sesuai untuk masa kehamilan) :
- a) Neonatus cukup/kurang/lebih bulan (NCB/NKB/NLB)
 - b) Sesuai/kecil/besar untuk masa kehamilan (SMK/KMK/BMK)
- d. Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Normal

Semua bayi diperiksa segera setelah lahir untuk mengetahui apakah transisi dari kehidupan intrauterine ke ekstrauterine berjalan dengan lancar dan tidak ada kelainan. Pemeriksaan medis komprehensif dilakukan dalam 24 jam pertama kehidupan. Pemeriksaan rutin pada bayi baru lahir harus dilakukan, tujuannya untuk mendeteksi kelainan atau anomali kongenital yang muncul pada setiap kelahiran dalam 10-20 per 1000 kelahiran, pengelolaan lebih lanjut dari setiap kelainan yang terdeteksi pada saat antenatal, mempertimbangkan masalah potensial terkait riwayat kehamilan ibu dan kelainan yang diturunkan, dan memberikan promosi kesehatan, terutama pencegahan terhadap *sudden infant death syndrome* (SIDS).⁶³

Tujuan utama perawatan bayi segera sesudah lahir adalah untuk membersihkan jalan napas, memotong dan merawat tali pusat, mempertahankan suhu tubuh bayi, identifikasi, dan pencegahan infeksi. Asuhan bayi baru lahir meliputi:

1) Penilaian Awal untuk Memutuskan Resusitasi pada Bayi

Untuk menilai apakah bayi mengalami asfiksia atau tidak dilakukan penilaian sepiantas setelah seluruh tubuh bayi lahir dengan tiga pertanyaan:

- a) Apakah kehamilan cukup bulan?
- b) Apakah bayi menangis atau bernapas/tidak megap-megap?
- c) Apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif?

Jika ada jawaban “tidak” kemungkinan bayi mengalami asfiksia

sehingga harus segera dilakukan resusitasi. Penghisapan lendir pada jalan napas bayi tidak dilakukan secara rutin.⁶¹

2) Pemotongan dan Pengikatan Tali Pusat

Setelah penilaian sepiantas dan tidak ada tanda asfiksia pada bayi, dilakukan manajemen bayi baru lahir normal dengan mengeringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks, kemudian bayi diletakkan di atas dada atau perut ibu. Setelah pemberian oksitosin pada ibu, lakukan pemotongan tali pusat dengan satu tangan melindungi perut bayi.

Perawatan tali pusat adalah dengan tidak membungkus tali pusat atau mengoleskan cairan/bahan apa pun pada tali pusat. Perawatan rutin untuk tali pusat adalah selalu cuci tangan sebelum memegangnya, menjaga tali pusat tetap kering dan terpapar udara, membersihkan dengan air, menghindari dengan alkohol karena menghambat pelepasan tali pusat, dan melipat popok di bawah umbilikus.⁶⁴

3) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Setelah bayi lahir dan tali pusat dipotong, segera letakkan bayi tengkurap di dada ibu, kulit bayi kontak dengan kulit ibu untuk melaksanakan proses IMD selama 1 jam. Biarkan bayi mencari, menemukan puting, dan mulai menyusu. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan IMD dalam waktu 60-90 menit, menyusu pertamanya berlangsung pada menit ke 45-60 dan berlangsung selama 10-20 menit dan bayi cukup menyusu dari satu payudara.

Jika bayi belum menemukan puting ibu dalam waktu 1 jam, posisikan bayi lebih dekat dengan puting ibu dan biarkan kontak kulit dengan kulit selama 30-60 menit berikutnya. Jika bayi masih belum melakukan IMD dalam waktu 2 jam, lanjutkan asuhan perawatan neonatal esensial lainnya (menimbang, mengukur lingkar kepala, lingkar dada, panjang badan, pemberian vitamin K, salep mata, serta

pemberian gelang pengenalan) kemudian dikembalikan lagi kepada ibu untuk belajar menyusu.⁶⁵

- 4) Mempertahankan Suhu Tubuh Bayi
Mekanisme pengaturan temperatur bayi belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, jika tidak dilakukan pencegahan kehilangan panas maka bayi akan mengalami hipotermia. Hipotermia dapat terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada dalam ruangan yang hangat. Pencegahan kehilangan panas melalui tunda mandi selama 6 jam, kontak kulit bayi dan ibu serta menyelimuti kepala dan tubuh bayi.⁴³
- 5) Pemberian Salep Mata/Tetes Mata
Pemberian salep atau tetes mata diberikan untuk pencegahan infeksi mata. Beri bayi salep atau tetes mata antibiotika profilaksis (tetrasiklin 1%, oxytetrasiklin 1% atau antibiotika lain).
Pemberian salep atau tetes mata harus tepat 1 jam setelah kelahiran. Upaya pencegahan infeksi mata tidak efektif jika diberikan lebih dari 1 jam setelah kelahiran.⁴³
- 6) Pencegahan Perdarahan Melalui Penyuntikan Vitamin K1 Dosis Tunggal di Paha Kiri
Semua bayi baru lahir harus diberi penyuntikan vitamin K1 (Phytomenadione) 1 mg intramuskular di paha kiri, untuk mencegah perdarahan BBL akibat defisiensi vitamin yang dapat dialami oleh sebagian bayi baru lahir.⁴³
- 7) Pemberian Imunisasi Hepatitis B (HB 0) Dosis Tunggal di Paha Kanan
Imunisasi Hepatitis B diberikan 1-2 jam di paha kanan setelah penyuntikan vitamin K1 yang bertujuan untuk mencegah penularan Hepatitis B melalui jalur ibu ke bayi yang dapat menimbulkan kerusakan hati.⁴³
- 8) Pemeriksaan Bayi Baru Lahir (BBL)

Pemeriksaan BBL bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi. Bayi yang lahir di fasilitas kesehatan dianjurkan tetap berada di fasilitas tersebut selama 24 jam karena resiko terbesar kematian BBL terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. Saat kunjungan tindak lanjut (KN) yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 1 kali pada umur 4-7 hari dan 1 kali pada umur 8-28 hari.²³

8. Konsep Dasar Keluarga Berencana (KB)

a. Pengertian Keluarga Berencana

Menurut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Keluarga Berencana merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. KB merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapat kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. Sedangkan menurut KBBI, Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan, penundaan usia kehamilan serta menjarangkan kehamilan. Menurut WHO *Expert Committee* keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk :

- 1) Mendapatkan objek-objek tertentu
- 2) Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
- 3) Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan
- 4) Mengatur interval di antara kelahiran
- 5) Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri

6) Menentukan jumlah anak dalam keluarga.

b. Tujuan

Tujuan dari keluarga berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. KB juga diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁶⁶

c. Manfaat Keluarga Berencana (KB)

Manfaat Keluarga Berencana (KB) adalah:

- 1) Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek.
- 2) Adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, untuk istirahat, dan menikmati waktu luang, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain.⁶⁶

d. Kebutuhan Pada Calon Akseptor KB

1) Konseling

Konseling adalah suatu proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan sistematis interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapinya dan menentukan jalan keluar atau upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Proses konseling yang benar, objektif dan lengkap akan meningkatkan kepuasan, kelangsungan dan keberhasilan penggunaan berbagai metode kontrasepsi.⁶⁶

Dalam memberikan konseling, khususnya bagi calon akseptor Keluarga Berencana (KB) yang baru, hendaknya dapat diterapkan enam langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci SATU TUJU. Penerapan SATU TUJU tersebut tidak perlu dilakukan secara berurutan karena petugas harus menyesuaikan diri dengan

kebutuhanklien. Kata kunci SATU TUJU adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a) SA : SApa dan Salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Berikan perhatian sepenuhnya kepada mereka dan berbicara ditempat yang nyaman serta terjamin privasinya. Yakinkan klien untuk membangun rasa percaya diri. Tanyakan kepada klien apayang perlu dibantu serta jelaskan pelayanan apa yang dapat diperolehnya.
- b) T : Tanyakan pada klien informasi tentang dirinya Bantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR), tujuan, kepentingan, harapan, serta keadaan kesehatan dan kehidupan keluarganya. Tanyakan kontrasepsi yang diinginkan oleh klien.
Berikan perhatian kepada klien apa yang disampaikan klien sesuai dengan kata-kata, gerak isyarat dan caranya. Coba tempatkan diri kita di dalam hati klien. Perhatikan bahwa kita memahami. Dengan memahami pengetahuan, kebutuhan dan keinginan klien, kita dapat membantunya.
- c) U : Uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa kontrasepsi. Bantulah klien pada jenis kontrasepsi yang paling diinginkan, serta jelaskan pula jenis-jenis kontrasepsi lain yang ada. Uraikan juga mengenai risiko penularan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome(HIV/AIDS) dan pilihan metode ganda.
- d) TU: Bantulah klien menentukan pilihannya. Bantulah klien berpikir mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.
- e) J : Jelaskan secara lengkap kepada klien bagaimana menggunakankontrasepsi pilihannya. Setelah klien memilih jenis kontrasepsi, jika diperlukan perhatikan alat kontrasepsinya.
- f) U : Perlunya kunjungan Ulang. Diskusikan dan buat kontrak

dengan klien untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau permintaan kontrasepsi apabila dibutuhkan.⁶⁷

e. Penapisan Klien

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian suatu metode kontrasepsi, untuk menentukan apakah ada:

1) Kehamilan

a) Klien tidak hamil apabila:

- (1) Tidak senggama sejak haid terakhir
- (2) Sedang memakai metode efektif secara baik dan benar
- (3) Sekarang di dalam 7 hari pertama haid terakhir
- (4) Di dalam 4 minggu pasca persalinan
- (5) Dalam 7 hari pasca keguguran
- (6) Menyusui dan tidak haid

2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus

3) Masalah (misalnya: diabetes, tekanan darah tinggi) yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut.

4) Apabila klien menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca persalinan maka pil kombinasi adalah metode pilihan terakhir.

5) Tidak cocok untuk pil progestin (minipil), suntikan Depo medroxy progesterone acetate (DMPA) atau Norethindrone enanthate (NET-EN) atau susuk tidak cocok untuk suntikan progestin (DMPA atau NET-EN).⁶⁶

f. Macam – macam alat kontrasepsi

1) Metode Amenorea Laktasi

Metode amenorea laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh (full breastfeeding); lebih efektif bila pemberian ≥ 8 x sehari, belum haid dan umur bayi kurang dari 6

bulan. Efektif sampai 6 bulan, dan harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya. Cara kerjanya yaitu penundaan atau penekanan ovulasi.⁶⁶

2) Metode Keluarga Berencana Alamiyah (KBA)

Metode kontrasepsi alamiyah merupakan metode untuk mengatur kehamilan secara alamiyah, tanpa menggunakan alat apapun. Metode ini dilakukan dengan menentukan periode/masa subur yang biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi sebelumnya, memperhitungkan masa hidup sperma dalam vagina (48-72 jam), masa hidup ovum (12-24 jam), dan menghindari senggama selama kurang lebih 7-18 hari termasuk masa subur dari setiap siklus.⁶⁶

a) Metode Kalender (Ogino-Knaus)/ Pantang Berkala

Pantang berkala atau lebih dikenal dengan sistem kalender merupakan salah satu cara/metode kontrasepsi sederhana yang dapat dikerjakan sendiri oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama pada masa subur. Metode ini lebih efektif bila dilakukan secara baik dan benar. Dengan penggunaan sistem kalender setiap pasangan dimungkinkan dapat merencanakan setiap kehamilannya.

Metode kalender memerlukan ketekunan ibu untuk mencatat waktu menstruasinya selama 6-12 bulan agar waktu ovulasi dapat ditentukan. Perhitungan masa subur didasarkan pada ovulasi (umumnya terjadi pada hari ke 14+2 hari sebelum menstruasi berikutnya), masa hidup ovum (24 jam), dan masa hidup spermatozoa (2-3 hari). Angka kegagalan metode ini sebesar 14,4-47 kehamilan pada setiap wanita 100 wanita per tahun.⁶⁶

b) Metode Suhu Badan Basal

Metode kontrasepsi ini dilakukan berdasarkan pada perubahan suhu tubuh. Pengukuran dilakukan dengan pengukuran suhu basal (pengukuran suhu yang dilakukan ketika bangun tidur sebelum beranjak dari tempat tidur). Tujuan

pengukuran ini adalah mengetahui masa ovulasi. Waktu pengukuran harus dilakukan pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak $\pm 3-5$ jam serta dalam keadaan istirahat. Pengukuran dapat dilakukan per oral (3 menit), per rectal (1 menit) dan per vagina. Suhu tubuh basal dapat meningkat sebesar $0,2-0,50^{\circ}\text{C}$ ketika ovulasi. Peningkatan suhu basal dimulai 1-2 hari setelah ovulasi disebabkan peningkatan hormon progesteron.

Metode ini memiliki angka kegagalan sebesar 0,3-6,6 per 100 wanita pertahun. Kerugian utama metode suhu basal ini adalah abstinensia (menahan diri tidak melakukan senggama) sudah harus dilakukan pada masa praovulasi.⁶⁶

c) Metode Lendir Serviks

Metode kontrasepsi ini dilakukan berdasarkan perubahan siklus lendir serviks yang terjadi karena perubahan kadar estrogen. Pada setiap siklus menstruasi, sel serviks memproduksi 2 macam lendir serviks, yaitu lendir estrogenik (tipe E) lendir jenis ini diproduksi pada fase akhir sebelum ovulasi dan fase ovulasi. Sifat lendir ini banyak, tipis, seperti air (jernih) dan viskositas rendah, elastisitas besar, bila dikeringkan akan membentuk gambaran seperti daun pakis (fernlike patterns, ferning, arborization) sedangkan gestagenik (tipe G) lendir jenis ini diproduksi pada fase awal sebelum ovulasi dan setelah ovulasi. Sifat lendir ini kental, viskositas tinggi dan keruh. Angka kegagalan 0,4-39,7 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Kegagalan ini disebabkan pengeluaran lendir yang mulainya terlambat, lendir tidak dirasakan oleh ibu dan kesalahan saat menilai lendir.⁶⁶

d) Senggama terputus

Senggama Terputus (coitus interruptus), adalah penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Hal ini berdasarkan kenyataan, bahwa akan terjadinya ejakulasi disadari sebelumnya oleh sebagian besar laki-laki, dan setelah itu masih

ada waktu kira-kira “detik” sebelum ejakulasi terjadi. Waktu yang singkat ini dapat digunakan untuk menarik penis keluar dari vagina. Keuntungan, cara ini tidak membutuhkan biaya, alat-alat ataupun persiapan, tetapi kekurangannya adalah untuk menyukseskan cara ini dibutuhkan pengendalian diri yang besar dari pihak laki-laki.⁶⁶

3) Metode Kontrasepsi Sederhana

a) Kondom

Kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis, berbentuk silinder, dengan muaranya berpinggir tebal, yang bisa digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu. Kondom ini tidak hanya mencegah kehamilan, tetapi juga mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. Pada umumnya standar ketebalan adalah 0,02 mm. Secara ilmiah didapatkan hanya sedikit angka kegagalan kondom yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan pertahun.⁶⁶

b) Kontrasepsi Barrier Intra Vagina

(1) Diafragma

Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutupi serviks. Cara kerja diafragma adalah menahan sperma agar tidak mendapat akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopii) dan sebagai alat tempat spermisida.

(2) Kondom Wanita

Kondom wanita sebenarnya merupakan kombinasi antara diafragma dan kondom. Alasan utama dibuatnya kondom wanita karena kondom pria dan diafragma biasa tidak dapat menutupi daerah perineum sehingga masih ada kemungkinan penyebaran mikroorganisme penyebab IMS.

(3) Spermisida

Spermisida adalah suatu zat atau bahan kimia yang dapat mematikan dan menghentikan gerak atau melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina, sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Spermisida dapat berbentuk tablet vagina, krim dan jelly, aerosol (busa/foam), atau tisu KB. Cukup efektif apabila dipakai dengan kontrasepsi lain seperti kondom dan diafragma. Angka kegagalan 11-31%.⁶⁶

4) Kontrasepsi Hormonal

a) Pil KB

(1) Pil Kombinasi

Pil kombinasi ini dapat diminum setiap hari, efektif dan reversibel, pada bulan-bulan pertama efek samping berupa mual dan perdarahan bercak yang tidak berbahaya dan segera akan hilang, efek samping serius jarang terjadi, dapat dipakai semua ibu usia reproduksi, baik yang sudah mempunyai anak maupun belum, dapat dimulai diminum setiap saat bila yakin sedang tidak hamil, tidak dianjurkan pada ibu yang menyusui dan dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat. Pil kombinasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pil monofasik yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progestin (E/P) dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, sedangkan pil bifasik yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progesteron (E/P) dengan dua sisi yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, dan pil trifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progesteron (HP) dengan tiga dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif.⁶⁷

(2) Pil Progestin (Mini Pil)

Kontrasepsi minipil ini cocok untuk perempuan menyusui

yang ingin memakai pil KB, sangat efektif pada masa laktasi, dosis rendah, tidak menurunkan produksi ASI, tidak memberikan efek samping estrogen, efek samping utama adalah gangguan perdarahan; perdarahan bercak, atau perdarahan tidak teratur, dan dapat dipakai kontrasepsi darurat. Kontrasepsi mini pil dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kemasan dengan isi 35 pil 300 µg levonorgestrel atau 350 µg noretindron, dan kemasan dengan isi 28 pil 75 µg desogestrel. Kontrasepsi mini pil sangat efektif (98,5%), pada pengguna mini pil jangan sampai ada tablet yang terlupa, tablet digunakan pada jam yang sama (malam hari), dan senggama sebaiknya dilakukan 3-20 jam setelah penggunaan mini pil.⁶⁷

b) Suntik

Suntik KB ada dua jenis yaitu, suntik KB 1 bulan (cyclofem) dan suntik KB 3 bulan (DMPA). Efek sampingnya terjadi gangguan haid, depresi, keputihan, jerawat, perubahan berat badan, pemakaian jangka panjang bisa terjadi penurunan libido, dan densitas tulang. Cara kerjanya mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Kedua kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektifitas yang tinggi, dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun, asal penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan.⁶⁶

c) Implan

Implan adalah alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit, biasanya di lengan atas. Cara kerjanya sama dengan pil, implan mengandung levonorgestrel. Keuntungan dari metode implan ini antara lain tahan sampai 5 tahun, kesuburan akan kembali segera setelah pengangkatan. Efektifitasnya sangat tinggi, angka

kegagalannya 1-3%.⁶⁶

5) Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik (polyethylene). Ada yang dililit tembaga (Cu), ada pula yang tidak, ada pula yang dililit tembaga bercampur perak (Ag). Selain itu ada pula yang di batangnya berisi hormon progesteron. Efektifitasnya tinggi, angka kegagalannya 1%.⁶⁶

6) Kontrasepsi Mantap

Kontrasepsi mantap adalah salah satu cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan atau pemotongan atau pengikatan kedua saluran telur wanita (Tubektomi) atau kedua saluran sperma laki-laki (Vasektomi).

Persyaratan secara umum yang harus dilakukan agar bisa menjadi akseptor kontrasepsi mantap, yaitu :

a) Sukarela

Calon peserta dan pasangan yang akan mengikuti kontrasepsi mantap harus secara sukarela dan mengikuti pelayanan kontrasepsi mantap atas keinginan sendiri.

b) Bahagia

Setiap calon peserta harus terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dianugerahi sekurang-kurangnya 2 orang anak.

c) Kesehatan

Setiap calon peserta tidak ditemukan kontraindikasi kesehatan pada dirinya.

Kontrasepsi mantap terdiri dari 2 jenis metode kontrasepsi, yaitu :

a) Metode Operasi Wanita (MOW) atau Tubektomi

Menurut BKKBN, Metode Operasi Wanita (MOW) atau Tubektomi atau dapat juga disebut dengan sterilisasi. MOW merupakan tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati

saluran telur sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. MOW atau sterilisasi pada wanita adalah suatu cara kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan dengan cara mengikat dan atau memotong pada kedua saluran telur sehingga menghalangi pertemuan sel telur (ovum) dengan sperma.⁶⁸

MOW dapat dilakukan pada ibu – ibu pada usia lebih dari 26 tahun dengan jumlah anak lebih dari 2 orang, yakin telah mempunyai jumlah keluarga yang sudah sesuai dengan kehendaknya, kehamilannya akan menimbulkan resiko yang serius, pasca persalinan dan pasca keguguran, sudah memahami prosedur, sukarela serta setuju menjalaninya.⁶⁹ Menurut Pinem (2009) ada beberapa keuntungan dari MOW antara lain, yaitu:⁶⁹

- (1) Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan).
- (2) Permanen.
- (3) Tidak memengaruhi produksi ASI dan proses menyusui.
- (4) Tidak memengaruhi faktor senggama.
- (5) Baik bagi klien dimana kehamilan menjadi resiko yang serius.
- (6) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anastesi lokal.
- (7) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang.
- (8) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi hormon ovarium).

Beberapa kerugian dalam penggunaan MOW, yakni : pasangan harus mempertimbangkan sifat permanen dari metode kontrasepsi ini pasien dapat menyesal dikemudian hari, resiko komplikasi kecil (meningkat apabila digunakan anastesi umum), rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan, tidak melindungi diri dari IMS dan HIV/AIDS.⁷⁰

Pelaksanaan MOW dapat dilaksanakan pada :

- (1) Setiap waktu selama siklus haid, bila diyakini akseptor tidak hamil.
- (2) Hari ke-6 hingga hari ke-13 siklus haid (fase proliferasi).
- (3) Pascapersalinan : minilap, dalam 2 hari atau setelah 6 minggu atau 12 minggu. Sedangkan laparoscopi, tidak tepat untuk akseptor pascapersalinan.
- (4) Pascakeguguran : triwulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ditemukan infeksi pelvis untuk minilap dan laparoscopi, triwulan kedua dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada bukti infeksi pelvis (untuk minilap saja).⁷⁰

Beberapa hal yang harus dilakukan sebelum tindakan operasi tubektomi antara lain :

- (1) Konseling perihal kontrasepsi dan menjelaskan kepada klien bahwa ia mempunyai hak untuk berubah pikiran setiap waktu sebelum prosedur dilakukan.
- (2) Menanyakan riwayat medis yang memengaruhi keputusan pelaksanaan operasi atau anestesi antara lain : penyakit-penyakit pelvis, pernah mengalami operasi abdominal/pelvis, riwayat diabetes mellitus, riwayat penyakit paru-paru contohnya asthma, pernah mengalami problem dengan anestesi, penyakit-penyakit perdarahan, alergi, dan pengobatan yang dijalani saat ini.
- (3) Pemeriksaan fisik : kondisi-kondisi yang memungkinkan dapat mempengaruhi keputusan pelaksanaan operasi atau anestesi.
- (4) Pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urine dan pap smear.
- (5) Informed consent harus diperoleh. Standard consent form harus ditandatangani oleh suami atau isteri dari calon akseptor sebelum prosedur dilakukan. Umumnya

penandatanganan dokumen informed consent dilakukan setelah calon akseptor dan pasangannya mendapatkan konseling. Dokumen juga dapat ditandatangani oleh saudara atau pihak yang bertanggungjawab atas klien apabila klien kurang paham atau kurang kompeten secara kejiwaan. Apabila calon akseptor buta huruf, maka dapat memberikan cap jempolnya disertai seorang saksi yang tetap harus ikut menandatangani dokumen tersebut yang menyatakan bahwa calon akseptor tersebut telah diberi penjelasan lisan mengenai kontrasepsi.⁷⁰

Beberapa hal yang harus diperhatikan setelah tindakan tubektomi antara lain, yaitu:

- (1) Pada minggu pertama segeralah kembali jika ada demam tinggi, ada nanah atau luka berdarah, nyeri, panas, bengkak, luka kemerahan, diare, pingsan atau sangat pusing.
- (2) Jagalah luka operasi agar tetap kering hingga pembalut dilepas.
- (3) Memulai aktivitas normal secara bertahap.
- (4) Hindari hubungan seks hingga merasa cukup aman.
- (5) Hindari mengangkat benda-benda berat dan bekerja keras selama 1 minggu.
- (6) Jika sakit, minum analgesik untuk mengurangi nyerinya.
- (7) Jadwal kunjungan ulang secara rutin antara 7 dan 14 hari setelah pembedahan.
- (8) Segera kembali jika merasa hamil, nyeri pada perut atau sering pingsan atau merasa ada keluhan.

b) Metode Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi

Metode Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan ovum dengan

sperma) tidak terjadi. MOP atau Vasektomi adalah salah satu cara KB yang permanen bagi pria yang sudah memutuskan tidak ingin mempunyai anak lagi. Calon akseptor harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi ini.⁶⁹

Beberapa keuntungan dari MOP atau Vasektomi antara lain sebagai berikut : sangat efektif, aman, morbiditas rendah dan hampir tidak ada mortalitas, sederhana dan cepat. Hanya memerlukan waktu 5-10 menit, efektif setelah 20 ejakulasi atau tiga bulan, hanya memerlukan anestesi lokal dan biaya rendah.⁶⁹

Beberapa kerugian dari MOP atau Vasektomi, yaitu :

- (1) Diperlukan tindakan operatif.
- (2) Kadang-kadang terjadi komplikasi seperti perdarahan atau infeksi.
- (3) Tidak langsung memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa yang sudah ada didalam sistem reproduksi distal dari tempat oklusivas defrensia dikeluarkan.
- (4) Problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual mungkin bertambah setelah tindakan operatif yang menyangkut sistem reproduktif.⁷⁰

Beberapa hal yang harus dilakukan sebelum tindakan operasi vasektomi adalah :

- (1) Konseling : calon akseptor harus diberi informasi mengenai vasektomi, bahwa prosedur vasektomi tidak mengganggu hormon pria atau menyebabkan perubahan kemampuan atau kepuasan seksual.
- (2) Informed consent (persetujuan tindakan medis) harus dilakukan sama seperti pada tubektomi.
- (3) Setelah prosedur vasektomi, gunakan salah satu kontrasepsi terpilih sampai spermatozoa yang tersisa dalam vesikula

seminalis telah keluar seluruhnya yaitu setelah 15-20 kali ejakulasi.

Hal-hal yang harus diperhatikan setelah melakukan operasi vasektomi antara lain:⁷¹

- (1) Istirahat selama 1-2 jam di tempat melakukan operasi.
- (2) Pertahankan band aid selama 3 hari.
- (3) Menghindari pekerjaan berat selama 2-3 hari,.
- (4) Kompres dengan air dingin atau es pada skrotum.
- (5) Luka yang sedang dalam penyembuhan jangan digaruk-garuk atau ditarik-tarik.
- (6) Jika ada rasa nyeri, minum 1-2 tablet analgesik seperti parasetamol atau ibuprofen setiap 4-5 jam
- (7) Boleh bersenggama setelah hari ke 2 -3. Untuk mencegah kehamilan selama 3 bulan atau sampai ejakulasi 15-20 kali gunakan juga kondom atau cara kontrasepsi lain.
- (8) Periksa semen sesudah 3 bulan atau sesudah 15-20 kali ejakulasi.
- (9) Jangan lupa memeriksa ulang ke dokter dalam jangka waktu 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun setelah operasi.

9. Persalinan *Sectio Caesarea* Metode ERACS

a. Definisi

Sectio Caesarea (SC) adalah persalinan melalui sayatan pada dinding abdomen dan uterus yang masih utuh dengan berat janin lebih dari 1000gram atau umur kehamilan >28 minggu. Persalinan SC juga didefinisikan sebagai kelahiran janin melalui insisi dinding abdomen (laparotomi) dan dinding uterus (histerektomi).⁵³

ERACS (*Enhanced Recovery After Cesarean Surgery*) adalah program cepat pemulihan setelah operasi Caesar yang berupa serangkaian perawatan mulai dari persiapan preoperatif, intraoperatif, dan perawatan post operatif sampai pemulangan pasien. Konsep ERACS merupakan pengembangan dari konsep *Enhanced Recovery*

After Surgery (ERAS) yang dikenalkan pertama kali oleh Kehlet pada tahun 1997, dimana konsep ERAS ini awalnya digunakan pada operasi bedah digestif. Konsep ERAS ini terbukti mengurangi lama rawat pasien di rumah sakit, mengurangi komplikasi pasca operatif, dan meningkatkan kepuasan pasien. Oleh karena itu konsep ERAS ini kemudian dikembangkan untuk tindakan operasi di bidang lain salah satunya di bagian obstetri.⁷²

Operasi caesar merupakan operasi mayor pada abdomen yang paling umum dilakukan pada wanita di dunia. Terdapat dua tantangan setelah persalinan caesar dilakukan yaitu pada post- partum dan post-operasi. Protokol *Enhanced Recovery After Caesarean Section* (ERACS) dapat secara efektif diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.⁷³

b. Indikasi persalinan *sectio caesarea*

Terdapat indikasi medis dan non medis dilakukannya operasi caesar. Indikasi medis dinilai berdasarkan temuan kondisi pasien. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi dilakukan operasi caesar maka akan segera dilakukan penanganan serta tindakan yang tepat. Operasi caesar merupakan pilihan terakhir setelah melewati berbagai pertimbangan medis demi keselamatan ibu dan janin.⁵³ Beberapa indikasi dilakukan tindakan *sectio caesarea* yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Faktor janin

a) Letak sungsang

Sekitar 3-5 % atau 3 dari 100 bayi lahir dalam posisi sungsang. Keadaan janin sungsang terjadi apabila letak janin didalam rahim memanjang dengan kepala berada di bagian atas rahim, sementara bokong berada di bagian bawah rongga rahim. Risiko bayi lahir sungsang pada persalinan alami diperkirakan 4 kali lebih besar dibandingkan lahir dengan letak kepala yang

normal. Oleh karena itu biasanya langkah terakhir untuk mengantisipasi hal terburuk karena persalinan yang tertahan akibat janin sungsang adalah operasi.⁵³

b) Letak lintang

Kelainan lain yang sering terjadi adalah letak lintang atau miring (oblique). Letak yang demikian menyebabkan poros janin tidak sesuai dengan arah jalan lahir. Kelainan letak lintang ini hanya terjadi sebanyak 1%. Kelainan ini biasanya ditemukan pada perut ibu yang menggantung atau karena ada kelainan bentuk rahim.⁵³

c) Ancaman gawat janin

Keadaan gawat janin pada tahap persalinan, memungkinkan dokter untuk memutuskan dilakukannya operasi. Seperti diketahui, sebelum lahir, janin mendapat oksigen dari ibunya melalui ari-ari dan tali pusat. Apabila terjadi gangguan pada ari-ari akibat ibu menderita tekanan darah tinggi atau kejang rahim, serta gangguan pada tali pusat (akibat tali pusat terjepit antara tubuh bayi maka jatah oksigen yang disalurkan ke bayi pun menjadi berkurang. berakibat janin akan tercekik karena kehabisan nafas. Kondisi ini bisa menyebabkan janin mengalami kerusakan otak, bahkan tidak jarang meninggal dalam Rahim.⁵³

d) Bayi kembar

Pada kondisi Bayi kembar akan dilahirkan secara operasi sesar, kelahiran kembar ini memiliki resiko terjadinya komplikasi yang lebih tinggi daripada kelahiran satu bayi. Misalnya, lahir prematur atau lebih cepat dari waktunya. Sering kali terjadi preeklampsia pada ibu yang hamil kembar karena stres. Selain itu karena bayi kembar pun dapat mengalami sungsang sehingga sulit untuk melahirkan normal.⁵³

e) KPD (Ketuban Pecah Dini)

Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum

terdapat tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum terjadi inpartu. Sebagian besar ketuban pecah dini adalah hamil aterm di atas 37minggu.⁴³

f) Makrosomia (Bayi Besar)

Bayi yang terlalu besar dengan perkiraan berat lahir 4.000 gram. atau lebih. Kondisi tersebut jika dilakukan persalinan normal dapat membahayakan keselamatan ibu dan janinnya.⁴³

2) Faktor ibu

a) CPD (Cephalopelvic Disproportion)

Cephalo Pelvik Disproportion (CPD) adalah ukuran lingkaran panggul ibu tidak sesuai dengan ukuran lingkaran kepala janin yang dapat menyebabkan ibu tidak dapat melahirkan secara alami.

b) PEB (Pre-eklamsi Berat)

Pre-eklamsi dan eklamsi merupakan kesatuan penyakit yang langsung disebabkan oleh kehamilan, sebab terjadinya masih belum jelas. Setelah perdarahan dan infeksi, pre-eklamsi dan eklamsi merupakan penyebab kematian maternal dan perinatal paling penting dalam ilmu kebidanan.^{32,5}

c. Penatalaksanaan metode ERACS

Terdapat 3 elemen dalam penerapan ERACS, yaitu persiapan preoperatif, perawatan intraoperatif, dan perawatan post operatif.

1) Persiapan Preoperatif

a) Antenatal care

Edukasi dan konseling yang diberikan mencakup informasi-informasi mengenai prosedur dan apa yang diharapkan selama pembedahan, rencana manajemen nyeri, tujuan pemberian makan, dan mobilisasi dini. Informasi lain yang diberikan kepadapasien yaitu informasi gizi ibu hamil, menyusui, lama perawatan, dan kriteria untuk dipulangkan.^{69,66}

b) Ruang rawat inap

(1) Puasa dilakukan sebelum dilakukannya induksi anestesi.

Lama puasa yang direkomendasikan adalah 6- 8 jam untuk makanan padat dan 2 jam untuk cairan oral.

- (2) Pasien mandi dengan sabun antiseptik (terutama pada bagian pembedahan atau perut)
- (3) Memberikan ranitidine atau omeprazole kapsul 2 jam sebelum tindakan.
- (4) Memberikan antibiotik profilaksis sesuai DPJP 30-60 menit sebelum tindakan.
- (5) Melakukan skrining anemia dan memberikan suplementasi zat besi pada ibu hamil. ^{69,66}

2) Perawatan Intraoperatif

- a) Suhu kamar operasi di 22-23°C selama bayi masih di kamar operasi. Lakukan active warming system dengan penggunaan infus/cairan hangat untuk mencegah pasien hipotermi.
- b) Pasien diberikan anestesi spinal dengan bupivacaine spinal 0,5% dosis rendah, fentanyl dan morfin (menggunakan jarum 27G dengan introducer).
- c) Pasien diberikan analgesic non-opioid analgesia, paracetamol bolus IV dan NSAID segera setelah bayi lahir.
- d) Pasien diberikan uterotonika optimal dengan dosis rendah secara efektif untuk mencapai kontraksi uterus yang adekuat. Infus oksitosin dosis rendah 15-18 IU/jam diberikan sebagai profilaksis perdarahan post partum. Dosis rendah mengurangi terjadinya efek samping seperti hipotensi dan iskemia miokard.
- e) DPJP Obgyn menginfokan Delayed Cord Clamping pada bayi lahir bugar selama 30-60 detik.
- f) Dilakukan IMD pada ibu kondisi stabil dan bayi bugar selama 30-60 menit. Skin to skin dini dapat bermanfaat meningkatkan kecepatan dan durasi menyusui, serta dapat menurunkan kecemasan ibu dan depresi post partum. ^{69,66}

3) Perawatan Post Operatif

- a) Berikan cairan jernih 0-30 menit post operatif bila kondisi baik dan tidak ada mual muntah.
- b) Berikan multimodal (opioid sparing: paracetamol dan NSAID). Morfin merupakan gold standar pengendalian nyeri selama dan pasca operasi. direkomendasikan menggunakan analgetik kombinasi dengan mekanisme kerja yang berbeda.
- c) Dilakukan mobilisasi dini mulai di ruang perawatan. Mobilisasi dini dapat meningkatkan fungsi dan oksigenasi jaringan pulmoner, meningkatkan resistensi insulin, dan mengurangi risiko terjadinya tromboemboli, serta memperpendek durasi rawat inap.
 - (1) Mobilisasi level 1: duduk bersandar di tempat tidur selama 15-30 menit
 - (2) Mobilisasi level 2: duduk disisi tempat tidur dengan kaki menjuntai selama 5-15 menit
 - (3) Mobilisasi level 3: mobilisasi berdiri
 - (4) Mobilisasi level 4: mobilisasi berjalan
- d) Pelepasan kateter urin dini. Lepas kateter paling lambat 6 jam pascatindakan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran kemih
- e) Bila terjadi breakthrough pain diberikan tambahan terapi berupa opioid intravena, misalnya petidin.
- f) Pasien diberikan asupan oral dini. Asupan oral secara dini dapat mendorong kembali fungsi usus dan ambulasi dini, menurunkan risiko sepsis, mengurangi waktu menyusui, dan memperpendek lama rawat inap. Pemberian makan bebas dapat diberikan 4 jam.^{69,66}

10. Teori Kewenangan Bidan

- a. Undang undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan⁷⁴

Pasal 46

- 1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas

memberikan pelayanan yang meliputi:

- a) layanan kesehatan ibu;
- b) pelayanan kesehatan anak;
- c) pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;

Pasal 49

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a, Bidan berwenang:

- 1) memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil;
- 2) memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal;
- 3) memberikan Asuhan Kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal;
- 4) memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas;
- 5) melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan; dan
- 6) melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.

Pasal 50

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Bidan berwenang:

- 1) memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah;
- 2) memberikan imunisasi sesuai program Pemerintah Pusat;
- 3) melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan; dan
- 4) memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 51

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Permenkes Republik Indonesia No. 28 tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan⁷⁵

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- 1) pelayanan kesehatan ibu;
- 2) pelayanan kesehatan anak; dan
- 3) pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 19

- 1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.
- 2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a) konseling pada masa sebelum hamil;
 - b) antenatal pada kehamilan normal;
 - c) persalinan normal; d.ibu nifas normal;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) konseling pada masa antara dua kehamilan.
- 3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:
 - a) episiotomi;
 - b) pertolongan persalinan normal;
 - c) penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;

- d) penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
- e) pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
- f) pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- g) fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif; pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
- h) penyuluhan dan konseling;
- i) bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
- j) pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.

Pasal 20

- 1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah.
- 2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan:
 - a) pelayanan neonatal esensial;
 - b) penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
 - c) pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
 - d) konseling dan penyuluhan.
- 3) Pelayanan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi inisiasi menyusui dini, pemotongan dan perawatan tali pusat, pemberian suntikan Vit K1, pemberian imunisasi B0, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih mampu.
- 4) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a) penanganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan jalan nafas, ventilasi tekanan positif, dan/atau kompresi jantung;

- penanganan awal hipotermia pada bayi baru lahir dengan BBLR melalui penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara menghangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru;
- b) penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol atau povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering; dan
 - c) membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO).
- 5) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkaran kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).
- 6) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan, imunisasi, gizi seimbang, PHBS, dan tumbuh kembang.

Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, Bidan berwenang memberikan:

- 1) penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- 2) pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan

BAB III

PEMBAHASAN

Secara teori bab ini akan membahas tentang perbandingan antara teori dan kasus serta ada tidaknya kesenjangan. Asuhan kebidanan yang peneliti buat merupakan asuhan kebidanan secara berkesinambungan (*continuity of care*) dengan demikian pembahasan ini akan peneliti uraikan sebagai berikut:

A. Asuhan Kebidanan Kehamilan

Pengkajian dilakukan pada Ny. S usia 37 tahun, pendidikan terakhir SMK kegiatan sehari-hari menjadi ibu rumah tangga. Ny. S sudah menikah dengan Tn. saat usia 21 tahun, Usia pernikahan kurang lebih 16 tahun. Ny. S tinggal bersama suaminya di desa Rasukan RT 02 RW 01, Ngombol, Purworejo. Ditinjau dari usianya, Ny. S termasuk ibu hamil risiko tinggi dengan faktor risiko usia >35 tahun. Berdasarkan penelitian dari Bayrampour et al (2012) kehamilan pada usia ibu lanjut didefinisikan sebagai kehamilan pada usia 35 tahun atau lebih, dikaitkan dengan beberapa hasil kehamilan yang merugikan termasuk kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, lahir mati, cacat kromosom, komplikasi persalinan, dan operasi caesar. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai kehamilan berisiko tinggi.⁷⁶

Berdasarkan riwayat menstruasi, siklus menstruasi ibu teratur 28 hari, lama menstruasi 7 hari, tidak ada keputihan dan saat menstruasi tidak mengalami nyeri haid/dismenorea. Hari pertama haid terakhir (HPHT): 23 April 2023, dan HPL: 30 Januari 2024. Asuhan pertama kali dilakukan yaitu tanggal 10 Januari 2024, diketahui Ny.S hamil anak ke3, pernah melahirkan 2 kali, tidak pernah keguguran (Ny.S G3 P2Ab0Ah2), umur 37 tahun, usia kehamilan 36 minggu 4 hari. Menurut Nugroho, dkk, 2014, perhitungan usia kehamilan dapat dilakukan menggunakan rumus Naegele, yaitu usia kehamilan dihitung 280 hari yang berpatokan pada HPHT dan atau tafsiran persalinan (TP).⁷⁷ Hasil screening menggunakan kartu skor poedji rochjati, diperoleh nilai Skor 14, yaitu Faktor Resiko Kelompok I dan II yaitu umur ibu lebih dari 35 tahun dan kehamilan dengan letak sungsang sehingga Ny.S dikategorikan

kehamilan dengan resiko sangat tinggi.²⁶

Ny. S mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi, asma, DM, ginjal, TBC, IMS maupun HIV/AIDS dan tidak ada yang memiliki riwayat bayi kembar, dan tidak merokok, dan tidak minum obat-obatan terlarang. Ny. S mengeluh sering sesak napas dan nyeri perut bagian bawah. Ibu mengatakan kadang-kadang merasa sesak napas dan nyeri pada perut bagian bawah. Keluhan sesak napas merupakan ketidaknyamanan yang dirasakan pada ibu hamil trimester III hal ini karena tekanan bayi yang berada dibawah diafragma menekan paru-paru ibu. Sering dikeluhkan berupa sesak nafas, yang disebabkan oleh pembesaran uterus yang menghalangi pengembangan paru-paru secara maksimal juga perubahan pernapasan yang diakibatkan oleh peningkatan progesterone dan laju metabolik maternal dan konsumsi oksigen janin yang mengakibatkan ibu susah mengambil napas. Oleh karena itu, Ibu hamil dianjurkan untuk menarik nafas dalam dan lama serta dianjurkan untuk tidur dengan posisi miring ke kiri. Akan tetapi setelah bagian terbawah janin sudah turun ke rongga panggul biasanya pada 2-3 minggu sebelum persalinan maka ibu akan merasakan lega dan bernafas lebih mudah.

Selama kehamilan Ny. S melakukan pemeriksaan ANC sebanyak 10 kali dengan rincian Trimester pertama melakukan pemeriksaan ANC sebanyak 2 kali, pada trimester kedua melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali dan pada trimester ketiga melakukan pemeriksaan sebanyak 5 kali. Hal ini sudah sesuai dengan teori Kemenkes RI, Tahun 2020 dan sesuai dengan anjuran WHO menjelaskan bahwa Frekuensi pemeriksaan ANC pada kehamilan normal minimal dilakukan sebanyak 6x dengan rincian 2x di Trimester 1, 1x di Trimester 2, dan 3x di Trimester 3. Minimal 2x diperiksa oleh dokter saat kunjungan 1 di Trimester 1 dan saat kunjungan ke 5 di Trimester 3. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan kunjungan antenatal yang dilakukan Ny. S sudah sesuai dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus dan telah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan dengan kebijakan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PPIBI) dan Kebijakan Kementerian Kesehatan RI yang tertuang di buku KIA

tahun 2020 Salah satu upaya dalam percepatan penurunan AKI dan AKB salah satunya yaitu dengan peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar 10T meliputi:⁷⁸

1. Timbang Berat Badan Dan Ukur Tinggi Badan (T1)

BB Ny.S sebelum hamil: 48 kg, BB saat ini: 62 kg, TB : 150 cm sehingga pengukuran IMT sebesar 21,33 kg/m² (Normal) dan kenaikan berat badan yang dialami Ny.S yaitu 14 kg. Hal ini sesuai teori yang menyatakan bahwa ibu yang memiliki IMT normal, kenaikan berat badan pada ibu hamil direkomendasikan sebesar 11,5–16 kg.⁷⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Lathifah (2019) menunjukkan bahwa didapatkan ada hubungan kenaikan berat badan ibu selama hamil terhadap Berat Bayi Lahir (p-Value=0,002<0,05).⁷⁹

2. Nilai Status Gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas /LILA) (T2)

LILA Ny.S saat awal hamil adalah 24 cm. Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester I untuk skrining ibu hamil berisiko Kekurangan Energi Kronik (KEK). Lila Ny. S menunjukkan angka normal karena lebih dari 23 cm, ibu tidak mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah salah satu keadaan malnutrisi. Ibu KEK menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi.⁸⁰

3. Ukur Tekanan Darah (T3)

Selama kehamilan Ny. S melakukan pemeriksaan ANC sebanyak 10 kali. Pada kasus Ny.S tekanan darah rata-rata Ny.S berkisar antara 104/88 mmHg – 122/77 mmHg.

Hal ini sesuai dengan teori pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (2020) yang menjelaskan bahwa tekanan darah yang normal berkisar antara 100/70 – 140/90 mmHg, sedangkan Menurut buku (Irianti, 2014 hal : 259) nilai tekanan darah dewasa normalnya berkisar dari 100/60 mmHg sampai 140/90 mmHg (Irianti, 2014 hal : 259). Dalam hal ini tidak terjadi

kesenjangan antara teori dengan praktek.⁸¹

4. Ukur Tinggi Fundus Uteri (T4)

Pada pada tanggal 10 Januari 2024, pemeriksaan ANC pertama oleh peneliti dengan hasil UK ibu 36⁺⁴ minggu dengan TFU saat itu sebesar 32 cm, kemudian dilakukan ANC ke 2 pada tanggal 17/01/2024 dengan hasil UK 37⁺⁵ minggu dengan TFU 33 Cm. Hal ini sesuai teori dari Kemenkes RI tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan.⁷⁸ Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Hal ini juga sesuai dengan teori (Prawirohardjo, 2014 hal : 176) yang menyebutkan bahwa saat usia kehamilan 36 minggu, maka TFU (pertigaan jari) adalah setinggi px, dan untuk pengukuran centimeter adalah 33 cm. Sedangkan menurut (Irianti, 2014 hal: 270) yang menyatakan bahwa, perbedaan pengukuran lebih dari 2cm dapat dipengaruhi oleh kehamilan ganda, ukuran tubuh ibu, adanya gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, posisi janin dan karakteristik ibu dan janin lainnya. Hal ini sesuai dengan teori (Irianti, 2014) yang mengatakan bahwa jika hasil pengukuran berbeda ± 2 cm, masih dapat ditoleransi. Dalam hal ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan praktek.⁸¹

5. Tentukan Presentasi Janin Dan Denyut Jantung Janin (DJJ) (T5)

Dari hasil pemeriksaan Pada tanggal 10/01/2024 dengan hasil UK ibu 36⁺⁴ minggu. Hasil pemeriksaan abdomen, tinggi fundus 32 cm, pada perut ibu bagian atas teraba bagian bulat keras dan melenting yaitu kepala janin, pada pada perut ibu bagian kiri teraba bagian yang keras seperti papan yaitu punggung janin, pada bagian perut bagian kanan teraba bagian-bagian terkecil janin, di perkirakan adalah ekstrimitas janin, pada bagian perut bagian bawah teraba bagian bulat, lunak dan tidak melenting yaitu bokong janin, bagian terbawah janin belum masuk panggul, TBJ: 3100 gram, DJJ: 144x/menit.

Pemeriksaan pada tanggal 17/01/2024 dengan hasil UK 37⁺⁵ minggu.

Hasil pemeriksaan abdomen, tinggi fundus 33 cm, pada perut ibu bagian atas teraba bagian bulat keras dan melenting kemungkinan kepala janin, pada pada perut ibu bagian kiri teraba bagian yang keras seperti papan, pada bagian perut bagian kanan teraba bagian-bagian terkecil janin, di perkirakan adalah ekstremitas janin, pada bagian perut bagian bawah teraba bagian bulat, lunak dan tidak melenting, diperkirakan bokong janin dan sudah masuk pintu atas panggul. Ibu dijadwalkan kontrol ke Rumah Sakit pada tanggal 24 Januari 2024 untuk memastikan ibu perlu dilakukan USG karena letak terbawah janinnya adalah bokong.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Leopold didapatkan letak sungsang. Letak sungsang adalah suatu keadaan dimana posisi janin memanjang (membujur) dalam rahim dengan kepala berada pada bagian atas rahim (fundus uteri) dan bokong berada dibagian bawah ibu. Diagnosis pada kasus letak sungsang ditegakkan dengan pemeriksaan perabdominal pada palpasi di bagian bawah teraba bagian yang kurang keras dan kurang bundar, sementara di fundus teraba bagian yang keras, bundar dan melenting. Denyut jantung janin terdengar di atas pusat. Pemeriksaan USG dapat mengetahui letak yang sebenarnya.³⁰

Presentasi bokong dan malpresentasi lain yang kurang umum mempengaruhi hingga 3% -4% kehamilan cukup bulan dan bahkan lebih sering terjadi pada kehamilan awal. Faktor risiko malpresentasi beragam dan termasuk usia ibu, paritas, anomali uterus, prematuritas, hambatan pertumbuhan janin, anomali janin, dan kelainan cairan ketuban.⁸²

Berdasarkan penelitian Giri, et.al ibu dengan usia >35 tahun lebih berisiko mengalami presentasi bokong dibandingkan ibu berusia lebih muda (8,8% vs 1,1%, p=0,04).⁸³

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Ny.S didapatkan bahwa penghitungan denyut jantung janin, punctum maksimum terdapat pada kuadran kiri atas perut ibu dengan rata-rata DJJ janin Ny.S berkisar antara 140-159x/menit. Hal ini sesuai dengan teori pada buku KIA (2020) yang menyatakan bahwa standar DJJ dimana normalnya 120-160 x/menit. Dalam

hal ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan praktek.⁷⁸

6. Beri Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) (T6)

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Ny.S didapatkan bahwa Ny.S saat bayi mendapatkan imunisasi lengkap, saat SD juga mendapatkan suntikan TT sebanyak 2x dan Sebelum menikah, Ny.S juga telah diberi suntik TT sehingga status TT Ny.S adalah TT 5. Selama kehamilan ini Ny. S tidak diberikan suntik imunisasi TT karena status TT nya sudah lengkap.

Berdasarkan teori Kemenkes RI tahun 2020 dan *PP IBI, 2016: 60* menjelaskan bahwa ibu hamil dengan status TT5 mendapatkan perlindungan seumur hidup (25 Tahun) dari virus tetanus toxoid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status imunisasi TT Ny. S saat ini adalah TT5 dan sudah sesuai dengan anjuran pemerintah.⁷⁸

7. Beri Tablet Tambah Darah (Tablet Besi) (T7)

Menurut teori Kemenkes RI tahun 2020, Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah (tablet zat besi) dan Asam Folat minimal 90 tablet selama kehamilan diberikan sejak kontak pertama.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Ny.S didapatkan bahwa Ny.S mendapatkan tablet Fe pertama kali di Tulungagung pada Usia kehamilan 12 – Usia kehamilan 40 minggu Sehingga total tablet Fe yang didapat oleh Ny.S selama kehamilan kurang lebih sebanyak 150 tablet. Hal ini sesuai dengan teori pada buku KIA (2020) yang menyebutkan idealnya setiap ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe sebanyak 90 tablet.⁷⁸

8. Periksa Laboratorium (Rutin Dan Khusus) (T8)

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal, pemeriksaan dibagi menjadi pemeriksaan laboratorium wajib dan atas indikasi. Selama kehamilan ini Ny.S teratur melakukan pemeriksaan kehamilan dan melakukan pemeriksaan ANC secara komprehensif dan sesuai standar.

Berdasarkan catatan di buku KIA ,Ny. S sudah melakukan pemeriksaan ANC terpadu pada saat pertama kali datang ke Puskesmas Tulungagung (K1) tanggal 20 Juni 2023 usia kehamilan 8 minggu dengan hasil : Hb : 12,3

g/dl.GDS : 86 Protein urine : (-) negatif,HbSAg : (-) Non reaktif. HIV: (-) Non reaktif Sifilis: (-) Non reaktif. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas tanggal 20 Desember 2023 : Hb : 12 gr/dl, Protein Urine : Negatif.

Hal ini sesuai dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (2020) yang menyebutkan bahwa ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar pelayanan kehamilan 10 T meliputi tes golongan darah, tes hemoglobin, tes protein urine, tes glukosa urine, tes pemeriksaan darah lainnya, seperti HIV Sifilis, dan Hepatitis B (triple eliminasi) sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemis. Dalam hal ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan praktek.⁷⁸

9. Tata Laksana Atau Penanganan Kasus (T9)

Pada saat pemeriksaan, Ny.S diberikan konseling mengenai perawatan kehamilan,posisi kneechest, persiapan persalinan, persalinan dan inisiasi menyusui dini (IMD), nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana dan imunisasi pada bayi, keluhannya yaitu sesak jika tidur lama dengan posisi terlentang terlalu lama, sering terbangun tidurnya karena sesak dan sering BAK pada malam hari.

Penyebab terjadinya kehamilan dengan presentasi bokong dari berbagai faktor yaitu fiksasi kepala tidak ada karena panggul sempit ,hidrosefalus ,anesefalus ,plasenta previa dan tumor-tumor pelvis. Janin sudah bergerak pada hidramnion, multiparitas, anak kecil atau sudah mati ,gemeli, kelainan uterus seperti arkuatus.(Rustam Mochtar ,2013).⁸⁴ Intervensi yang bisa dilakukan pada presentasi bokong dapat berubah menjadi letak kepala yang dilakukan selama kehamilan trimester ketiga dengan teknik posisi knee chest selama 15 menit yang diulang setiap 2 jam pada waktu bangun tidur selama 5 hari.

Penelitian. Kenfack dkk menunjukkan posisi knee chest juga menurunkan insiden presentasi bokong pada persalinan (Kenfack et al., 2012). Masalah yang dialami Ny.S adalah kelainan letak bokong. Kebutuhan yang diberikan mengajari ibu tentang posisi knee chest sesuai dengan peneltian yang sudah dilakukan bisa berhasil mengubah posisi janin

menjadi kepala. Tindakan segera yang harus dilakukan pada kasus Ny.S dengan kehamilan letak bokong adalah berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk memastikan posisi dengan USG.

Penatalaksanaan selanjutnya yang diberikan pada Ny. S adalah memberitahu ibu dan keluarga cara mengatasi keluhan sesaknya yaitu dengan melatih ibu hamil untuk membiasakan dengan pernapasan normal, berdiri tegak dengan kedua tangan direntangkan di atas kepala kemudian menarik nafas panjang, dan selalu menjaga sikap tubuh yang baik. Ibu hamil perlu dijelaskan bidan tentang penyebab fisiologis yang dapat menyebabkan sesak napas agar lebih tenang. Secara Fisiologis keluhan sesak napas merupakan ketidaknyamanan yang dirasakan pada ibu hamil trimester III hal ini karena tekanan bayi yang berada dibawah diafragma menekan paru-paru ibu. Sering dikeluhkan berupa sesak nafas, yang disebabkan oleh pembesaran uterus yang menghalangi pengembangan paru-paru secara maksimal juga karena perubahan pernapasan yang diakibatkan oleh peningkatan progesterone dan laju metabolik maternal dan konsumsi oksigen janin yang mengakibatkan ibu susah mengambil napas. Oleh karena itu, Ibu hamil dianjurkan untuk menarik nafas dalam dan lama serta dianjurkan untuk tidur dengan posisi miring ke kiri. Akan tetapi setelah bagian terbawah janin sudah turun ke rongga panggul biasanya pada 2-3 minggu sebelum persalinan maka ibu akan merasakan lega dan bernafas lebih mudah.

Sedangkan menurut sutanto 2017 dan bayu irianti dkk tahun 2014 menjelaskan bahwa selain dengan cara di atas ibu hamil juga dapat dimotivasi untuk mengikuti senam hamil atau Yoga pada kehamilan untuk mengatasi keluhan tersebut, Teknik yoga untuk ibu hamil ini mengajarkan ibu hamil cara mengatasi sesak nafas dan mengatasi kontraksi dengan memusatkan perhatian pada nafas, selain itu Yoga juga dapat meningkatkan berat badan lahir, menurunkan kejadian prematuritas dan PJT.

Selain manfaat fisik, dampak yoga terhadap emosi adalah mengurangi kelelahan sehingga meningkatkan stamina, membantu meningkatkan

konsentrasi dan mengurangi stres sebesar 32% terpenting dari yoga adalah membantu ibu menikmati kehamilannya dan memahami kebutuhan yang tepat untuk janinnya. Hal ini juga didukung dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Hajarul Azward dkk tahun 2021 yang menekankan bahwa hal Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pada kelompok control (p -value $0,001 < 0,05$) dan intervensi (p -value $0,001 < 0,05$), terdapat perbedaan kualitas tidur yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan intervensi dengan kesimpulan jurnal latihan prenatal yoga meningkatkan kualitas tidur ibu hamil trimester ketiga.⁸⁵

Hal ini sesuai dengan standar pelayanan kehamilan pada Buku KIA (2020). Konseling yang diberikan mengenai keluhannya yaitu jelaskan bahwa keluhan sesak, sering BAK merupakan hal yang fisiologis di kehamilan trimester 3 akhir mendekati persalinan. Dalam hal ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan praktek.

10. Temu Wicara (Konseling) (T10)

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Ny.S didapatkan bahwa Ny.S mengalami presentasi bokong dan resiko umur lebih dari 35 tahun pada kehamilannya. Penyebab terjadinya kehamilan dengan presentasi bokong dari berbagai faktor yaitu fiksasi kepala tidak ada karena panggul sempit, hidrosefalus, anesefalus, plasenta previa dan tumor-tumor pelvis. Janin sudah bergerak pada hidramnion, multiparitas, anak kecil atau sudah mati, gemeli, kelainan uterus seperti arkuatus. (Rustam Mochtar, 2013).⁸⁴

Selain itu berdasarkan penelitian Musyahida (2019) penyebab letak sungsang adalah fiksasi kepala pada pintu atas panggul tidak baik atau tidak ada. Janin mudah bergerak seperti pada hidramnion, multipara, janin kecil, gemelli, kelainan uterus seperti uterus aruatus, mioma uteri. Janin sudah lama mati.⁸⁶

Intervensi yang bisa dilakukan pada presentasi bokong dapat berubah menjadi letak kepala yang dilakukan selama kehamilan trimester ketiga dengan teknik posisi knee chest selama 15 menit yang diulang setiap 2 jam pada waktu bangun tidur selama 5 hari. Penelitian Kenfack dkk

menunjukkan posisi knee chest juga menurunkan insiden presentasi bokong pada persalinan (Kenfack et al., 2012). Masalah yang dialami Ny.S adalah kelainan letak bokong. Kebutuhan yang diberikan mengajari ibu tentang posisi knee chest sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan bisa berhasil mengubah posisi janin menjadi kepala. Tindakan segera yang harus dilakukan pada kasus Ny.S dengan kehamilan letak bokong adalah berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk memastikan posisi dengan USG.

Ny. S termasuk ibu hamil risiko tinggi dengan fakto risiko usia >35 tahun. Berdasarkan penelitian dari Bayrampour et all (2012) kehamilan pada usia ibu lanjut didefinisikan sebagai kehamilan pada usia 35 tahun atau lebih, dikaitkan dengan beberapa hasil kehamilan yang merugikan termasuk kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, lahir mati, cacat kromosom, komplikasi persalinan, dan operasi caesar. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai kehamilan berisiko tinggi.

Memberikan dukungan dan semangat kepada ibu dalam menjalani kehamilannya, berdasarkan hasil penelitian Sari (2018) dukungan bidan penting dilakukan karena dapat memberikan kepercayaan pada pasien sehingga pasien merasa nyaman dan tidak cemas dalam menghadapi keadaannya saat ini. Pemberian sugesti bertujuan untuk memberikan pengaruh pada Ny. S dengan pemikiran yang dapat diterima secara logis. Sugesti yang diberikan berupa sugesti positif yang mengarah pada tindakan memotivasi Ny. S agar dapat mengelola kecemasannya. Menganjurkan keluarga terutama suami Ny. S untuk terlibat dalam pemberian dukungan ini. Menjelaskan tanda bahaya kehamilan, menganjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan ANC.

B. Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin

Berdasarkan pengkajian data subjektif Ny.S melakukan USG pada tanggal 24 Januari 2024 di RS Budi Sehat Purworejo. Ny.S disarankan untuk melahirkan di RS secara SC tanggal 30 Januari 2024 atau jika ada tanda-tanda persalinan untuk segera periksa ke rumah sakit.

Pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Ny.S datang ke RS Budi Sehat Purworejo bersama suami karena sudah dijadwalkan pada tanggal 30 Januari pukul 08.00 WIB untuk dilakukannya persalinan dengan tindakan SC dengan indikasi presentasi bokong dan faktor resiko umur serta perkiraan berat bayi lebih dari 3500 gram. Berdasarkan wawancara dengan Ny.S, saat datang ke RS Budi Sehat Purworejo, Ny. S merasakan kenceng-kenceng tapi masih jarang, belum ada bloody show dan air ketuban belum pecah, pemeriksaan fisik serta TTV dalam batas normal, belum ada pembukaan, Umur kehamilan Ny.S adalah 40 minggu.

Saat di Rumah Sakit, Ny.S dilakukan pemeriksaan NST dengan hasil reguler. Pada pukul 00.00 ibu mulai persiapan pre operasi dengan melakukan puasa dan pukul 07.30 WIB masuk ruang operasi di RS Budi Sehat Purworejo. Pada pukul 08.08 WIB bayi lahir dengan cara SC dengan metode Eracs. Persalinan dengan SC berjalan dengan lancar sekaligus dilakukan KB MOW yaitu prosedur pembedahan sukarela untuk menghentikan kesuburan atau memotong kedua saluran telur (tuba falopi). Hal ini sesuai dengan teori dimana umur ibu lebih dari 35 tahun dan merupakan kontrasepsi yang tepat dipilih ibu karena tidak ingin menambah keturunan lagi.

Terdapat indikasi medis dan non medis dilakukannya operasi caesar. Indikasi medis dinilai berdasarkan temuan kondisi pasien. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi dilakukan operasi caesar maka akan segera dilakukan penanganan serta tindakan yang tepat. Berdasarkan Diane (2015) dan Cunningham (2012) Operasi caesar merupakan pilihan terakhir setelah melewati berbagai pertimbangan medis demi keselamatan ibu dan janin.^{43,53}

Andi Hasliani (2017) Berdasarkan hasil penelitian persalinan presentasi bokong lebih banyak penanganan melalui sectio caesaria di bandingkan pervagina. Persalinan normal dapat beresiko tinggi pada persalinan letak bokong, persalinan caesaria menjadi cara teraman karena

tidak ada proses mengejan, resiko meregangnya otot-otot dasar panggul dan vagina menjadi berkurang. Proses caesar lebih relatif singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.⁸⁷

Menurut Humaira dkk tahun 2022 menjelaskan bahwa Kelahiran SC metode ERACS (*Enhanced Recovery After Cesarean Surgery*) dipilih menjadi teknik persalinan pada Ny. S Persalinan SC dengan metode ERACS adalah program cepat pemulihan setelah operasi Caesar yang berupa serangkaian perawatan mulai dari persiapan preoperatif, intraoperatif, dan perawatan post operatif sampai pemulangan pasien. Sedangkan menurut Habib dan Ituk 2018 menjelaskan bahwa konsep ERACS merupakan pengembangan dari konsep *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS) yang dikenalkan pertama kali oleh Kehlet pada tahun 1997, dimana konsep ERAS ini awalnya digunakan pada operasi bedah digestif. Konsep ERAS ini terbukti mengurangi lama rawat pasien di rumah sakit, mengurangi komplikasi pasca operatif, dan meningkatkan kepuasan pasien. Oleh karena itu konsep ERAS ini kemudian dikembangkan untuk tindakan operasi di bidang lain salah satunya di bagian obstetri.^{72,88}

Hal ini didukung oleh hasil jurnal yang diakui oleh Pervez Sultan tahun 2021 yang mendapatkan hasil : ERAC dikaitkan dengan pengurangan: lama tinggal atau rawat inap di rumah sakit (MD -0,51 hari [-0,94, -0,09]; p = 0,018; I2 = 99%), waktu untuk mobilisasi pertama (MD -11,05 jam [-18,64, -3,46]; p = 0,004; I2 = 98%), waktu pelepasan kateter urin (MD -13,19 h [-17,59, -8,79]; p < 0,001; I2 = 97%) dan konsumsi opioid (MD -21,85 mg ekivalen morfin [-33,19, -10,50]; p = < 0,001; I2 = 91%), dengan tidak ada perbedaan dalam tingkat penerimaan kembali ibu (OR 1,23 [0,96, 1,57]; p = 0,10; I2 = 0%). Tiga studi melaporkan penghematan biaya terkait dengan ERAC. Tingkat bukti GRADE dinilai sebagai kualitas rendah atau sangat rendah untuk semua hasil studi. Dimana dalam jurnal ini disimpulkan bahwa melahirkan SC dengan metode ERAC dikaitkan dengan pengurangan waktu lama rawat inap pasien,

waktu untuk mobilisasi pertama pasien yang lebih cepat dibanding SC konvensional dan pelepasan kateter urin serta konsumsi opioid yang lebih singkat waktunya.⁸⁹

Bayi Ny. S lahir jam 08.08 WIB berjenis kelamin perempuan lahir 30 Januari 2024 menangis kuat dengan berat 3.900 gr dan panjang badan 52 cm. Bayi diobservasi di ruang perinatologi dan baru dilakukan rawat gabung dengan ibu pada 30/01/2024 pada pukul 15.00 wib, dan ibu serta bayi diizinkan pulang kerumah pada hari rabu 01/02/2024 siang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dan penanganan yang diberikan RS Budi Sehat Purworejo sudah sesuai dengan teori.

C. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dan Neonatus

Bayi Ny.S lahir cukup bulan masa gestasi 40 minggu, lahir secara SC pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 08.08 WIB, jenis kelamin perempuan. BB 3900 gr, PB 52 cm, LK 35 cm, LD 34 cm, LILA 12 cm. Begitu bayi lahir bayi langsung ditangani dan dibawa ke ruang Perinatologi. Bayi baru dilakukan rawat gabung dengan ibu pada pukul 15.00. Menurut teori Setiani (2016)Bayi baru lahir normal mempunyai ciri-ciri berat badan lahir 2500-4000 gram, umurkehamilan 37-40 minggu, bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI dengan baik, dan tidak ada cacat bawaan, memiliki panjang badan 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar lengan 11-12 cm, frekuensi denyut jantung 120-160 x/menit, pernapasan 40-60 x/menit, lanugo tidak terlihat dan rambut kepala tumbuh sempurna, kuku agak panjang dan lemas, nilai APGAR >7, refleks-refleks sudah terbentuk dengan baik (rooting, sucking, moro, grasping), organ genitalia pada bayi laki-laki testis sudah beradapada skrotum dan penis berlubang, pada bayi perempuan vagina dan uretra berlubang serta adanya labia minora dan mayora, mekonium sudah keluar dalam 24 jam pertama berwarna hitam kecoklatan.⁶¹

Kehamilan Ny. S berusia 40 minggu, hal ini sesuai dengan teori Setiani, 2016 yang menjelaskan bahwa bayi baru lahir adalah bayi yang

lahir, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu, dengan berat badan 2500-4000 gram. Berdasarkan teori Setiani, 2016 diatas diketahui juga bahwa terdapat kesesuaian antara kasus dengan teori diantaranya secara teori warna kulit kemerahan, menangis kuat dan tonus otot baik, Dalam hal ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek. Dimana kondisi bayi saat dilahirkan tidakmenangis kuat, tonus otot baik dan langsung ditangani oleh Tim perinatologi. Setelah bayi lahir dilakukan penilaian Apgar Score (AS), didapatkan hasil AS bayi Ny. S yaitu 8/9.

Penilaian ini termasuk dalam keadaan normal karena menurut Saifuddin bayi normal/asfiksia ringan apabila memiliki nilai AS 7-10, asfiksia sedang apabila nilai AS 4-6, dan bayi asfiksia berat apabila nilai AS 0-3. Sehingga penulis berpendapat bahwa bayi normal dengan apgar 8/9.⁹⁰

Pemeriksaan fisik awal pada bayi baru lahir dilakukan sesegera mungkin dengan tujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan atau tidak pada bayi serta memudahkan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan fisik dan kondisi stabil, bayi Ny. S diberikan injeksi vitamin K 0,5 cc secara Intra Muscular (IM) pada paha kiri anterolateral. Setelaha satu jam kemudian bayi Ny. S diberikan imunisasi hepatitis B secara IM pada paha kanan anterolateral dan antibiotik berupa salep mata. Asuhan ini diberikansesuai dengan teori JNPK dan Teori pelayanan esensial bayi baru lahir yang ada di buku KIA 2020 yang menjelaskan bahwa 1 jam setelah bayi lahir dilakukan penimbangan dan pemantauan antropometri serta pemberian tetes mata tetrasiklin dan vitamin K1 1 mg IM di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, diberikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan anterolateral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan praktikdengan teori dalam pelayanan esensial pada bayi baru lahir Ny.S.

Pemeriksaan bayi Ny S dilakukan dalam waktu bayi berusia kurang dari 28 hari. Dimana bayi berusia 28 hari dari ia dilahirkan disebut dengan neonatus. Neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan

Neonatus adalah bulan pertama kelahiran.⁹¹

By.Ny S dilakukan 3 kali, hal ini sesuai dengan teori (Zulyanto, dkk, 2014. Kunjungan Neonatal (KN) ke-1 dilakukan dalam kurun waktu 6-48 jam setelah bayi lahir. Tujuan dilakukan KN 1 yaitu memberikan konseling perawatan bayi baru lahir, memastikan bayi sudah BAB dan BAK pemeriksaan fisik bayi baru lahir, mempertahankan suhu tubuh bayi, ASI eksklusif, pemberian vitamin K injeksi, dan pemberian imunisasi HB 0 injeksi. By.Ny. S di rawat gabung ke Ibu jam 15.00 WIB. Bayi sudah BAK , Vitamin K injeksi, salep mata dan Imunisasi HB 0 sudah diberikan saat di ruang perinatologi. Bayi Ny. S BAB di 24 jam pertamanya.

Pada hari ke-2 (KN 1) pada tanggal 01/02/2024 bayi Ny.S juga sudah mendapatkan skrining Hipotiroid kongenital di RS Budi Sehat Purworejo. Hal ini sudah sesuai dengan teori PMK No 78 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital dan PermenkesNo 21 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Skrining Hipotiroid Kongenital dilakukan dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi yang berusia minimal 48 sampai 72 jam dan maksimal 2 minggu oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan Kesehatan Ibu dan Anak (baik FKTP maupun FKRTL), sebagai bagian dari pelayanan neonatal esensial. Darah diambil sebanyak 2-3 tetes dari tumit bayi kemudian diperiksa di laboratorium. Apabila hasilnya positif, bayi harus segera diobati sebelum usianya 1 bulan agar terhindar dari kecacatan, gangguan tumbuh kembang, keterbelakangan mental dan kognitif. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktik.

Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke-3 sampai dengan hari ke-7 setelah bayi lahir. Tujuan dilakukan. KN 2 yaitu untuk menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering, menjaga kebersihan bayi, pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan masalah pemberian ASI, memberikan ASI pada bayi minimal 8 kali dalam 24 jam, menjaga keamanan bayi, dan menjaga suhu tubuh bayi.

KN 2 by.ny S dilakukan pada hari ke 4 (03-02-2024), pada pemeriksaan bayi diperoleh tali pusat belum puput dan tidak terdapat ikterus neonatorum. KIE yang diberikan adalah menjaga kehangatan bayi, menyusui on demand dan sesering mungkin, KIE perawatan tali pusat serta KIE tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir serta memberi KIE tentang pentingnya memberikan ASI kepada bayi dan kebutuhan ASI bayi.

Bagi neonatus, ASI merupakan satu-satunya sumber makanan dan minuman yang utama dengan nutrisi yang sebagian besar terkandung di dalamnya. ASI mengandung zat gizi yang sangat lengkap antara lain, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, factor pertumbuhan, hormone, enzim, dan zat kekebalan. Semua zat ini terdapat secara proporsional dan seimbang satu dengan lainnya. ASI merupakan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kebutuhan minum pada neonatus yaitu :

1. Hari ke 1 = 50-60 cc/kg BB/ hari
2. Hari ke 2 = 90 cc / kg BB/ hari
3. Hari ke 3 = 120 cc/ kg BB / hari
4. Hari ke 4 = 150 cc/ kg BB/hari
5. Dan untuk tiap harinya sampai 180-200 cc/kg BB/hari

Berikut kebutuhan bayi minum ASI sesuai dengan jadwal dan takarannya:

1. Bayi usia 1 hari: 7ml, 8-12 kali dalam sehari
2. Bayi usia 2 hari: 14ml, 8-12 kali konsumsi ASI dalam sehari
3. Bayi usia 3 hari: 25-38ml, 8-12 kali konsumsi ASI dalam sehari
4. Bayi usia 1 minggu: 45-60ml, 12 kali konsumsi ASI dalam sehari
5. Bayi usia 1 bulan: 80-150ml, 7-9 kali konsumsi dalam sehari
6. Bayi 6 bulan: 720ml, 5-6 kali konsumsi ASI
7. Bayi 1 tahun: 550ml, 5 kali konsumsi ASI

Kunjungan Neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir. Tujuan dilakukan KN 3 yaitu menjaga kebersihan bayi, memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, menjaga keamanan bayi, menjaga suhu tubuh bayi, dan

memberitahu ibu tentang Imunisasi BCG.

Berdasarkan pemeriksaan pada hari ke 8 (07-02-2024) saat KN 3 tali pusat bayi sudah puput dan tidak terdapat ikterus neonatorum. BB bayi saat ini 3900 gram. KIE yang diberikan adalah menjaga kehangatan bayi, menyusui on demand, KIE Imunisasi dan KIE tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Imunisasi BCG diberikan sebelum usia bayi 2 bulan. Pelaksanaan imunisasi BCG di Puskesmas Ngombol setiap rabu minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Waktu yang terdekat adalah tanggal 21 Februari 2024, akan tetapi ibu mengimunisasikan bayi di rabu minggu pertama yaitu tanggal 03 Maret 2024.

Hal tersebut sesuai dengan teori dan anjuran bahwa salah satu pencegahan Tuberkulosis (TB) yang dapat dilakukan sejak anak usia 0 adalah vaksin BCG (*Bacille Calmette-Guérin*) yang diberikan saat anak berusia 0-2 bulan sesuai rekomendasi IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Morika (2021) yang dilakukan di RSUD Dr.M Zein Painan oleh yang menemukan lebih dari separuh responden TB paru pada anak tidak mendapatkan vaksinasi BCG yaitu sebanyak 67 orang (67%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya hubungan status vaksinasi BCG dengan kejadian TB paru dengan angka p-value 0,012.⁹²

D. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas dan KB

Pada masa nifas Ny.S prosesnya berlangsung dengan normal dan tanpa kendala walaupun Ny. S menjalani persalinan dengan SC. Pada masa nifas, Ny. S mendapatkan asuhan kebidanan sebanyak 4 kali yaitu saat 6 jam post partum, 6 hari post partum, 2 minggu post partum dan 4 minggu post partum. Hal ini sesuai dengan kebijakan program nasional Kemenkes RI tahun 2020 yang menjelaskan bahwa kunjungan masa nifas dilakukan saat 6-8 jam post partum, 6 hari post partum, 2 minggu post partum dan 6 minggu post partum.⁹³

Asuhan nifas pada Ny. S dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada 6 jam

post partum (oleh bidan pihak Rumah Sakit), hari ke-4, hari ke 8 dan hari ke 30 post partum. Pada keempat pertemuan tanda-tanda vital dalam batas normal, involusi uterus berjalan sesuai teori dari hasil pemeriksaan yang bidan Rumah Sakit lakukan pada KF I TFU 2 jari di bawah pusat, KF II TFU 3 Jari bawah pusat, KF III TFU teraba pertengahan pusat simfisis dan KF IV TFU sudah tidak teraba. Hal ini sesuai dengan teori Sulfianti (2021) yang menjelaskan bahwa (tinggi fundus uteri) pada saat bayi lahir, fundus uteri setinggi pusat dengan berat 1000 gram, pada akhir kala III, TFU teraba 2 jari di bawah pusat, pada 1 minggu post partum, TFU teraba pertengahan pusat simpisis dengan berat 500 gram, pada 2 minggu post partum, TFU teraba di atas simpisis dengan berat 350 gram dan Pada 6 minggu post partum, fundus uteri mengecil (tidak teraba) dengan berat 50 gram.⁴⁴

Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil: Pertemuan pertama KF I lochea rubra, KF II lochea sanguinolenta, KF III lochea serosa dan KF IV lochea alba. Pengeluaran lochea Ny. S sesuai dengan teori Diane M (2015) dan Sulfianti (2021) yang menjelaskan bahwa Lochea rubra (cruenta) berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo, dan mekonium selama 2 hari pasca persalinan, Lochea sanguinolenta berwarna merah kuning berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 pasca persalinan, Lochea serosa, lochea ini bentuk serum dan berwarna merah jambu kemudian menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pasca persalinan. Dan Lochea alba dimulai dari hari ke-14, berbentuk seperti cairan putih serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua.^{43,44}

Kunjungan KF II pada nifas hari ke-4 (Tanggal 03/02/2024) didapatkan TD ibu 118/79 mmHg, Nadi :82 x/menit, Respirasi: 20 x/menit, Suhu: 36,5°C, Payudara: Simetris, Putting susu menonjol tidak lecet dan ASI (+) colostrum sedikit, TFU teraba 3 jari di bawah pusat, Luka SC masih sedikit terasa sakit, lochea rubra dan jumlah perdarahan

normal. Skrining *Edinburgh postnatal depression scale* (EPDS) nilainya 0 itu artinya ibu saat ini tidak ada depresi post partum.⁹⁴

Berdasarkan penelitian Farhan Kamali Adli (2022) EPDS sendiri memiliki sensitivitas 96% dan spesifisitas 82% dengan nilai cut off 10. Oleh karena itu, EPDS memiliki tingkat spesifisitas dan sensitivitas yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan skrining dan deteksi dini pada ibu yang baru melahirkan. Selain itu juga EPDS ini dapat menilai kejadian perubahan mood dengan rentan waktu yang cukup singkat, maka EPDS ini dapat mendeteksi secara dini pada ibu yang telah melahirkan dan tidak menunggu waktu yang lama dan memunculkan gejala yang semakin membahayakan bagi ibu.⁹⁴

Bidan memberikan KIE cara mengatasi keluhannya, mengajarkan ibu cara menyusui yang benar, mengevaluasi dan memperbaiki posisi menyusui, mengajarkan suami dan keluarga cara pijat oksitosin, KIE nutrisi pada ibu menyusui, KIE perawatan luka post SC.

Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Gizi seimbang pada saat menyusui merupakan sesuatu yang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Komponen-komponen di dalam ASI diambil dari tubuh ibu sehingga harus digantikan oleh makan makanan yang cukup pada ibu menyusui tersebut.⁹⁵

Kebutuhan gizi selama menyusui meliputi:

1. Karbohidrat

Saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu meningkat sebesar 65 gr per hari atau setara dengan 1 ½ porsi nasi.

2. Protein

Sangat diperlukan untuk peningkatan produksi air susu. Ibu menyusui membutuhkan tambahan protein 17 gr atau setara dengan 1 porsi daging

(35 gr) dan 1 porsi tempe (50gr).

3. Lemak

Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut lemak dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tumpeng gizi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok the minyak (20 gr). Lemak yang dipelukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh ganda seperti omega-3 dan omega-6.

4. Vitamin yang penting dalam masa menyusui adalah vitamin B1, B6, B2, B12, vitamin A, yodium & selenium.

Jumlah kebutuhan vitamin & mineral adalah 3 porsi sehari dari sayuran dan buah-buahan.

5. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan minum 2-3 liter air per hari atau lebih dari 8 gelas air sehari (12-13 gelas sehari). Terutama saat udara panas, banyak berkeringat dan demam sangat dianjurkan untuk minum >8 gelas sehari.

6. Waktu minum yang paling baik adalah pada saat bayi sedang menyusui atau sebelumnya, sehingga cairan yang diminum bayi dapat diganti. Kebutuhan cairan dapat diperoleh dari air putih, susu, jus buah-buahan dan air yang tersedia di dalam makanan.

Untuk meningkatkan produksi ASI bisa melakukan pijat oksitosin yang terbukti bisa meningkatkan produksi ASI, hal tersebut sesuai dengan penelitian Maryati (2023) bahwa setelah dilakukan intervensi yaitu pijat oksitosin produksi ASI menjadi meningkat. Hasil penatalaksanaan dengan pengaplikasian pijat oksitoksin selama 10 menit terbukti meningkatkan produksi ASI pada ibu Post partum.⁹⁶

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ade Triansyah et all (2021) yang menunjukkan bahwa pijat oksitosin dan perawatan payudara mempengaruhi peningkatan produksi ASI. Uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini memperoleh p-value, sebesar 0,016 yang berarti P kurang dari 0,05.⁹⁷ Ada dua proses payudara memproduksi air susu yaitu

produksi dan pelepasan. Melalui rangsangan pada puting susu ibu melalui mulut bayi atau pijatan pada punggung dari ibu, hormon oksitosin akan dilepaskan. Tujuan dari pijat oksitosin adalah agar ibu merasakan tenang dan rileks sehingga dapat meningkatkan rasa sayang terhadap bayinya dan merangsang pelepasan oksitosin, yang dapat mempercepat keluarnya ASI. Sementara itu, perawatan payudara akan merangsang laktifer (hormon prolaktin) untuk mempercepat produksi ASI juga. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan peningkatan produksi ASI melalui rangsangan sentuhan payudara dan punggung ibu yang akan merangsang produksi oksitosin yang mengakibatkan kontraksi sel-sel mioepitel.⁹⁷

Produksi ASI yang kurang atau lambat dapat menjadi penyebab ASI yang tidak mencukupi untuk bayinya. Selain hormon prolaktin, proses laktasi juga bergantung pada hormon oksitosin, yang dilepaskan dari hipofisis posterior sebagai reaksi terhadap hisapan puting susu. Oksitosin mempengaruhi sel-sel mioepitel yang mengelilingi alveoli mammae sehingga alveoli berkontraksi dan mengeluarkan ASI yang telah dikeluarkan kelenjar Mammae. Refleksi oksitosin tersebut dipengaruhi oleh psikologi ibu. Jika ada kecemasan, stres, dan keraguan, maka keluarnya ASI bisa terhambat. Jadi itu salah satu upayanya untuk menjaga hormon oksitosin dengan memberikan pijatan punggung yang bisa membuat ibu merasa nyaman dan rileks.⁹⁸

Kunjungan KF III pada nifas hari ke-8 (Tanggal 07/02/2024) didapatkan TD ibu 112/69 mmHg, Nadi :83 x/menit, Respirasi: 20 x/menit, Suhu: 36.6oC, Payudara: Simetris, Puting susu menonjol tidak lecet dan ASI (+) produksi sudah banyak daripada saat hari ke-4, TFU teraba pertengahan pusat simfisis, Luka SC sudah tidak sakit dan sudah kering (Ny.S sudah kontrol ke Rumah Sakit dan perban sudah dilepas), lochea serosa dan jumlah perdarahan normal. Bidan memberikan KIE cara mengatasi keluhannya, mengevaluasi dan memperbaiki posisi menyusui, menganjurkan suami dan keluarga untuk melakukan pijat oksitosin agar ASI tetap lancar, KIE nutrisi pada ibu menyusui.

Penatalaksanaan yang bidan lakukan adalah memberikan KIE cara mengatasi keluhannya, mengevaluasi dan memperbaiki posisi menyusui, menganjurkan suami dan keluarga untuk melakukan pijat oksitosin agar ASI tetap lancar, KIE nutrisi pada ibu menyusui. Penatalaksanaan yang bidan berikan sudah sesuai dengan teori yaitu ibu diberikan edukasi tentang nutrisi ibu menyusui dan menganjurkan untuk tetap melakukan pijat oksitosin untuk meningkatkan produksi ASI nya.

Pijat oksitosin adalah pijat yang dilakukan di sepanjang tulang belakang (vertebrae) sampai costae kelima atau keenam.⁹⁹Melalui pemijatan pada tulang belakang, neurotransmitter akan merangsang medulla oblongata langsung mengirim pesan ke hipotalamus untuk mengeluarkan oksitosin. Dengan pijat oksitosin ini juga akan relaksasi ketegangan dan menghilangkan stress serta meningkatkan rasa nyaman.¹⁰⁰ Saat ibu merasa nyaman atau rileks, tubuh akan mudah melepaskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin diproduksi oleh kelenjar hipofisis posterior. Setelah diproduksi oksitosin akan memasuki darah kemudian merangsang sel-sel mioepitel yang mengelilingi alveolus mammae dan duktus laktiferus. Kontraksi sel-sel mioepitel mendorong ASI keluar dari alveolus mammae melalui duktus laktiferus menuju ke sinus laktiferus dan disana ASI akan disimpan. Pada saat bayi menghisap puting susu, ASI yang tersimpan di sinus laktiferus akan tertekan keluar ke mulut bayi.¹⁰⁰ Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Setiowati pada tahun 2017, menyatakan ibu post partum setelah diberikan pijat oksitosin mempunyai produksi ASI yang lancar.

Hal ini juga didukung dan sesuai dengan jurnal penelitian oleh Ade Triansyah et all (2021) yang menunjukkan bahwa pijat oksitosin dan perawatan payudara mempengaruhi peningkatan produksi ASI. Uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini memperoleh p-value, sebesar 0,016 yang berarti p-value kurang dari 0,05.⁹⁷

KF IV pada nifas hari ke 30 yaitu tanggal 29/02/2024 dilakukan kunjungan rumah. Skrining *Edinburgh postnatal depression scale* (EPDS)

nilainya 0 itu artinya ibu saat ini tidak ada depresi post partum. Pada KF 4 ini ibu diberi KIE tentang perawatan bayi, nutrisi ibu, ASI Eksklusif dan Pemberian konseling KB pascasalin. Berdasarkan hasil konseling sejak saat hamil Ny.S yang berusia 37 tahun dan sudah memiliki 2 anak yang berusia 15 tahun dan yang terkecil berusia 10 tahun berencana memakai KB MOW bersamaan operasi SC dengan alasan merupakan kontrasepsi mantap dan karena faktor resiko umur serta Ny.S sudah tidak ingin mempunyai anak dan tidak mempengaruhi produksi ASI.

Hal tersebut di dukung oleh penelitian dari Ainul Maghfiroh et all (2019) Pemilihan metode kontrasepsi bedah wanita berhubungan langsung dan positif dengan pengetahuan yang baik, sikap positif, persepsi kesetaraan gender yang baik, efikasi diri yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dukungan suami yang kuat, bekerja di luar rumah, jumlah anak yang masih hidup lebih dari 3, dan usia ibu lebih dari 35 tahun. Pemilihan metode kontrasepsi bedah wanita berhubungan langsung dan positif dengan pengetahuan baik ($b= 1.91$; CI 95%= 0.80 hingga 3.02; $p= 0.001$), sikap positif ($b= 1.56$; CI 95%= 0.45 hingga 2.66; $p= 0.006$), persepsi kesetaraan gender baik ($b= 1.25$; 95% CI= 0.18 hingga 2.32; $p= 0.021$), efikasi diri tinggi ($b= 1.61$; 95% CI= 0.48 hingga 2.74; $p= 0.005$), pendidikan tinggi ($b= 1.18$; 95% CI= 0.02 hingga 2.35; $p= 0.045$), dukungan suami yang kuat ($b= 1.24$; 95% CI= 0.14 hingga 2.39; $p= 0.027$), bekerja di luar rumah ($b= 1.14$; 95% CI= 0.06 hingga 2.21; $p= 0.037$), jumlah anak hidup >3 ($b= 1.74$; 95% CI= 0.61 hingga 2.88; $p= 0.003$), dan usia ibu >35 tahun ($b= 1.57$; 95% CI = 0,34 hingga 2,75; $p= 0,012$).¹⁰¹

Menurut Prawirohardjo (2015) MOW merupakan metode kontrasepsi untuk perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi, MOW termasuk metode efektif dan tidak menimbulkan efek samping jangka panjang.

Menurut Prawirohardjo (2015) syarat-syarat untuk menjadi akseptor MOW yaitu sukarela, bahagia dan syarat medik. Setelah syarat sukarela terpenuhi belum berarti mereka dapat melakukan MOW. Nilai ukur bahwa

keluarga tersebut adalah keluarga bahagia pun harus dipenuhi pula. Nilai ukur ini dapat diketahui bahwa suami dan istri ini terikat dalam perkawinan yang sah, harmonis dan telah mempunyai sekurang-kurangnya dua orang anak hidup. Dengan umur anak terkecil 2 tahun dan umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun. Setelah syarat bahagia ini terpenuhi, syarat medis kemudian dipertimbangkan termasuk pemeriksaan fisik dan, ginekologik dan laboratorium. Hal ini sesuai dengan teori bahwa ibu dan suami sudah mantap dengan jumlah keluarga yang dimiliki.

E. Analisis

Berdasarkan pengkajian data subjektif dan objektif yang dilakukan ditemukan terdapat 2 permasalahan yaitu ibu hamil dengan risiko sangat tinggi yaitu usia lebih dari 35 tahun dan presentasi bokong. Kemudian dilakukan Analisa untuk masalah prioritas sehingga ditegakkan diagnosa kebidanan Ny.S usia 37 tahun G3P2A0Ah2 hamil 36 minggu 4 hari dengan faktor resiko umur dan presentasi bokong serta tidak ditemukan masalah potensial sehingga tidak perlukan tindakan segera.

Dari pengkajian data diatas, analisis dari kasus tersebut adalah:

1. Kehamilan

- a. Ny. S Usia 37 tahun G3P2A0Ah2 hamil 36 minggu 4 hari dengan faktor resiko umur dan presentasi bokong
- b. Ny. S Usia 37 tahun G3P2A0Ah2 hamil 37 minggu 5 hari dengan faktor resiko umur dan presentasi bokong
- c. Ny. S Usia 37 tahun G3P2A0Ah2 hamil 39 minggu 1 hari dengan faktor resiko umur dan presentasi bokong

2. Persalinan dan Bayi Baru Lahir

- a. Ny. S Usia 37 tahun G3P2A0Ah2 hamil 40 minggu dengan persalinan SC
- b. By. Ny. S umur 6 jam dengan bayi baru lahir normal

3. Nifas dan Neonatus

- a. Ny. S Usia 37 tahun P3A0Ah3 Post SC dengan nifas 6 jam

- b. Ny. S Usia 37 tahun P3A0Ah3 Post SC dengan nifas 4 hari
- c. By.Ny. S umur 4 hari dengan neonatus normal
- d. Ny S Usia 37 tahun P3A0Ah3 Post SC dengan nifas 8 hari normal
- e. By.Ny.S umur 8 hari dengan neonatus normal
- f. Ny. S Usia 37 tahun P3A0Ah3 Post SC nifas 30 hari dengan akseptor KB MOW

F. Penatalaksanaan

Rencana tindakan atau penatalaksanaan merupakan pengembangan rencana asuhan yang menyeluruh dan ditentukan oleh langkah – langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Rencana harus mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek kesehatan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bidan dan klien).

Langkah- langkah asuhan kebidanan berkesinambungan Ny. R yang dilakukan yaitu :

1. Kehamilan Kunjungan I
 - a. Melakukan informed consent
 - b. melakukan pengkajian data subjektif serta objektif dan menentukan prioritas masalah
 - c. Jelaskan hasil pemeriksaan
 - d. Berikan KIE tentang faktor resiko kehamilan dengan umur lebih dari 35 tahun
 - e. Berikan KIE tentang sesak yang dialami ibu dan cara mengatasinya
 - f. KIE tentang tanda bahaya dalam kehamilan
 - g. KIE tentang presentasi bokong dan teknik kneecest
 - h. KIE tentang pola makan seimbang
 - i. KIE tentang P4K
 - j. Anjuran mengkonsumsi Tablet Fe dan Kalsium
 - k. Anjuran kontrol ulang 1 minggu lagi atau apabila ada keluhan
 - l. Lakukan pendokumentasian

2. Kehamilan Kunjungan II dan III
 - a. Jelaskan hasil pemeriksaan
 - b. Anjuran pola makan seimbang
 - c. KIE tentang MOW
 - d. KIE tentang Persiapan persalinan
 - e. KIE untuk melakukan USG ke dokter Sp.OG
 - f. lakukan pendokumentasian
3. Persalinan
 - a. Anjuran untuk mobilisasi dan posisi yang nyaman pada ibu
 - b. KIE tentang teknik relaksasi
 - c. Observasi ibu via WA
4. Nifas
 - a. Jelaskan hasil pemeriksaan
 - b. KIE mobilisasi post SC
 - c. KIE teknik relaksasi
 - d. KIE Nutrisi dan kebutuhan gizi ibu nifas dan menyusui
 - e. KIE tentang teknik menyusui yang benar
 - f. KIE perawatan payudara, KIE Pijat Oksitosin
 - g. KIE istirahat yang cukup
 - h. Anjuran terapi yang harus diminum
 - i. KIE tentang tanda bahaya masa nifas
 - j. KIE tentang *personal hygiene*
 - k. KIE perawatan bayi dirumah
 - l. Jadwal kunjungan rumah berikutnya
 - m. Lakukan pendokumentasian
5. Neonatus
 - a. Jelaskan hasil pemeriksaan
 - b. KIE tentang perawatan bayi, KIE perawatan tali pusat
 - c. KIE tentang tanda bahaya BBL
 - d. KIE tentang personal hygiene bayi
 - e. Anjuran ASI Eksklusif

- f. KIE kebutuhan minum ASI bayi
- g. KIE tentang imunisasi dasar lengkap
- h. Jadwal kunjungan ulang
- i. Lakukan pendokumentasian

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Bidan melakukan asuhan kebidanan selama kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, neonatus dan KB pada Ny. S yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2024 sampai tanggal 12 Maret 2024 yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. S dilaksanakan sesuai dengan teori dan prosedur di lapangan. Asuhan kebidanan kehamilan dilakukan berdasarkan asuhan komprehensif dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan serta sudah didokumentasikan menggunakan SOAP. Pemeriksaan Antenatal care dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 10 Januari 2024 sampai 24 Januari 2024 dengan hasil Ny. S dengan faktor resiko kehamilan presentasi bokong dan faktor resiko umur.
2. Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir (BBL) pada Ny. S dilaksanakan sesuai dengan teori dan prosedur di lapangan serta berdasarkan asuhan komprehensif yang dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan serta sudah didokumentasikan menggunakan SOAP. Pada tanggal 30 Januari 2024 diperoleh data objektif dan subjektif dari buku KIA Ny.S dan hasil wawancara. Ny. S melahirkan dengan cara SC metode ERACS di RS Budi Sehat Purworejo. Bayi lahir tanggal 30 Januari 2024 Pukul 08.08 WIB berjenis kelamin perempuan lahir, menangis kuat dengan berat 3.900 gr dan panjang badan 52 cm. Bayi diobservasi di ruang perinatologi dan baru dilakukan rawat gabung dengan ibu pada 30/01/2024 pada pukul 15.00 wib, dan ibu serta bayi diizinkan pulang kerumah pada hari rabu 01/02/2024 siang. Kemudian kunjungan rumah dilanjutkan sampai usia By.Ny.S 8 hari pada tanggal 07 Februari 2024. Pemantauan proses persalinan dan BBL tidak ditemukan kelainan atau komplikasi.

3. Asuhan kebidanan nifas pada Ny. S dilaksanakan sesuai dengan teori dan prosedur di lapangan serta berdasarkan asuhan komprehensif yang dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan serta sudah didokumentasikan menggunakan SOAP. Pemantauan dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai 29 Februari 2024. Pemantauan masa nifas dilakukan 4x tidak ditemukan kelainan atau komplikasi.
4. Asuhan kebidanan neonatus pada By. Ny. S dilaksanakan sesuai dengan teori dan prosedur di lapangan serta berdasarkan asuhan komprehensif yang dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan serta sudah didokumentasikan menggunakan SOAP. Pemantauan dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai 07 Februari 2024. Pemantauan masa neonatus dilakukan 3x tidak ditemukan kelainan atau komplikasi.
5. Asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny.S dilaksanakan sesuai dengan teori dan prosedur di lapangan serta berdasarkan asuhan komprehensif yang dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan serta sudah didokumentasikan menggunakan SOAP. Berdasarkan hasil konseling sejak saat hamil Ny.S yang berusia 37 tahun dan sudah memiliki 2 anak yang berusia 15 tahun dan yang terkecil berusia 10 tahun berencana memakai KB MOW bersamaan operasi SC dengan alasan merupakan kontrasepsi mantap dan karena faktor resiko umur serta Ny.S sudah tidak ingin mempunyai anak dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Ny.S telah dilakukan SC dan MOW di RS Budi Sehat Purworejo pada tanggal 30 Januari 2024.

B. Saran

1. Bagi Ibu dan Keluarga

Diharapkan mampu mempersiapkan masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB yang sehat dan aman serta mampu menambah pengetahuan ibu dalam melakukan deteksi dini penyulit yang mungkin

timbul pada masa hamil, bersalin, bayi baru lahir dan nifas, sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi.

2. Bagi Mahasiswa

Lebih memperdalam pengetahuan tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus sampai keluarga berencana sehingga dapat membandingkan antara teori dengan kasus yang terjadi di lapangan serta bisa memberikan pelayanan kebidanan sesuai standar dan komprehensif.

3. Bagi Bidan di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo

Meningkatkan pengetahuan tentang komplikasi dini pada ibu hamil, untuk meningkatkan program yang telah disusun oleh pemerintah serta meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dengan memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif sesuai standar pelayanan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
2. Saifuddin. ,A. B. Ed. Ilmu Kandungan. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014.
3. Kementerian Kesehatan RI.2021. Profil kesehatan indonesia. 2021;
4. Dinkes. Provinsi Jawa Tengah. 2022. Profil Kesehatan Provinsi Jawa TengahTahun 2021.
5. Nuraisya W. Deteksi Risiko Tinggi Kehamilan Pada Pelayanan ANC Terpadu di Puskesmas Bendo Kabupaten Kediri. *J Kesehat Andalas*. 2018;7(2):240.
6. Londero AP, Rossetti E, Pittini C, Cagnacci A, Driul L. Maternal age and the risk of adverse pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2019;19(1):1–10.
7. Sofian A. Sinopsis Obstetri Edisi 3. Jakarta: EGC; 2012.
8. Manuaba. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB Untuk Pendidikan Bidan.2 ed. Jakarta: EGC; 2013.
9. Sulistiani A, Setyaningsih A. Pengaruh Penyuluhan Media Video Terhadap Peningkatkan Pengetahuan dan Sikap Tentang Kontrasepsi Intra Uterine Devices (Iud) Pada Pasangan Usia Subur. *J*.
10. Astuti ED. Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa Kebidanan Paska Praktik Klinik Kebidanan Continuity Of Care (Coc. *J*.
11. Sandall J, Tribe RM, Avery L. Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. *Lancet*. 392(10155):1349–1357.
12. Barokah L, Agustina SA, Zolekhah D. Pengaruh Continuity of Care Terhadap Persalinan. *Media Publ Promosi Kesehat Indones*. 5(3):272–275.
13. Ningsih DA. Continuity of Care Kebidanan. *OKSITOSIN J Ilm Kebidanan*. 2017;4(2):67–77.
14. Astuti S, Indra Susanti A, Nurparidah R, Mandiri A. Asuhan Ibu Dalam Masa Kehamilan. Erlangga;
15. Pangesti WD. Adaptasi Psikologis Ibu Hamil Dalam Pencapaian Peran Sebagai Ibu Di Puskesmas Kembaran Ii Kabupaten Banyumas. *Viva Med J Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan*. 11(2):13–21.
16. Hadijah S, Hidayati H, Indriani I, Amin W. Penyuluhan dengan media

audiovisual memengaruhi tingkat pengetahuan ibu tentang kebutuhan dasar ibu hamil. *J Kebidanan Malakbi*. 2(2):46–51.

17. Nurlitawati ED, Aulya Y, Widowati R. Efektivitas Senam Hamil terhadap Penurunan Nyeri Punggung pada Kehamilan Trimester III di RSUD Ciawi. *J Akad Baiturrahim Jambi*. 11(2):237–242.
18. Mutoharoh S, Indrayani E. Efektivitas Birth Ball Selama Kehamilan Terhadap Lama Persalinan. Penerbit LeutikaPrio;
19. Sutanto AV da. YF. Asuhan Pada Kehamilan. Pustaka Baru Press;
20. Kemenkes RI. Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di Era Adaptasi Baru. 2020. 98 p.
21. Kementrian. Kesehatan RI. Permenkes No 21 tahun 2021.
22. Walyani ES. Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Pustaka Baru Press; 2014.
23. Kemenkes RI. Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di Era Adaptasi Baru. 2020.
24. Manuaba I (2012). Ilmu Kesehatan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana. Jakarta : EGC.
25. Indrawati. Tinjauan Karakteristik Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Waara Kabupaten Muna Tahun 2016.
26. Hastuti PH, Suparmi S, Sumiyati S, Widiastuti A, Yuliani DR. Kartu Skor Poedji Rochjati Untuk Skrining Antenatal. *Link*. 2018;14(2):110–113.
27. Rochjati P. Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil (Edisi 2): Pengenalan Faktor Risiko Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi. Airlangga university press; 2011.
28. Rochjati P. Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil. Airlangga University Press, Edisi 2, 43. 2011;
29. Ummi, dkk. Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Fisiologis. Jakarta : Salemba Medika. 2011;
30. Maryunani, Anik dkk. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Jakarta: Trans Info Media. 2013;
31. Cunningham, Fg, et.al. Obstetri Williams Edisi 23. Vol 2. Penerbit Buku Kedokteran Egc: Jakarta; 2013.
32. Kurniarum A. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Pusdik SDM Kesehatan. 2016.
33. Rosad S. Asuhan Kebidanan Kehamilan. 2020.

34. Oxorn H, Forte R, W. Ilmu Kebidanan : Patologi dan Fisiologi Persalinan. Yayasan Essent Medica. 2015;
35. Mochtar R. Sinopsis Obstetri. Jakarta: EGC. 2012;
36. Varney H, King TL, Brucker MC, Kriebs JM, Fahey JO, Midwifery GCLV. No Title. Fifth. Burlington: Jones and Bartlett Learning;
37. Vivian, Nanny. Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Jakarta: Salemba Medika. 2011;
38. Varney, Hellen (et.all).Buku Ajar Asuhan Kebidanan Edisi 4 Volume 1. Jakarta : EGC. 2014;
39. Wahyuningsih HP. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Cetakan I. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018.
40. Saleha, Siti. 2013. Asuhan kebidanan pada masa nifas. Jakarta : Salemba Medika.
41. Lina Fitriani SSTMK, Sry Wahyuni SSTMK. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Deepublish.2021; 2021.
42. D SRFK. Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice.Deepublish.2017.
43. Diane M, F. Buku Ajar Kebidanan. 2015.
44. Sulfianti S. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas.Yayasan Kita Menulis.2021.
45. Chan, A. W., Reid, C., Skeffington, P., & Marriott, R. A systematic review of EPDS cultural suitability with Indigenous mothers: a global perspective. Archives of women's mental health. 2021;24(3), 353.
46. Bloch M, Rotenberg N, koren D, Klein E. Risk Factors For Early Postpartum Depressive Symptoms. General Hospital Psychiatry. 2006; 28: 3-8.
47. Gaynes BN. et al. Perinatal depression: prevalence, screening accuracy, and screening outcomes. Agency for Healthcare Research and Quality.2005 (AHRQ Publication No. 05- E006-2): p. 1-101.
48. Tindaon RL da. SP. Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Post Partum Normal Tentang Tehnik Menyusui Yang Benar Di Klinik Sunggal Tahun 2017". UNPRI J Matern Kebidanan. 2018;3(1.2018).
49. Muawanah DTsn. Hubungan Asupan Serat Dan Cairan Dengan Kejadian Konstipasi Pada Ibu Pasca Melahirkan". J Media Gizi Indones. 2016;11(1):101–105.
50. Dewi M. The Influence of Early Ambulation; Pelvic Floor Muscle Training on Prevention of Defecation Disorder Post Partum". Indones J Issues

Midwifery Vol. 1(1):58–64.

51. Dewi M. The Influence of Early Ambulation ‘Pelvic Floor Muscle Training’ on Prevention of Defecation Disorder Post Partum. *J Issue Midwifery*. 01:58–64 2017.
52. Aisyaroh IN. Efektifitas Kunjungan Nifas Terhadap Pengurangan Ketidaknyamanan Fisik Yang Terjadi Pada Ibu Selama Masa Nifas. *Jurnal Ganeva: Who Press*; 2010. 23–37 p.
53. Cunningham FG e. al. *Obstetri Williams Edisi 23*. Jakarta: EGC; 2012.
54. RI KK. *Profil Kesehatan Indonesia*. 2018.
55. Yuliana W, Hakim BN. *Emodemo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Yayasan Ahmar Cendekia Indones. 2020;
56. Khasanah, N A SW. *Asuhan Nifas dan Menyusui*. E-b Penerbit STIKes Majapahit; 2017. p. 1–177.
57. Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. Bina Pustaka. 2016;
58. Sukma F, SN. *EHA KPMN. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Kedokt dan Kesehat Univ Muhammadiyah*. 2017;
59. Marmi, Rahardjo K. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015.
60. A K. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Pusdik SDM Kesehatan. 2016;
61. Setiani A. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah*. Pusdik SDM Kesehatan. 2016; 2016.
62. Andriani F. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi dan Balita*. Indomedika Pustaka; 2019.
63. Maternity D, Dwi Anjani A, Evrianasari N. *Asuhan kebidanan Neonatus, Bayi Balita dan Anak Prasekolah*. CV Andi Offset. 2018.
64. Damanik RK. *Hubungan Perawatan Tali Pusat Dengan Kejadian Infeksi Pada Bayi Baru Lahir di RSUD Dr. Pirngadi Medan 2019*. 2019;
65. Hutagaol HS, EY ED. *Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap Suhu dan Kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir*. 2014.
66. Fauziah. *Praktik Asuhan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. In: Pena Persada 1–1122020.
67. D. IBSM. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. Buku Kedokteran. EGC; 2014.

68. Indonesia U, Yang F-F, Dengan Penggunaan B, Kontrasepsi M, Panjang J. Lampiran 3. 2012;
69. Pinem S. Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi. Jakarta: Trans Info Media. 2009;
70. Meilani N. Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Fitramaya. 2010;
71. Rivaldi. Rivaldi MA. Determinan Pemanfaatan Penggunaan KB MKJP Di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala. Kecamatan Medan Tembung. 2018.
72. Humaira N, Sidharti L, Yonata A. ERACS Sebagai Metode Mobilisasi Dini Pada Pasien Sectio Caesarea. *Agromedicine*. 9:64–68 2022.
73. Huang J, Cao C, Nelson G, Wilson RD. A Review of Enhanced Recovery After Surgery Principles Used for Scheduled Caesarean Delivery. *J Obs Gynaecol Canada*. 41:1775–1788 2019.
74. UU No 4 Tahun 2019 Kebidanan. Vol. KEBIDANAN, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. 2019. 2019;
75. RI KK. Permenkes RI No 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Vol. 01, Kementerian Kesehatan RI. 2017. p. 1–7.
76. Bayrampour H, Heaman M, Duncan KA, Tough S. Advanced Maternal Age and Risk Perception: a Qualitative Study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2012;12(100).
77. Manuaba IBG. Kapita selekta penatalaksanaan rutin obstetri, ginekologi, dan KB. Egc. 2001;
78. Kementerian Kesehatan. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Direktur Jendral Bina Gizi dan KIA, editor. Jakarta; 2020.
79. Lathifah NS. Hubungan Kenaikan Berat Badan Ibu Selama Hamil Terhadap Berat Badan Bayi Saat Lahir Di Bps Wirahayu Panjang Bandar Lampung. *J Ilmu Kedokt dan Kesehat*. 2019;6(4):274–9.
80. Prabayukti A. Kekurangan Energi Kronis Pada Kehamilan. *J Chem Inf Model*. 2019;53:21–25.
81. Irianti B, Mutiara E. Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti. Sagung Seto; 2014.
82. Duffy CR, Moore JL, Saleem S, Tshefu A, Bose CL, Chomba E, et al. Malpresentation in Low and Middle-income Countries Associations with Perinatal. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2019;98(300).
83. Giri A, Srivastav VR, Suwal A, Tuladhar AS. Advanced maternal age and obstetric outcome. *Nepal Med Coll J*. 2013 Jun;15(2):87–90.
84. Mochtar R (2013). Sinopsis Obstetri Fisiologi dan Patologi edisi 2. EGC :

Jakarta.

85. Azward H, Ramadhany S, Pelupessy N, Usman AN, Bara FT. Prenatal yoga exercise improves sleep quality in the third trimester of pregnant women. *Gac Sanit.* 2021;35:258– 262.
86. Musyahida. Hubungan Asfiksia Neonatorium Dan Fraktur Clavikula Dengan Persalinan Pervaginam Letak Sungsang. *Jurnal Fenomena Kesehatan* 2 (1), 208-214.2019.
87. Hasliani A. Penanganan Persalinan Presentasi Bokong Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Pertiwi. *jkv* [Internet]. 2017Jun.7 [cited 2024Apr.16];2(1):18-21. Available from: <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jkv/article/view/32>.
88. Habib AS, Ituk U. Enhanced recovery after cesarean delivery [version 1; referees: 2 approved. p. 1–11 2018.
89. Sultan P. Impact Of Enhanced Recovery After Cesarean Delivery On Maternal Outcomes: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Anaesth Crit Care Pain Med.* 40:100935 2021.
90. Bari SA, Rachimhadhi T, H. G, Wiknjosastro. Ilmu Kebidanan. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2016.
91. Rudolph. A. M. Buku Ajar Pediatri Rudolph (Volume1). Jakarta EGC. 2015;
92. Morika HD, Nur SA, Sari IK & Fauziah O. Hubungan Vaksinasi BCG dengan Kejadian TB paru di Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Medika Sainatika.* 2021;12(1):205-214.
93. Suherni. Perawatan Masa Nifas. *Fitramaya.*2009.
94. Kamali Adli F. Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS): Deteksi Dini dan Skrining Depresi Post-partum Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS): Early Detection and Screening Post-partum Depression. *J Kesehat* [Internet]. 2022;13(2):430–5. Available from: <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>
95. RI KK. Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI: Direktorat Bina Gizi. 2014;
96. Maryati, Anggriani Y, Wasirah S, Ariani Program Studi Pendidikan Profesi Bidan L, Kesehatan F, Aisyah Pringsewu U, Yani No JA, et al. Pijat Oksitosin Pada Ibu Nifas Untuk Peningkatan Produksi Asi. *J Ilm Permas J Ilm STIKES Kendal* [Internet]. 2023;13(4):1503–10. Available from: <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>
97. Triansyah A. The Effect Of Oxytocin Massage And Breast Care On The Increased Production Of Breast Milk Of Breastfeeding Mothers In The

Working Area Of The Public Health Center Of Lawanga Of Poso District. *Gac Sanit.* 35:168– 170 2021.

98. Azriani D, Handayani S. The effect of oxytocin massage on breast milk production. *J Dama Int Res.* 2016;1:47– 50.
99. Mintaningtyas SI, Isnaini YS. *Pijat Oksitosin untuk Meningkatkan Produksi ASI Eksklusif.* Penerbit NEM; 2022.
100. Maita, L. Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Produksi ASI. *J. Penelit. Kesehat. Suara Forike VII,* 173–175. 2016;
101. Maghfiroh A, Budihastuti UR, Nurhaeni IDA. Path Analysis on Factors Affecting the Choice of Female Surgical Contraceptive Method in Kendal, Central Java. *J Matern Child Heal.* 2019;4(3):146–57.

Lampiran I SOAP Kasus dan Catatan Perkembangan

PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
Jalan Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 55143 Telp (0274) 374331

ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN PADA KUNJUNGAN I

Ny. S Usia 37 Tahun G3P2A0AH2 Usia Kehamilan 36⁺⁴ Minggu dengan
Presentasi Bokong dan Faktor Resiko Umur di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo

Tanggal pengkajian/Jam : 10 Januari 2024 / 16.00 WIB

Data Subyektif

1. Identitas

Biodata	Istri	Suami
Nama	: Ny S	Tn. R
Umur	: 37 tahun	42 tahun
Pendidikan	: SMK	SMP
Pekerjaan	: IRT	Wiraswasta
Agama	: Islam	Islam
Suku/ Bangsa	: Jawa/ Indonesia	Jawa/ Indonesia
Alamat	: Rasukan,Ngombol, Purworejo	

2. Alasan Kunjungan

Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya.

3. Keluhan Utama

Ibu mengatakan merasa cemas menghadapi persalinan karena posisi bokong bayi berada di bawah dan mengeluh terkadang sesak napas dan nyeri perut bagian bawah.

4. Riwayat Menstruasi

Menarche	: 12 tahun	Siklus	: 28 hari
Lama	: 7 hari	Teratur	: Teratur
Sifat Darah	: Cair (khas menstruasi)	Keluhan	: Tidak ada

5. Riwayat Perkawinan

Status pernikahan : Menikah Menikah ke : Pertama

Lama : 16 tahun Usia menikah pertama kali : 21 tahun

6. Riwayat Obstetrik : G₃P₂A₀Ah₂

Hamil Ke	Persalinan						Nifas		
	Tahun	Umur kehamilan	Jenis Persalinan	Penolong	Komplikasi	JK	BB Lahir	Laktasi	Komplikasi
1	28-03-2008	9 bln	Vakum Ekstraksi	Dokter	-	P	3300	iya	Tidak ada
2	12-09-2014	9 bln	spontan	bidan	-	P	3400	iya	Tidak ada
3	Hamil ini								

7. Riwayat kontrasepsi yang digunakan

No	Jenis Kontrasepsi	Mulai memakai				Berhenti/ Ganti cara			
		Tgl/Bln/Th	Oleh	Tempat	Keluhan	Tgl/Bln/Th	Oleh	Tempat	Alasan
1	Kondom	2009	Bidan	PMB	t.a.k	2012	Bidan	PMB	Ingin hamil lagi
2	IUD	2014	Bidan	PMB	t.a.k	2022	Bidan	PMB	Ingin hamil lagi

8. Riwayat Kehamilan sekarang

a. HPHT :23-04-20223 HPL : 30-01-2024 Uk: 36 minggu 4 hari

b. ANC pertama usia kehamilan : 8 minggu

c. Kunjungan ANC

No	TM	Frekuensi	Tempat	Keluhan	Terapi
1	I	2 kali	Puskesmas Tulungagung	Pusing, mual	Asam folat, B6
2	II	3 kali	Puskesmas Ngombol, PMB Setyo Ari Susanti	Tidak ada	Tablet tambah darah, Vitamin C, Kalsium
3	III	5 kali	Puskesmas Ngombol, PMB Setyo Ari Susanti, RS Budi Sehat Purworejo	Terkadang sesak napas dan nyeri perut bagian bawah	Tablet tambah darah, Kalk

d. Imunisasi TT : TT 5

e. Pergerakan Janin dalam 12 jam (dalam sehari) : Lebih dari 10 kali

9. Riwayat Kesehatan

- a. Ibu mengatakan tidak sedang/pernah menderita penyakit jantung, TBC, ginjal, DM. Ibu belum pernah menjalani operasi, dan tidak memiliki alergi apapun baik makanan maupun obat.
- b. Ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada yang sedang/pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, asma, DM, ginjal, maupun TBC

10. Pola Pemenuhan Kebutuhan sehari-hari

	Sebelum Hamil	Setelah Hamil
a. Pola Nutrisi		
1) Makan		
Frekuensi	: 3 x/hari	3 x/hari
Porsi	: 1 piring	1 piring
Jenis	: nasi, sayur, lauk	Nasi, sayur, lauk
Keluhan	: tidak ada	Tidak ada
Alergi makanan	: tidak ada	Tidak ada
2) Minum		
Frekuensi	: 5-6x/hari	Frekuensi : 8-9x/hari
Porsi	: 1 gelas	Porsi : 1 gelas
Jenis	: air putih, teh	Jenis : air putih, susu
Keluhan	: tidak ada	Keluhan : tidak ada
b. Eliminasi		
1) BAB		
Frekuensi	: 1x/hari	Frekuensi : 1x/hari
Konsistensi	: Lunak	Konsistensi : Lunak
Warna	: Khas	Warna : Khas
Keluhan	: tidak ada	Keluhan : tidak ada
2) BAK		
Frekuensi	: 5-6x/hari	Frekuensi : 6-8x/hari
Warna	: Khas	Warna : Khas
Keluhan	: tidak ada	Keluhan : tidak ada
c. Istirahat		
Tidur Malam		
Lama	: 6-7 jam/hari	7 jam/hari
d. Personal Hygiene		
Mandi	: 2 x/hari	2 x/hari
Ganti pakaian	: 2 x/hari	2 x/hari
Gosok gigi	: 2 x/hari	2x/hari
e. Pemenuhan Seksualitas		
Frekuensi	: 2-3 x/minggu	1x/minggu
Keluhan	: tidak ada	Tidak ada
f. Pola aktifitas (terkait kegiatan fisik, olah raga)		
	Ibu mengatakan melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah.	

11. Kebiasaan yang mengganggu kesehatan (merokok, minum jamu, minuman beralkohol)

Ibu mengatakan tidak mempunyai kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan seperti merokok, minum jamu, minuman beralkohol. Suami juga tidak merokok maupun minum minuman keras.

12. Psikososiospiritual:

Ibu dan suami sangat senang dengan kehamilan ibu. Kehamilan ini merupakan kehamilan yang ketiga dan ibu sudah menantikan kehamilannya. Ibu sangat senang dengan kehamilannya. Suami sangat mendukung ibu.

Ibu berhubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Ibu beragama Islam dan beribadah sholat 5 waktu/hari.

Ibu berencana melahirkan di RS Budi Sehat Purworejo

Ibu berencana merawat bayinya dengan dibantu oleh keluarga dan akan memberikan ASI eksklusif.

Ibu dan suami akan menggunakan BPJS saat melahirkan.

13. Pengetahuan ibu (tentang kehamilan, persalinan, dan laktasi)

Ibu mengatakan mengetahui tentang tanda-tanda persalinan.

14. Lingkungan yang berpengaruh (sekitar rumah dan hewan peliharaan)

Ibu mengatakan lingkungan di sekitar rumah bersih, dan ibu tidak mempunyai hewan peliharaan apapun.

Data Obyektif

1. Pemeriksaan Umum

Keadaan Umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

Vital Sign

Tekanan Darah : 110/80 mmHg Nadi : 80x/menit

Pernafasan : 20 x/menit Suhu : 36.6 °C

Berat badan sekarang : 62 kg Tinggi badan : 150 cm

Berat badan sebelum hamil : 48 kg (IMT 21,3 kg/m²) LILA : 24 cm

Pertambahan berat badan 14 kg

2. Pemeriksaan Fisik

- a. Kepala : Bentuk mesocephal, tidak ada massa/benjolan.
- b. Muka : Bentuk oval, tidak ada oedema, terdapat cloasma gravidarum
- c. Mata : Bentuk simetris, konjungtiva pucat, sclera putih.
- d. Hidung : tidak ada polip, tidak ada infeksi.
- e. Mulut : Bibir lembab, tidak ada caries gigi
- f. Leher : tidak ada pembengkakan vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar limfe
- g. Dada : Tidak ada ronkhi, tidak ada retraksi dada
- h. Payudara: simetris, tampak hiperpigmentasi areola, puting susu menonjol
- i. Abdomen : Tidak ada bekas luka, tidak terdapat linea nigra, terdapat striae gravidarum

Palpasi :

1) Leopold I

TFU 3 jari bawah px dan pusat fundus teraba bagian bulat, keras (kepala)

2) Leopold II

Bagian kiri ibu teraba memanjang seperti papan, ada tahanan dan keras (punggung)

Bagian kanan ibu teraba kecil-kecil, banyak, (ekstremitas)

3) Leopold III

Bagian terendah janin teraba satu bagian bulat, lunak, belum masuk PAP (bokong)

4) Leopold IV

Konvergen, 3/5

TFU menurut Mc. Donald : 32 cm, TBJ : 3100 gram

Auskultasi DJJ : 144 x/menit, irama teratur kuat

- j. Ekstremitas : tidak terdapat oedema baik pada tangan maupun kaki, ujung jari tidak pucat.

3. Pemeriksaan Penunjang Tanggal : 20 Desember 2023 (Data di buku KIA)

Hb : 12 gr/dl

Triple eliminasi : negatif

Protein Urine : negatif

USG 05 November 2023 diperoleh: Janin tunggal, presentasi bokong, AK cukup.

Analisis Data

Ny S usia 37 tahun G₃P₂A₀Ah₂ uk 36 minggu 4 hari, janin tunggal, hidup, intra uteri presentasi bokong dengan faktor resiko umur

DS : Ibu mengatakan berusia 37 tahun

Ibu mengatakan ini kehamilan ketiga

Ibu mengatakan HPHT tanggal 23-04-2023

Ibu mengatakan cemas menghadapi persalinan

DO :

KU : baik

Kesadaran : composmentis

Vital sign

TD : 110/80 mmHg N : 80 x/menit

S : 36,6 °C RR : 20 x/menit

Px. Leopold :

1). Leopold I : TFU 3 jari bawah px, teraba kepala di fundus

2). Leopold II : Punggung kiri

3) Leopold III : Presentasi bokong

4). Leopold IV : konvergen

DJJ : 144 X/menit, irama teratur, kuat

TFU mc Donald : 32 cm TBJ : 3100 gram

Masalah

Presentasi Bokong

Faktor Resiko Umur

Ibu merasa cemas menghadapi persalinannya yang semakin dekat

Identifikasi Diagnosa Potensial

Kala I lama

Perdarahan post partum

Asfiksia BBL

Antisipasi Tindakan Segera

Pemberian KIE tentang tanda, persiapan persalinan dan nutrisi dalam kehamilan, posisi kneeceest

Penatalaksanaan

1. Memberi tahu ibu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kondisi ibu dan janin baik
Evaluasi: Ibu mengatakan senang dan lega
2. Memberi konseling tentang keluhan yang dialami oleh klien, tanda bahaya kehamilan dan tanda-tanda persalinan serta persiapan menghadapi persalinan. Tanda persalinan meliputi: Timbulnya his persalinan ialah his pembukaan dengan sifat-sifatnya sebagai berikut: 1) Nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan, 2) Makin lama makin pendek intervalnya dan makin kuat intensitasnya, 3) Kalau dibawa berjalan bertambah kuat, 4) mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan cervix 5) *Bloody show* (Lendir disertai darah) 6) pecahnya kulit ketuban. Bila ibu menemui hal tersebut agar segera menghubungi petugas kesehatan. Persiapan persalinan meliputi tempat persalinan, penolong, perlengkapan ibu dan bayi, transportasi, pendamping dan dana. Tanda bahaya Ibu hamil trimester III meliputi keluar darah dari jalan lahir, demam, sakit kepala hebat disertai pandangan kabur, ibu tidak sadar. Disarankan ibu/keluarga harus segera menghubungi tenaga kesehatan.
Evaluasi: Ibu mengatakan mengerti penjelasan yang diberikan
3. Memberikan dukungan kepada ibu agar ibu tetap tenang karena jika ibu khawatir dan cemas maka akan menghambat hormone yang melepaskan reaksi persalinan
Evaluasi: Ibu mengatakan sedikit tenang.
4. Memberitahu ibu dan keluarga jika keluhan sesak yang dialami adalah normal serta cara mengatasi keluhan sesaknya yaitu dengan melatih ibu hamil untuk membiasakan dengan pernapasan normal, berdiri tegak dengan kedua tangan direntangkan di atas kepala kemudian menarik nafas panjang, dan selalu menjaga sikap tubuh yang baik.

Evaluasi :Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran bidan.

5. Memberitahu tentang P4K, ibu dianjurkan mempersiapkan kebutuhan persalinan serta ibu dianjurkan untuk menyiapkan kendaraan dan donor darah untuk persalinan ibu nanti serta rencana KB.

Evaluasi: Ibu mengatakan golongan darahnya sama dengan kakak pertamanya dan sudah menyiapkan baju-baju bayi serta kendaraan. Untuk persalinan Ibu berencana di RS Budi Sehat Purworejo dan KB MOW karena ibu serta suami sudah tidak ingin mempunyai anak lagi.

6. Menganjurkan ibu hamil pola makan seimbang, memenuhi kebutuhan gizinya, makan makanan yang banyak mengandung protein seperti , tempe, daging, telur, ikan serta mengonsumsi karbohidrat seperti nasi, umbi- umbian, jagung dll. Kemudian makan sayur-sayuran dan buah-buahan. minum air putih ± 2 liter/hari.

Evaluasi: Ibu bersedia makan-makanan seimbang

7. Memberi KIE pada ibu pemberian tablet Fe 1x1 sehari dan kalk 2x1 yaitu:
 - a) Minum zat besi diantara waktu makan atau 30 menit sebelum makan, karena penyerapan berlangsung lebih baik ketika lambung kosong.
 - b) Menghindari mengonsumsi kalsium bersama zat besi (susu, antasida, makanan tambahan prenatal), karena akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh.
 - c) Mengonsumsi vitamin C (jus jeruk, jambu, tambahan vitamin C), karena dapat digunakan untuk meningkatkan absorpsi zat besi non heme (berasal dari tumbuhan).⁸⁷ Evaluasi: Ibu mengatakan mengerti dan akan menghabiskan obat yang diberikan.

8. Memberi KIE ibu tentang Presentasi Bokong dan mengajarkan teknik knee chest sebagai usaha agar kepala bayi bisa turun kebawah.

Evaluasi : Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran bidan.

9. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 7 hari lagi atau jika ibu ada keluhan.

Evaluasi: Ibu mengatakan mengerti dan akan kontrol ulang bila obat habis.

10. Mendokumentasikan hasil tindakan yang dilakukan.

CATATAN PERKEMBANGAN KEHAMILAN KUNJUNGAN II

Hari/Tanggal : 17 Januari 2024, 11.00 WIB

Tempat : Rumah Pasien

A. Data Subyektif

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, sesak yang dirasakan sudah mulai berkurang.

2. Riwayat Haid

Siklus haid 28 hari, teratur, dismenorea tidak ada, keputihan tidak ada, HPHT: 23-04-2023 , HPL: 30-01-2024, Umur kehamilan: 37 minggu 5 hari.

3. Riwayat kesehatan

Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, DM, ginjal, maupun TBC dalam keluarga.

4. Riwayat psikososial

Ibu merasa lebih siap menghadapi persalinan karena persalinan terencana di Rumah Sakit yang fasilitas lengkap.

B. Data Obyektif

Keadaan Umum	: Baik
Vital Sign	: Tensi 122/80 mmHg, Nadi 82 x/ menit, Suhu 36,6 °C, RR 20 x/ menit
Tinggi Badan	: 150 cm
Berat Badan sekarang	: 62kg
Berat Badan sebelum hamil	: 48 kg
Kenaikan BB	: 14 kg
IMT sebelum hamil	: 21,3 kg/m ²
LILA	: 24 cm
Mata	: konjungtiva merah muda, sklera putih

Palpasi abdomen:

Leopold 1: TFU 33 cm, teraba kepala

Leopold 2: teraba punggung kiri

Leopold 3: teraba bokong

Leopold 4: Konvergen, 3/5

TBJ Mc. Donald: $(31-12) \times 155 \text{ gr} = 3255 \text{ gram}$

DJJ: 136 x/menit, teratur

His (-), Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

C. Analisa

Ny. S G3P2A0Ah2 usia 37 tahun hamil 37 minggu 5 hari, janin tunggal, hidup, intrauterine, puki, presentasi bokong, kepala belum PAP dengan faktor resiko umur.

D. Penatalaksanaan

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien bahwa pemeriksaan tanda vital normal.

Evaluasi: Pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

2. Menganjurkan ibu hamil pola makan seimbang, memenuhi kebutuhan gizinya, makan makanan yang banyak mengandung protein seperti , tempe, daging, telur, ikan serta mengonsumsi karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, jagung dll. Kemudian makan sayur-sayuran dan buah-buahan. minum air putih ± 2 liter/hari.

Evaluasi: Ibu bersedia makan-makanan seimbang

3. Memberikan motivasi ibu untuk rutin melaksanakan posisi kneechest sebagai usaha agar kepala bayi bisa turun kebawah.

Evaluasi: Ibu mengatakan akan melakukan dengan rutin sebelum persalinan.

4. Menjelaskan kepada ibu bahwa kemungkinan persalinan secara SC karena termasuk kehamilan resiko tinggi. Tindakan operasi SC yaitu tindakan pembedahan dinding perut bawah ibu untuk melahirkan bayi dan sekaligus bisa dilakukan KB MOW sesuai KB pilihan ibu yaitu

prosedur pembedahan sukarela untuk menghentikan kesuburan dengan menyumbat dan memotong kedua saluran telur (tuba fallopi).

Evaluasi : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah siap jika persalinan secara SC serta akan dilakukan tindakan MOW karena ibu sudah berencana bersalin di RS Budi Sehat Purworejo

5. Menjelaskan keuntungan MOW yaitu tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak bergantung pada faktor senggama, baik bagi ibu apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius, pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan suntikan local, tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak ada perubahan dalam fungsi seksual.

Evaluasi : Ibu mengerti dan sudah mantap akan menggunakan MOW.

6. Memberitahu ibu tentang persiapan persalinan meliputi tempat persalinan, penolong, perlengkapan ibu dan bayi, transportasi, pendamping dan dana. Menyarankan ibu untuk memasukkan perlengkapan persalinan dan persyaratan klaim bpjs ke dalam tas, agar saat sudah ada tanda-tanda persalinan sudah siap.

Evaluasi: Ibu mengerti penjelasan yang disampaikan dan bersedia untuk mempersiapkan perlengkapan persalinan.

7. Memberitahu ibu tentang tanda bahaya Ibu hamil trimester III meliputi keluar darah dari jalan lahir, demam, sakit kepala hebat disertai pandangan kabur, ibu tidak sadar. Disarankan ibu/keluarga harus segera menghubungi tenaga kesehatan.

Evaluasi: Ibu mengerti penjelasan yang disampaikan.

8. Menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

Evaluasi: Pasien bersedia meminum terapi yang diberikan sesuai aturan.

9. Menganjurkan pada pasien untuk melakukan pemeriksaan USG kembali untuk memastikan posisi janin dan keadaan janin.

Evaluasi: Pasien bersedia untuk USG tanggal 24 Januari 2024.

10. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan

CATATAN PERKEMBANGAN KEHAMILAN

Hari/Tanggal : 17 Januari 2024, 11.00 WIB

Tempat : RS Budi Sehat Purworejo (Mahasiswa tidak ikut mendampingi saat pemeriksaan ANC di RS namun data subjektif didapatkan dari hasil wawancara dengan ibu dan buku KIA).

A. Data Subyektif

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, ibu ingin mengetahui posisi janin karena sebelumnya dengan presentai bokong.

B. Data Obyektif

Keadaan Umum : Baik
Vital Sign : Tensi 112/80 mmHg, Nadi 82 x/ menit,
Suhu 36,6 °C, RR 20 x/ menit
Tinggi Badan : 150 cm
Berat Badan sekarang : 64kg
Berat Badan sebelum hamil : 48 kg
Kenaikan BB : 16 kg
IMT sebelum hamil : 21,3 kg/m²
LILA : 25 cm
Mata : konjungtiva merah muda, sklera putih
Palpasi abdomen:
Leopold 1: TFU 34 cm, teraba kepala
Leopold 2: teraba punggung kiri
Leopold 3: teraba bokong
Leopold 4: Konvergen, 3/5
TBJ Mc. Donald: (34-12)x 155 gr = 3410 gram
DJJ: 146 x/menit, teratur
His (-), Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Pemeriksaan USG pada tanggal 24 Januari 2024 diperoleh hasil Janin tunggal, presentasi bokong, AK cukup, plasenta di fundus, dan TBJ 3.700 gram

C. Analisa

Ny. S G3P2A0Ah2 usia 37 tahun hamil 39 minggu 1 hari, janin tunggal, hidup, intrauterine, puki, presentasi bokong, kepala belum PAP dengan faktor resiko umur.

D. Penatalaksanaan

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien bahwa pemeriksaan tanda vital normal.

Evaluasi: Pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

2. KIE tentang tanda bahaya trimester III dan tanda – tanda persalinan.

Evaluasi : Pasien mengerti

3. Menyarankan ibu untuk tetap memantau gerak janin minimal 10 kali Gerakan dalam 12 jam.

Evaluasi : Pasien mengerti dan bersedia mengikuti anjuran bidan.

4. Menjelaskan kepada ibu tentang persiapan persalinan secara SC karena termasuk kehamilan resiko tinggi dan perkiraan berat janin lebih dari 3500 gram. Tindakan operasi SC yaitu tindakan pembedahan dinding perut bawah ibu untuk melahirkan bayi dan sekaligus bisa dilakukan KB MOW sesuai KB pilihan ibu yaitu prosedur pembedahan sukarela untuk menghentikan kesuburan dengan menyumbat dan memotong kedua saluran telur (tuba fallopi).

Evaluasi : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan sudah siap persalinan secara SC yang dijadwalkan tanggal 30 Januari 2024 serta akan dilakukan tindakan MOW karena ibu akan bersalin di RS Budi Sehat Purworejo.

5. Menjelaskan kembali keuntungan MOW yaitu tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak bergantung pada faktor senggama, baik bagi ibu apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius, pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan suntikan local, tidak

ada efek samping jangka panjang dan tidak ada perubahan dalam fungsi seksual.

Evaluasi : Ibu mengerti dan sudah mantap akan menggunakan MOW.

6. Memberitahu Kembali ibu tentang persiapan persalinan meliputi tempat persalinan, penolong, perlengkapan ibu dan bayi, transportasi, pendamping dan dana. Menyarankan ibu untuk memasukkan perlengkapan persalinan dan persyaratan klaim bpjs ke dalam tas, agar saat sudah ada tanda-tanda persalinan sudah siap.

Evaluasi: Ibu mengerti penjelasan yang disampaikan dan sudah mempersiapkan perlengkapan persalinan di tas besar.

7. Memberitahu ibu tentang tanda bahaya Ibu hamil trimester III meliputi keluar darah dari jalan lahir, demam, sakit kepala hebat disertai pandangan kabur, ibu tidak sadar. Disarankan ibu/keluarga harus segera menghubungi tenaga kesehatan dan jika sebelum jadwal operasi ada keluhan tersebut, pasien di sarankan ke fasilitas Kesehatan terdekat.

Evaluasi: Ibu mengerti penjelasan yang disampaikan.

8. Menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

Evaluasi: Pasien bersedia meminum terapi yang diberikan sesuai aturan.

9. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan

Evaluasi Tindakan telah didokumentasikan

ASUHAN KEBIDANAN PADA PERSALINAN

**“NY S USIA 37 TAHUN G3P2A0Ah2 HAMIL 40 MINGGU DENGAN
PRESENTASI BOKONG, FAKTOR RESIKO UMUR DAN
PERSALINAN SC DENGAN METODE ERACS
DI RS BUDI SEHAT PURWOREJO”**

NO MR : 8797xxx

TGL/JAM : 30 Januari 2024 / 17.00 WIB

*(Pengkajian berdasarkan anamnesa dan dokumentasi pemeriksaan di buku KIA)

A. Data Subyektif

1. 29 Januari 2024 / Pukul 17.00 WIB

Berdasarkan pengkajian data subyektif Ny.S melakukan USG pada tanggal 24 Januari 2024 di RS Budi Sehat Purworejo. Ny.S disarankan untuk melahirkan di RS secara SC tanggal 30 Januari 2024 atau jika ada tanda-tanda persalinan untuk segera periksa ke rumah sakit.

Pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Ny.S datang ke RS Budi Sehat Purworejo bersama suami karena sudah dijadwalkan pada tanggal 30 Januari pukul 08.00 WIB untuk dilakukannya persalinan dengan tindakan SC dengan indikasi presentasi bokong dan faktor resiko umur serta perkiraan berat bayi lebih dari 3500 gram.

2. 30 Januari 2024 / Pukul 08.08 WIB

Bayi Ny. S lahir secara SC jam 08.08 WIB berjenis kelamin perempuan lahir 30 Januari 2024 menangis kuat dengan berat 3.900 gr dan panjang badan 52 cm, LK 35 cm, LD 34 cm, LILA 12 cm. Bayi diobservasi di ruang perinatologi dan baru dilakukan rawat gabung dengan ibu pada 30/01/2024 pada pukul 15.00 WIB.

Pemeriksaan fisik awal pada bayi baru lahir dilakukan oleh petugas perinatologi sesegera mungkin dengan tujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan atau tidak pada bayi serta memudahkan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan fisik dan kondisi stabil, bayi Ny.

S diberikan injeksi vitamin K 0,5 cc secara Intra Muscular (IM) pada paha kiri anterolateral. Setelah satu jam kemudian bayi Ny. K diberikan imunisasi hepatitis B secara IM pada paha kanan anterolateral dan antibiotik berupa salep mata.

B. Data Obyektif

Keadaan Umum : Baik
His : Belum ada
DJJ : 136 x/ menit
NST : Baik, Reguler
VT : Tidak dilakukan

C. Analisa

Ny. S G3P2A0Ah2 usia 37 tahun hamil 40 minggu, janin tunggal, hidup, intrauterine persalinan dengan SC ERACS atas indikasi presbo dan faktor resiko umur

D. Penatalaksanaan

1. Mengajarkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman dan melakukan mobilisasi selama masa pemulihan dan perawatan di RS Budi Sehat
Evaluasi: Ibu mengerti dengan anjuran yang diberikan.
2. Mengajarkan ibu teknik relaksasi saat merasa nyeri dengan cara menarik nafas panjang dari hidung dan dikeluarkan lewat mulut.
3. Ibu mengikuti apa yang di ajarkan bidan yaitu menarik nafas panjang lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut saat ada nyeri.
4. Mengobservasi ibu selama di rumah sakit via whatsapp
Evaluasi: Ibu dan suami merespon dengan baik dan membalas chat di wa.
5. Melakukan dokumentasi tindakan.
Evaluasi: Tindakan telah didokumentasikan

ASUHAN KEBIDANAN PADA NEONATUS

“BY. NY. S USIA 6 JAM CUKUP BULAN NORMAL DI RS BUDI SEHAT PURWOREJO”

Tanggal pengkajian : 30 Januari 2024, 15.30 WIB (KN 1)

Media pengkajian : WhatsApp (WA)

Sumber : buku KIA

A. Data Subyektif

Nama : By. Ny.S

TTL : 30-01-2024 bayi lahir jam 08.08 WIB

Umur : 6 Jam

Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Persalinan: 30-01-2024 bayi lahir secara SC atas indikasi presentasi bokong, faktor resiko umur jam 08.08 WIB, segera menangis, menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot aktif, Apgar Score 8/9/10, Jenis kelamin perempuan berat badan bayi Ny. S sebesar 3900 gram, panjang badan 52 cm, LK 35 cm, LD 34 cm, lila 12 cm. Bayi mau menyusu Colustrum (+), sudah BAK 1 kali, dan bayi belum BAB. Bayi baru saja rawat gabung dengan ibu.

Riwayat tindakan yang diberikan pada bayi :

- a. Bayi dilakukan Penilaian bayi baru lahir
- b. Bayi dilakukan penatalaksanaan awal resusitasi
- c. Bayi di bawa dan diobservasi di Ruang Perinatologi untuk diobservasi selama 6 jam
- d. Bayi sudah diberikan salep mata, suntikan vitamin K1 dan imunisasi Hb-0

Ibu mengatakan bayinya akan di skrining hipotiroid dengan mengambil darah di kaki, Ibu sudah setuju dan akan diambil di 48 jam kelahiran.

B. DATA OBYEKTIF

HR : 128 x/menit,

RR :48 x/menit

S : 36,8⁰C

Pemeriksaan fisik bayi : normal

C. Analisa

Bayi Ny. S jenis kelamin perempuan usia 6 jam, cukup bulan, lahir SC, hidup, normal.

D. PENATALAKSANAAN

1. Memberitahu ibu bahwa dengan kondisi yang disampaikan ibu keadaan bayinya sehat, dengan BB: 3900 gram dan hasil pemeriksaan fisik dan antropometri dalam batas normal.

Evaluasi : Ibu mengetahui dan mengerti

2. Memberitahu ibu untuk tetap menjaga kehangatan bayinya yaitu dengan cara memakaikan topi, selimut, serta segera mengganti popok yang sudah basah.

Evaluasi : Ibu bersedia menjaga kehangatan bayinya

3. Memberitahu ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin minimal 2 jam sekali, atau semau bayi dan juga melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan.

Evaluasi : Ibu bersedia menyusui bayinya sesering mungkin dan ASI eksklusif.

4. Menyampaikan cara perawatan tali pusat.

Evaluasi : Ibu merespon dengan baik, ibu mengatakan sudah diajarkan oleh bidan rumah sakit serta diajarkan cara memandikan bayi

5. Memberitahu ibu tanda bahaya yang dapat terjadi pada bayi yaitu bayi tidak mau menyusu, bayi terlihat kuning, demam tinggi, tidak sadar, dan memuntahkan ASI yang diberikan. Apabila mengalami hal tersebut sebaiknya ibu segera memberitahu bidan untuk mendapatkan pertolongan segera.

Evaluasi : Ibu mengerti tanda bahaya yang dapat terjadi pada bayi.

6. Melakukan Dokumentasi

CATATAN PERKEMBANGAN BAYI

ASUHAN KEBIDANAN PADA NEONATUS BY NY S UMUR 4 HARI DENGAN NEONATUS CUKUP BULAN SESUAI MASA KEHAMILAN DENGAN NEONATUS NORMAL

Kunjungan Rumah KN 2 (3 – 7 Hari)

Tanggal Pengkajian : 03-02-2024, 11.00 WIB

Tempat Pengkajian : Rumah Pasien

S	Nama Bayi : By.Ny. S TTL/Umur : 30 Januari 2024/ 4 hari JK : Perempuan Nama Ibu : Ny.S Usia : 37 tahun Pendidikan : SMA Alamat : Desa Rasukan,Ngombol, Purworejo Keluhan: Ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayinya, bayi mau menyusu dengan baik walaupun ASI belum begitu banyak. BAK dan BAB lancar.
O	Pemeriksaan Umum a. Keadaan umum : baik Kesadaran : compos mentis b. Tanda Vital HR : 140 x/menit R : 40 kali per menit S : 36,6 ⁰ C Pemeriksaan fisik Tali pusat belum lepas dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi atau perdarahan dan reflek bayi baik

A	By. Ny. S Usia 4 Hari Cukup Bulan Sesuai Masa Kehamilan dengan Neonatus Normal
P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik, ibu mengerti. 2. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebutuhan nutrisi bayi seperti memberikan ASI setiap 2-3 jam untuk pemenuhan gizi dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran dokter 3. Memotivasi ibu untuk memberikan ASI secara on demand, ibu bersedia. 4. Memberitahu ibu tentang nutrisi minum ASI yang diperlukan bayi. Ibu mengerti. 5. Mengajarkan pada ibu teknik menyusui yang benar dan mengajarkan keluarga untuk melakukan pijat oksitosin agar produksi ASI meningkat. Ibu bisa mengikuti penjelasan bidan. 6. Menganjurkan ibu makan makanan yang TKTP dan minum air putih minimal 2-3 liter / hari; ibu bersedia mengikuti saran dari dokter 7. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayi seperti sering mengganti popok untuk mencegah terjadinya ruam popok dan perawatan tali pusat, ibu mengerti. 8. Memberitahu ibu tanda – tanda bayi cukup ASI dan tanda bahaya bayi baru lahir. ibu mengerti. 9. Mendokumentasikan semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Pemeriksaan telah didokumentasikan

CATATAN PERKEMBANGAN BAYI

ASUHAN KEBIDANAN PADA NEONATUS BY NY S UMUR 8 HARI DENGAN NEONATUS CUKUP BULAN SESUAI MASA KEHAMILAN DENGAN NEONATUS NORMAL

Kunjungan Rumah KN 3 (8– 28 Hari)

Tanggal Pengkajian : 07-02-2024, 10.00 WIB

Tempat Pengkajian : Rumah Pasien

S	Ibu mengatakan bayinya sehat, BAK dan BAB lancar. Menyusui (+). Bayi sehat dan tidak terdapat tanda infeksi bakteri. Bayi tidak mengalami ikterik dan tidak diare
O	Pemeriksaan Umum Keadaan umum : baik Kesadaran : compos mentis Tanda Vital HR : 135 x/menit R : 41 kali per menit S : 36,6 ⁰ C Pemeriksaan fisik Tali pusat sudah lepas, tidak ada tanda - tanda infeksi.
A	By. Ny. S Usia 8 Hari Neonatus Cukup Bulan Sesuai Masa Kehamilan
P	1. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan baik. Ibu mengerti. 2. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebutuhan nutrisi bayi seperti memberikan ASI setiap 2-3 jam untuk pemenuhan gizi. Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran bidan. 3. Memotivasi ibu untuk memberikan ASI secara on demand / susui bayi sesering mungkin serta anjurkan ibu memberikan ASI Eksklusif yaitu memberikan ASI saja kepada bayi selama 6 bulan. Ibu bersedia

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Menganjurkan ibu makan makanan yang TKTP dan minum air putih minimal 2-3 liter / hari; ibu bersedia mengikuti saran dari bidan.5. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayi seperti sering mengganti popok untuk mencegah terjadinya ruam popok, ibu mengerti.6. Memberitahu ibu tanda – tanda bayi cukup ASI dan tanda bahaya bayi baru lahir. Ibu mengerti.7. Memberikan KIE tentang Imunisasi dasar lengkap dan jadwal terdekat yaitu Imunisasi BCG dan Polio I. Jadwal imunisasi Puskesmas Ngombol setiap rabu minggu pertama dan ketiga tiap bulan.
Ibu bersedia memberikan bayi imunisasi BCG dan Polio. Ibu berencana ke Puskesmas tanggal 03-03-2024 di rabu minggu pertama.8. Melakukan dokumentasi. Dokumentasi telah dilakukan. |
|--|

**ASUHAN KEBIDANAN PADA MASA NIFAS
 NY. S USIA 37 TAHUN P3A0 NIFAS 6 JAM POST SC
 ATAS INDIKASI PRESENTASI BOKONG
 DI RS BUDI SEHAT PURWOREJO”**

Kunjungan KF I (4 – 48 Jam)

Tanggal pengkajian : 30 Januari 2024 Jam 15.30 WIB

Media pengkajian : WhatsApp (WA) di RS Budi Sehat Purworejo

Sumber : buku KIA

S	<p>Ibu mengatakan agak Nyeri luka SC, ibu masih tiduran tapi sudah mobilisasi dini, miring kanan kiri dan bisa duduk di tempat tidur.dapat duduk maupun berjalan ke kamar mandi tanpa keluhan ibu mngatakan bayinya baru rawat gabung setelah 6 jam di ruang bayi. Ibu sudah mencoba menyusui bayinya (colustrum sudah keluar). Ibu mengakan dower cateter masih terpasang dan ibu belum BAB.</p> <p>Pemenuhan nutrisi : makan dengan roti sedikit, minum dengan air putih, dan susu.</p> <p>Ibu juga mengatakan sangat senang dengan kelahiran anak ketiganya ini. Ibu sudah diberi vitamin A dan multivitamin dari rumah sakit.</p>	
	<p>Keadaan umum: baik Kesadaran: composmentis TD: dbn ASI: + Kontraksi: keras TFU: 3 jari di bawah pusat</p>	<p>Lochea: rubra dbn Luka post SC masih tertutup kassa, tidak ada tanda luka rembes. *dikaji berdasarkan anamnesa dan catatan buku KIA hasil pemeriksaan di Rumah Sakit</p>
O	Tidak dilakukan	
A	Ny.S umur 37 tahun P3 A0 post SC 6 jam a/i Presentasi Bokong	
P	<p>1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan ibu baik dan normal. Ibu mengerti dan lega telah melahirkan anak ketiga dengan selamat.</p>	

	<p>2. Mengajarkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman dan melakukan mobilisasi selama masa pemulihan dan perawatan di RS Budi Sehat Purworejo.</p> <p>Ibu mengerti dengan anjuran yang diberikan.</p> <p>3. Mengajarkan ibu teknik relaksasi saat merasa nyeri dengan cara menarik nafas panjang dari hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Evaluasi: Ibu mengikuti apa yang di ajarkan bidan yaitu menarik nafas panjang lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut saat ada nyeri.</p> <p>4. Memotivasi ibu untuk memberikan ASI secara <i>on demand</i> dan ASI Eksklusif 6 bulan</p> <p>Ibu mengerti dan akan melakukannya.</p> <p>5. Mengajarkan ibu perawatan payudara seperti payudara harus dibersihkan dengan teliti setiap hari selama mandi dan sekali lagi ketika hendak menyusui. Hal ini akan mengangkat kolostrum yang kering atau sisa susu dan membantu mencegah akumulasi dan masuknya bakteri baik ke puting maupun ke mulut bayi.</p> <p>Ibu mengerti dan akan melakukan perawatan payudara</p> <p>6. Memberitahu ibu untuk istirahat yang cukup, makan-makanan yang mengandung protein tinggi untuk mempercepat penyembuhan luka post operasi, dan gizi seimbang serta minum air putih 10 gelas perhari.</p> <p>Ibu mengerti dan bersedia melakukannya</p> <p>7. Mengajarkan ibu untuk rutin sesuai aturan obat yang diberikan dokter Rumah Sakit yaitu antibiotik, anti nyeri, vitamin penambah darah dan vitamin A.</p> <p>Ibu mengerti dan akan meminumnya</p> <p>8. Memberitahu ibu tentang bahaya masa nifas seperti pengeluaran darah pervaginam yang abnormal, payudara bengkak kemerahan dan panas, sakit kepala hebat, pandangan kabur. Serta infeksi pada luka sayatan , terasa panas, keluar nanah dan demam post operasi. Apabila terdapat salah satu tanda tersebut ibu harus memberitahu bidan dan apabila ibu</p>
--	--

	<p>sudah pulang ibu harus datang ke petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan.</p> <p>Ibu mengerti dan bersedia datang ke fasilitas kesehatan terdekat apabila ada keluhan</p> <p>9. Memberikan KIE tentang personal hygiene post partum yaitu selalu mengganti pembalut 2-3 x sehari, menjaga luka post operasi agar tetap kering dan tidak dibubuhi apapun, mengganti celana apabila basah dan kotor, dan selalu mencuci tangan setelah memegang darah genitalia dengan sabun dan air mengalir.</p> <p>Ibu mengerti dan akan melakukan sesuai anjuran.</p> <p>10. Mengajarkan ibu kelola stress dan istirahat cukup serta meminta suami dan keluarga membantu ibu dalam perawatan bayi dan nifas.</p> <p>Ibu dan keluarga bersedia.</p> <p>11. Melakukan dokumentasi asuhan. Asuhan telah didokumentasikan</p>
--	---

CATATAN PERKEMBANGAN NIFAS

ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS

NY. S USIA 37 TAHUN P3A0 POST SC NIFAS 4 HARI DENGAN KUNJUNGAN RUMAH

KF 2 (3 – 7 Hari)

Tanggal Pengkajian : 03-02-2024, 11.00 WIB (KF 2)

Tempat Pengkajian : Rumah Pasien

S	Ibu mengatakan ASI yang keluar masih sedikit, Nyeri luka SC (+)
O	<p>Pemenuhan nutrisi : makan 3-4 kali/hari dengan nasi, sayur, lauk dan buah, minum 2- 3 liter/hari dengan air putih, teh, susu. Ibu sudah melakukan aktivitas sehari-hari dan sedikit nyeri saat melakukan mobilisasi. BAB dihari ke 2 post partum dan pernah mengalami keluhan konstipasi dan BAK tidak ada keluhan.</p> <p>1. Pemeriksaan Umum</p> <p>Keadaan umum : baik Kesadaran : compos mentis Td : 118/79 x/menit N : 82 x/menit R : 20 x/menit S : 36,5 °C</p> <p>Payudara : Simetris, puting susu menonjol,tidak lecet, dan ASI (+) colustrum sedikit</p> <p>Luka Sc masih basah, masih terperban dan masih sedikit nyeri</p> <p>TFU : 3 Jari bawah pusat, kontraksi Keras dan kandung kemih Kosong</p> <p>Lochea Sanguinolenta, jumlah dalam batas normal dan tidak ada tanda-tanda infeksi nifas</p>
A	Ny. S Usia 37 Tahun P3A0 Nifas Hari Ke - 4 post SC dengan Pengeluaran ASI sedikit
P	1. Memberitahu ibu penyebab keluhannya dan cara mengatasi keluhannya; ibu tampak lebih tenang

2. Mengajarkan ibu dan keluarga melakukan pijat oksitosin ; ibu dan keluarga mengerti dan bisa mengikuti KIE dan demonstrasi yang bidan ajarkan
3. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin dan secara *on demand*; ibu mengerti.
4. Melakukan skrining *Edinburgh postnatal depression scale* (EPDS) kepada ibu dengan hasil 0 dan memberitahu ibu bahwa hal tersebut menunjukkan masa nifas ibu normal dan tidak mengalami depresi. Ibu mengerti dan lega mendengarnya.
5. Mengajarkan ibu cukup mobilisasi dan makan makanan yang berserat dan memperbanyak minum air putih untuk mencegah konstipasi pada ibu nifas; ibu mengerti.
6. Memberikan KIE kepada ibu tentang nutrisi gizi selama masa nifas yaitu ibu harus makan makanan bergizi seimbang dan beragam serta minum minimal 3 liter/hari. Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran yang diberikan bidan.
7. Memberikan KIE kepada ibu untuk tetap semangat dan tidak stress selama menyusui karena dapat mempengaruhi produksi ASI. Ibu mengerti
8. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup agar kondisinya cepat pulih dan jika kurang istirahat mengganggu produksi ASI. Ibu mengerti dan akan istirahat yang cukup.
9. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya pada masa nifas yaitu bekas luka jahitan bernanah dan bengkak, demam post operasi, perdarahan, pandangan kabur, bengkak pada wajah dan kaki, payudara bengkak dan bernanah, demam dan pusing yang hebat. Ibu mengerti dan akan memperhatikan keadaannya.
10. Memberitahu ibu untuk tetap menjaga luka post operasi agar selalu tetap kering dan tidak membubuhkan apapun di atasnya. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.
11. Mengajarkan kepada ibu untuk kunjungan ulang nifas yang III

yaitu di antara hari ke 8-28. Ibu mengerti.

12. Mendokumentasikan semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Hasil pemeriksaan telah didokumentasikan.

CATATAN PERKEMBANGAN NIFAS

ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS NY. S USIA 37 TAHUN P3A0 POST SC NIFAS 8 HARI DENGAN KUNJUNGAN RUMAH

KF 3 (8 – 28 hari)

Tanggal Pengkajian : 07 -02-2024, 10.00 WIB (KF 3)

Tempat Pengkajian : Rumah Pasien

S	Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan dan ibu senang karena ASI sudah banyak dan ibu sudah kontrol ke Rumah Sakit Budi Sehat Purworejo kemarin tanggal 06 Februari 2024.
O	<p>ASI sudah keluar lebih banyak dari pada saat kunjungan hari ke 4. Menyusui (+). Pemenuhan nutrisi : makan 4 kali/hari dengan nasi,sayur, lauk dan buah, minum 2-3 liter/hari dengan air putih, teh, jus, susu. BAB dan BAK tidak ada keluhan. Ekstremitas tidak ada oedema dan varices</p> <p>1. Pemeriksaan Umum</p> <p>Keadaan umum : baik Kesadaran : compos mentisTd : 112/69 x/menit N : 83 x/menit R : 20 x/menit S : 36,6 °C</p> <p>Payudara : Simetris,Puting susu tidak lecet, asi (+), tidak teraba bendungan asi</p> <p>Luka SC sudah kering dan tidak ada tanda infeksi (perban sudah dibuka).</p> <p>TFU : pertengahan pusat simfisis, kontraksi Keras dan kandung kemih Kosong ,lochea serosa, jumlah dalam batas normal dan tidak ada tanda-tanda infeksi nifas</p>

A	Ny. S Usia 37 Tahun P3A0 Nifas Hari Ke - 8 Post SC Normal
P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk melakukan pijat oktitosin agar produksi ASI tetap banyak. Evaluasi : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukan anjuran bidan. 2. Memotivasi ibu untuk tetap menyusui bayinya secara <i>on demand</i> (sesuai keinginan bayi) atau minimal 2 jam sekali dan memotivasi untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Evaluasi : Ibu berencana akan ASI eksklusif 3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan pada bayinya agar nutrisi bayi baik serta KIE tentang imunisasi dasar lengkap. Evaluasi : Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran bidan. 4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene. Evaluasi : ibu mengerti. 5. Mendokumentasikan semua hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Evaluasi : Hasil pemeriksaan sudah di dokumentasikan.

CATATAN PERKEMBANGAN NIFAS

ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS

NY. S USIA 37 TAHUN P3A0 POST SC NIFAS 30 HARI DENGAN DENGAN AKSEPTOR KB MOW

KF 4 (29 – 42 Hari)

Tanggal Pengkajian : 29 -02-2024, 10.30 WIB (KF 4)

Tempat Pengkajian : Kunjungan rumah

S	<p>Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan. Perdarahan pervaginam dalam batas normal, darah berwarna putih-putih agak kekuningan. Menyusui (+). Pemenuhan nutrisi : makan 3-4 kali/hari dengan nasi, sayur, lauk dan buah, minum 2-3 liter/hari dengan airputih, teh, jus, susu. BAB dan BAK tidak ada keluhan.</p> <p>Ibu mengatakan sudah melakukan sterilisasi atau MOW pada saat post SC dengan alasan tidak ingin memiliki keturunan lagi.</p>
O	<p>1. Pemeriksaan Umum</p> <p>Keadaan umum : baik Kesadaran : compos mentis</p> <p>Td : 105/75 x/menit N : 81 x/menit</p> <p>R : 20 x/menit S : 36,7 °C</p> <p>Payudara : Simetris, ASI (+), tidak teraba bendungan ASI, Luka SC sudah kering, dan sudah tidak nyeri.</p> <p>TFU : Tidak teraba dan kandung kemih Kosong</p> <p>Lochea alba, jumlah dalam batas normal dan tidak ada tanda- tanda infeksi nifas.</p>
A	<p>Ny. S Usia 37 Tahun P3A0 Post SC Nifas 30 Hari dengan Akseptor MOW</p>

P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kepada ibu bahwa hasil pemeriksaan dalam keadaan baik, luka bekas operasi sudah mengering, dan tidak ada tanda- tanda infeksi. Evaluasi : Ibu mengerti dan terlihat senang 2. Memberi tahu keluarga untuk mendukung ibu memberikan ASI kepada bayinya. Evaluasi :Keluarga mau memberikan dukungan 3. Menganjurkan ibu untuk makan makanan bergizi, makanan yang mengandungprotein, vitamin dan mineral, seperti telur, ikan laut, sayur dan sebagainya serta minum air mineral setiap selesai menyusui. Evaluasi : Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran bidan 4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene. Evaluasi : ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran bidan. 5. Menganjurkan ibu untuk memulai aktivitas secara bertahap dan tidak melakukan pekerjaan berat selama 6 minggu ke depan. Evaluasi : Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran bidan. 6. Melakukan skrining <i>Edinburgh postnatal depression scale (EPDS)</i> kepada ibu dengan hasil 0 dan memberitahu ibu bahwa hal tersebut menunjukkan masa nifas ibu normal dan tidak mengalami depresi. Ibu mengerti dan lega mendengarnya. 7. Menganjurkan ibu untuk beristirahat yang cukup dan membagi tugas rumah tangga dengan suami. Evaluasi : Ibu mengerti dan akan melakukan anjuran bidan 8. Memberitahu ibu sudah bisa melakukan hubungan seksual setelah 4-5 minggu pada masa nifas atau apabila ibu sudah merasa cukup nyaman. Evaluasi : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 9. Menganjurkan pada ibu untuk tetap menjaga luka post operasi dan tidak membubuhkan apapun diatas luka post operasi. Evaluasi : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 10. Menganjurkan ibu untuk kontrol ulang ke fasilitas kesehatan apabila terdapat keluhan. Evaluasi : Ibu mengerti dan paham dengan penjelasan
---	---

	<p>11. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang dilakukan :</p> <p>Pendokumentasian sudah dilakukan</p>
--	---

Pembimbing Akademik



(Linda Nur Wahyuni, S.Tr.Keb., Bdn)

Pembimbing Klinik



BIDAN SA. SUSANTI, Amd.Keb
 * SIPK No. 2636 / 2004
 (Setyo Ari Susanti, Amd.Keb)
 NIP. 19750416200312 2 004

Mahasiswa



(Endah Wahyu Pancaringtyas)
 NIM. P07124523113

Lampiran 2 Informed Consent (Surat Persetujuan Pasien COC)

INFORMED CONSENT (SURAT PERSETUJUAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Sumarni
Tempat / Tgl lahir : 15 - 11 - 1986
A l a m a t : Rasukan

Bersama ini menyatakan kesediaanya sebagai subjek dalam praktik *Continuity of Care* (COC) pada mahasiswa mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun Akademik 2023/2024. Saya telah menerima penjelasan sebagai berikut :

1. Setiap tindakan yang dipilih, bertujuan untuk memberikan Asuhan Kebidanan pada keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental keluarga. Namun demikian, setiap tindakan mempunyai risiko, baik yang telah diduga, maupun yang tidak diduga sebelumnya.
2. Pemberi asuhan telah menjelaskan bahwa akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan asuhan kebidanan dan menghindarkan kemungkinan terjadinya risiko agar diperoleh hasil yang optimal.
3. Semua penjelasan tersebut diatas, sudah saya maklumi dan dijelaskan dengan kalimat yang jelas, sehingga saya mengerti arti asuhan dan tindakan yang diberikan kepada saya. Dengan demikian terdapat kesepahaman antarap pasien dan pemberi asuhan, untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari.

Demikian Surat Persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mahasiswa



Endah Wahyu Pancaningtyas

Purworejo, Januari 2024

Pasien/ Perwakilan Keluarga



Sumarni

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah menyelesaikan COC

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pembimbing Klinik : Setyo Ari Susanti, Amd.Keb
Instansi : PMB Setyo Ari Susanti Purworejo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Endah Wahyu Pancaningtyas
NIM : P07124523113
Prodi : Pendidikan Profesi Bidan
Jurusan : Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Telah selesai melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan dalam rangka praktik kebidanan holistik *Continuity of Care (COC)*.

Asuhan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024.
Judul asuhan: Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ny. S Usia 37 Tahun G3P2A0Ah2 dengan Presentasi Bokong dan Faktor Resiko Umur di PMB Setyo Ari Susanti Purworejo

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 12 Maret 2024



Setyo Ari Susanti, Amd.Keb
NIP. 19750416 200312 2 004

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan COC

a. Informed Consent dan kunjungan ANC pada kehamilan





b. Kunjungan Nifas dan Neonatus








c. Foto Penyerahan kenang-kenangan kepada Ny.S



Lampiran 5 Buku KIA



Lampiran 7

Jurnal Yang Digunakan Sebagai Referensi

a. Jurnal Kehamilan

Duffy CR, Moore JL, Saleem S, Tshetu A, Bose CL, Chomba E, et al. Malpresentation in Low and Middle-income Countries Associations with Perinatal. *Acta Obstet Gynecol Scand* ;98(300). 2019

[Check for updates](#)

Received: 16 August 2018 | Accepted: 26 October 2018
DOI: 10.1111/aogs.13502

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

Malpresentation in low- and middle-income countries: Associations with perinatal and maternal outcomes in the Global Network

Cassandra R. Duffy¹ | Janet L. Moore² | Sarah Saleem³ | Antoinette Tshetu⁴ | Carl L. Bose⁵ | Elwyn Chomba⁶ | Waldemar A. Carlo⁷ | Ana L. Garces⁸ | Nancy F. Krebs⁹ | K. Michael Hambidge⁹ | Shivaprasad S. Goudar¹⁰ | Richard J. Derman¹¹ | Archana Patel¹² | Patricia L. Hibberd¹³ | Fabian Esamai¹⁴ | Edward A. Liechty¹⁵ | Dennis D. Wallace² | Elizabeth M. McClure² | Robert L. Goldenberg¹ | for the NICHD Global Network for Women's and Children's Health Research

¹Department of Obstetrics and Gynecology, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, NY, USA
²Social, Statistical and Environmental Health Sciences, Durham, NC, USA
³Aga Khan University, Karachi, Pakistan
⁴Kinshasa School of Public Health, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo
⁵University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA
⁶University Teaching Hospital, Lusaka, Zambia
⁷University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA
⁸Institute of Nutrition of Central America and Panama (INCAP), Guatemala City, Guatemala
⁹University of Colorado Denver, Denver, CO, USA
¹⁰KLE Academy of Higher Education and Research's JN Medical College, Bellary, India
¹¹Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA
¹²Lata Medical Research Foundation, Nagpur, India
¹³Boston University, Boston, MA, USA
¹⁴Moi University, Eldoret, Kenya
¹⁵Indiana University, Indianapolis, IN, USA

Correspondence
Cassandra R. Duffy, Division of Maternal-Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY, USA.
Email: cr2115@columbia.edu

Funding information
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Grant/Award Number: U01 HD040477, U01 HD040434, U10 HD076457, U10

Abstract
Introduction: Uncertainty exists regarding the impact of malpresentation on pregnancy outcomes and the optimal mode of delivery in low- and middle-income countries. We sought to compare outcomes between cephalic and non-cephalic pregnancies.
Material and methods: Using the NICHD Global Network's prospective, population-based registry of pregnancy outcomes from 2010 to 2016, we studied outcomes in 436 112 singleton pregnancies. Robust Poisson regressions were used to estimate

Abbreviations: aOR, adjusted relative risk; CI, confidence interval; LMIC, low- and middle-income countries; MMR, Maternal and Neonatal Health Registry; NICHD, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development.

b. Jurnal Persalinan

Sultan P. Impact Of Enhanced Recovery After Cesarean Delivery On Maternal Outcomes: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Anaesth Crit Care Pain Med*. 40:100935 2021.

Anaesth Crit Care Pain Med xxx (xxxx) xxx

Contents lists available at ScienceDirect

Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine

journal homepage: www.elsevier.com

Original Article

Impact of enhanced recovery after cesarean delivery on maternal outcomes: A systematic review and meta-analysis

Pervez Sultan^{a,*}, Nadir Sharawi^b, Lindsay Blake^b, Ashraf S. Habib^c, Kathleen F. Brookfield^d, Brendan Carvalho^a

^aStanford University School of Medicine, Stanford, CA 94305, United States
^bUniversity of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, AR 72205, United States
^cDuke University School of Medicine, Durham, NC 27710, United States
^dOregon Health & Science University, Portland, OR 97239, United States

ARTICLE INFO

Article history:
Available online xxx

Keywords:
Enhanced recovery
ERAC
ERAS
Cesarean
Recovery

ABSTRACT

Background: This meta-analysis explores the impact of enhanced recovery after cesarean delivery (ERAC) on maternal outcomes.

Methods: We searched 4 databases (Web of Science, Embase, PubMed and CINAHL) in October 2020 without date limiters, for studies quantitatively comparing ERAC implementation to a control group. The primary outcome was length of hospital stay and secondary outcomes included time to mobilization and time to urinary catheter removal, opioid consumption, readmission rates and cost savings. Mean differences and odds ratios (MD and OR with 95% confidence intervals) were calculated. Levels of evidence were assessed using GRADE.

Results: Twelve studies involving 17,607 patients (9693 without ERAC and 7914 with ERAC) were included. ERAC was associated with reduced: length of hospital stay (MD -0.51 days [-0.94, -0.09]; $p = 0.018$; $I^2 = 99\%$), time to first mobilization (MD -11.05 h [-18.64, -3.46]; $p = 0.004$; $I^2 = 98\%$), time to urinary catheter removal (MD -13.19 h [-17.59, -8.79]; $p < 0.001$; $I^2 = 97\%$) and opioid consumption (MD -21.85 mg morphine equivalents [-33.19, -10.50]; $p = < 0.001$; $I^2 = 91\%$), with no difference in maternal readmission rate (OR 1.23 [0.96, 1.57]; $p = 0.10$; $I^2 = 0\%$). Three studies reported cost savings associated with ERAC. The GRADE levels of evidence were rated as low or very low quality for all study outcomes.

Conclusion: ERAC is associated with reduction in length of stay, times to first mobilization and urinary catheter removal and opioid consumption. ERAC does not significantly affect maternal hospital readmission rates following discharge. Further studies are required to determine which ERAC interventions to implement and which outcomes best determine ERAC efficacy.

© 2021 Société française d'anesthésie et de réanimation (Sfar). Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

The first published reports describing the use of enhanced recovery after cesarean delivery (ERAC) originated from the United Kingdom in 2013 [1–3]. The increasing popularity of ERAC utilization since then is demonstrated by the recent published recommendations by the Enhanced Recovery after Surgery Society (ERAS) and the Society for Obstetric Anesthesiology and Perina-

tology (SOAP) [4–7]. ERAC protocols are increasingly being endorsed by healthcare stakeholders as they have the potential to improve patient experience and streamline perioperative care pathways, while reducing hospital length of stay and associated hospital expenditure.

High-quality evidence demonstrating the benefits of ERAC protocols is currently lacking. A recent systematic review of studies evaluating the impact of ERAC protocols concluded that the certainty of evidence for the following outcomes: pathway compliance, maternal satisfaction, maternal readmission, and maternal-neonatal bonding, was low or very low [8]. Analysis of

* Corresponding author at: Stanford University School of Medicine, 300 Pasteur Drive, Stanford, CA 94305, United States.

<https://doi.org/10.1016/j.accpm.2021.100935>

2352-5568/© 2021 Société française d'anesthésie et de réanimation (Sfar). Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

c. Jurnal Nifas

Triansyah A. The Effect Of Oxytocin Massage And Breast Care On The Increased Production Of Breast Milk Of Breastfeeding Mothers In The Working Area Of The Public Health Center Of Lawanga Of Poso District. *Gac Sanit.* 35:168– 170 2021.

Gac Sanit. 2021;35(S2):S168–S170

The effect of oxytocin massage and breast care on the increased production of breast milk of breastfeeding mothers in the working area of the public health center of Lawanga of Poso District[☆]



Ade Triansyah^a, Stang^{b,*}, Indar^c, Apik Indarty^d, Muh. Tahir^d, Muh. Sabir^e, Rosmala Nur^f, Muhammad Basir-Cyio^g, Mahfudz^g, Alam Anshary^g, Muhammad Rusydi^h

^a Faculty of Public Health, Universitas Hasanuddin, Indonesia

^b Biostatistics Department, Faculty of Public Health, Universitas Hasanuddin, Indonesia

^c Health Administration and Policy Department, Faculty of Public Health, Universitas Hasanuddin, Indonesia

^d Reproduction Health Department, Faculty of Public Health, Universitas Hasanuddin, Indonesia

^e Microbiology, Faculty of Medicine, Universitas Tadulako, Indonesia

^f Public Health Department, Faculty of Public Health, Universitas Tadulako, Indonesia

^g Agratechnology Department, Faculty of Agriculture, Universitas Tadulako, Indonesia

^h Geophysical Engineering Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Tadulako, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 28 June 2021
Accepted 30 July 2021

Keywords:
Exclusive breast milk
Oxytocin massage
Breast care

ABSTRACT

Objective: The objective of this research is to know the effect of oxytocin massage and breast care on the increase of breast milk production.

Method: This pre-experimental research was performed through the One Group Pretest–Posttest design. The sampling was done through non-probability sampling and purposive sampling, obtaining 30 samples. The data were collected in the form of a questionnaire, which was then analyzed using the Mc Nemar test.

Result: It was known that the production of breast milk during pre-intervention was poor on 18 respondents and adequately a lot on the other 12 respondents. Meanwhile, during the post-intervention, the production of breast milk on the 18 respondents whose previously breast milk production was poor then become adequate on the seven respondents, while the remaining 11 respondents still produced less breast milk. The statistical test result showed a *P* value of 0.016, which means that the *P* is less than 0.05.

Conclusion: Oxytocin massage and breast care affected the increase of breast milk production considered based on the frequency and duration of breastfeeding as well as the infants' weight in Lawanga Public Health Center, Poso District.

© 2021 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introduction

The provision of exclusive breast milk in developing countries successfully saves around 1.5 million babies annually. Therefore, the World Health Organization (WHO) recommends exclusive breast milk as the sole food for the baby until the age of 6 years old. Exclusive breast milk is one of the keys to decrease the mortality rate of infants. Increasing the number of breastfeeding can save 820,000 children at the age of below five years old, of which 87% of them are six months old infants. This represents 13% of annual children's mortality rate.¹

Breastfeeding is hampered by the production of breast milk itself. The lack and late production of breast milk can cause inadequate breast milk for the baby.² Breast milk production can be affected by two factors; those are production and release. Breast milk production is affected by the prolactin hormone, while the

release is affected by oxytocin hormone. Oxytocin hormone is released through the stimulation of the nipple. The stimulation occurs due to the baby's mouth sucking through the massage on the mother's breast area and massage on the back. The mother will feel relax and calm so that the oxytocin can be released and the breast milk released fast.³

WHO issued data in 2016, indicating that the average provision of exclusive breast milk throughout the world was only around 38%. Furthermore, only 54.5% of 0–6 months old Indonesian babies were provided by exclusive breast milk, whereas the target is 80%. The highest achievement of exclusive breast milk in Indonesia was obtained by East Nusa Tenggara Province by 79.9%, while the lowest achievement was obtained by Gorontalo Province by 32.3% which has not achieved the target yet.⁴

Based on the data released by the Health Office of Central Sulawesi Province, among 34,342 people, those who obtained exclusive breast milk was only 19,345 or 56.3% of the total community.⁵ Furthermore, according to the data released by the Health Office of Poso District, the provision of breast milk in 2017 has not achieved the target, which was only 51.7%, especially in the working area of Lawanga Public Health Center which was still really low.⁶

[☆] Peer-review under responsibility of the scientific committee of the 3rd International Nursing, Health Science Students & Health Care Professionals Conference. Full-text and the content of it is under responsibility of authors of the article.

* Corresponding author.

E-mail addresses: stangbios@gmail.com, pnc@agri.unhas.ac.id (Stang).

<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.017>

0213-9111/© 2021 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

d. Jurnal KB

Maghfiroh A, Budihastuti UR, Nurhaeni IDA. Path Analysis on Factors Affecting the Choice of Female Surgical Contraceptive Method in Kendal, Central Java. *J Matern Child Heal.* 2019;4(3):146–57.

Journal of Maternal and Child Health (2019), 4(3): 146-157
<https://doi.org/10.26911/thejmch.2019.04.03.02>

Path Analysis on Factors Affecting the Choice of Female Surgical Contraceptive Method in Kendal, Central Java

Ainul Maghfiroh¹⁾, Uki Retno Budihastuti²⁾, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni³⁾

¹⁾Masters Program in Public Health, Universitas Sebelas Maret

²⁾Department of Obstetrics and Gynecology, Dr. Moewardi Hospital, Surakarta

³⁾Faculty of Social and Politic Science, Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Background: Indonesia is one of the developing countries with a high rate of population growth. The government established a Family Planning program in overcoming this problem with effective use of the female surgery contraception. This study aimed to analyze the determinants of female surgery contraceptive method using path analysis model.

Subject and method: A retrospective case control study was conducted in Kendal, Central Java. A sample of 200 women was selected for this study by fixed diseases sampling. The dependent variable was the choice of female surgery contraceptive method. The independent variables were age, education, number of children alive, employment, knowledge, attitude, self-efficacy, husband support, and perception of gender equality. The data were collected by questionnaire and analyzed by path analysis.

Results: The choice of female surgery contraception method was directly and positively associated with good knowledge ($b= 1.91$; 95% CI= 0.80 to 3.02; $p= 0.001$), positive attitude ($b= 1.56$; 95% CI= 0.45 to 2.66; $p= 0.006$), good gender equality perception ($b= 1.23$; 95% CI= 0.18 to 2.32; $p= 0.021$), high self efficacy ($b= 1.61$; 95% CI= 0.48 to 2.74; $p= 0.005$), high education ($b= 1.18$; 95% CI= 0.02 to 2.35; $p= 0.045$), strong husband support ($b= 1.24$; 95% CI= 0.14 to 2.39; $p= 0.027$), working outside the home ($b= 1.14$; 95% CI= 0.06 to 2.21; $p= 0.037$), number of children alive ≥ 3 ($b= 1.74$; 95% CI= 0.61 to 2.88; $p= 0.003$), and maternal age ≥ 35 years ($b= 1.57$; 95% CI = 0.34 to 2.75; $p= 0.012$). It was indirectly associated with age and education.

Conclusions: The choice of female surgery contraception method is directly and positively associated with good knowledge, positive attitude, good gender equality perception, high self efficacy, high education, strong husband support, working outside the home, number of children alive ≥ 3 , and maternal age ≥ 35 years. It is indirectly associated with age and education.

Keywords: female surgery contraceptive method, determinant, path analysis

Correspondence:

Ainul Maghfiroh, Masters Program in Public Health, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta, Central Java 57126, Indonesia. Email: Ainulmaghfiroh0504@gmail.com. Mobile: +6285641012090.

BACKGROUND

Indonesia is one of the developing countries with a high rate of population growth, this is followed by problems related to reproductive health, namely the still high maternal mortality rate (MMR) which reaches 305 per 100,000 live births. The government establishes a Family Planning program especially for women of child-bearing age in overcoming this problem

with the use of contraception, one effective contraception with a low rate of failure compared to other methods is a permanent female method of contraception (Medforth et al., 2013; Kemenkes 2017).

Female surgery contraception method (also called tubectomy) is the second closure of the tube so that the egg cannot be with sperm cells, the chances of a pregnancy are very small, with the advantage of

