

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan signifikan pada penggunaan premedikasi midazolam dengan dosis 0,03 mg/kgbb dan dosis 0,05 mg/kgbb dalam menurunkan tingkat kecemasan pre operasi pada pasien anak di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
2. Ada pengaruh sebesar 60% responden pada kelompok penggunaan premedikasi midazolam dengan dosis 0,03 mg/kgbb dalam menurunkan tingkat kecemasan pre operasi pada pasien anak di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
3. Ada pengaruh sebesar 100% responden pada kelompok penggunaan premedikasi midazolam dengan dosis 0,05 mg/kgbb dalam menurunkan tingkat kecemasan pre operasi pada pasien anak di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

B. Saran

1. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
Berdasarkan hasil penelitian, premedikasi midazolam dengan dosis 0,05 mg/kgbb lebih efektif digunakan dalam menurunkan tingkat kecemasan pre operasi pada pasien anak. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai usulan intervensi untuk memaksimalkan persiapan psikologis pasien anak yang akan menjalani operasi.
2. Penata anestesi RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
Diharapkan dapat menjadi acuan untuk pemberian premedikasi midazolam pada anak sebelum menjalani operasi dalam menurunkan tingkat kecemasan pre operasi pada pasien anak.
3. Peneliti lain

Perlunya penelitian lanjutan penggunaan premedikasi midazolam dengan mengetahui efek samping dari jenis masing masing dosis midazolam sesuai rentang sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam menurunkan tingkat kecemasan pre operasi pada pasien anak dengan mengontrol variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan.