

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PMB Sri Lestari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan dalam kategori baik sebanyak 21.
2. Karakteristik responden sebagian besar berusia >35 sebanyak 29, sebagian besar responden berpendidikan sekolah menengah sebanyak 27, Hampir seluruhnya responden menggunakan KB suntik 3 bulan sebanyak 34, sebagian besar responden yang mempunyai penghasilan dibawah UMR sebanyak 24, Hampir seluruhnya responden yang sering mendapat informasi dari tenaga kesehatan sebanyak 32.
3. Sebagian besar responden yang berumur 21-35 tahun memiliki tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan dalam kategori baik sebanyak 7.
4. Sebagian besar responden yang menempuh pendidikan menengah memiliki tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan dalam kategori baik sebanyak 16.
5. Sebagian besar responden pengguna KB suntik 3 bulan memiliki tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan dalam kategori baik sebanyak 19.

6. Hampir seluruhnya responden yang sering mendapat informasi dari tenaga kesehatan memiliki tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan dalam kategori cukup sebanyak 21.
7. Sebagian besar responden yang pendapatannya dibawah UMR atau tidak bekerja memiliki tingkat pengetahuan tentang efek samping KB suntik 3 bulan dalam kategori baik sebanyak 10.

B. Saran

1. Untuk akseptor KB Suntik

Agar lebih memperhatikan informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung tentang efek samping KB suntik 3 bulan dan penanganannya.

2. Bagi bidan di PMB

Diharapkan dapat memberikan konseling/ KIE maupun informasi lebih detail tentang efek samping KB suntik 3 bulan misalnya apakah dapat menyebabkan perdarahan dan keputihan, dan penanganannya, ataupun dapat memberikan informasi dengan leaflet, lembar balik, dan lainnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan baik menambah responden, dan metode penelitian. Peneliti selanjutnya dapat meneliti tidak hanya KB suntik 3 bulan saja tetapi semua jenis KB suntik.