

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Rerata *Mean Arterial Pressure* pada pasien seksio sesarea yaitu 76,36 mmHg. Responden seksio sesarea mengalami hipotensi sebanyak 60%.
2. Rerata *Mean Arterial Pressure* pada pasien non seksio sesarea yaitu 85,44 mmHg. Responden non seksio sesarea mengalami normotensi sebanyak 14%.
3. Terdapat perbedaan *mean arterial pressure* pada pasien seksio sesarea dan non seksio sesarea. Angka rerata *mean aretrial pressure* pada pasien seksio sesarea lebih rendah dan pasien seksio sesarea lebih tinggi mengalami hipotensi dari pada pasien non seksio sesarea.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Rumah Sakit

Pihak manajemen rumah sakit dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada manajemen diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

informasi tentang perbedaan *mean arterial pressure* pada pasien seksio sesarea dan non seksio sesarea dengan anestesi spinal sehingga pencegahan pada perubahan terutama penurunan *mean arterial pressure* dapat dilakukan seperti tindakan preloading dan coloadng yang sesuai dengan puasa dan operasi pasien, sebelum diposisikan supinasi, pasien seksio sesarea terlebih dulu diposisikan lateral selama 10 menit setelah anestesi spinal.

2. Peneliti lain

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian perubahan *mean arterial pressure* pada pasien spinal anestesi dengan menggunakan metode yang berbeda.