

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang “Penyebab Tidak Langsung yang Berhubungan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul Tahun 2017” kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab tidak langsung yang berhubungan dengan perdarahan postpartum adalah usia, anemia, IMT, preeklampsia dan induksi persalinan.
2. Gambaran penyebab tidak langsung perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul adalah mayoritas pada usia 26-30 tahun, paritas multipara, jarak kelahiran  $\geq 2$  tahun, ibu tidak anemia, IMT normal, berat lahir normal, ibu tidak mengalami preeklampsia dan ibu tanpa induksi persalinan.
3. Proporsi ibu yang mengalami perdarahan postpartum mayoritas pada ibu dengan usia  $\geq 36$  tahun sebesar 33%, ibu dengan paritas multipara sebesar 62%, ibu dengan jarak kelahiran  $\geq 2$  tahun sebesar 86%, ibu tidak anemia sebesar 52%, ibu dengan IMT normal sebesar 40%, ibu dengan berat lahir bayi normal sebesar 93%, ibu yang tidak menderita preeklampsia sebesar 67% dan ibu dengan induksi persalinan sebesar 69%. Sedangkan

proporsi penyebab langsung perdarahan postpartum paling banyak (47,6%) diakibatkan karena atonia uteri.

4. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara usia, anemia, IMT, preeklampsia dan induksi persalinan dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul Tahun 2017. Tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas, jarak kelahiran dan berat lahir dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul Tahun 2017.
5. Faktor yang paling berpengaruh dalam kejadian perdarahan postpartum di RSUD Wonosari Gunungkidul Tahun 2017 adalah preeklampsia.

## **B. Saran**

1. Bagi Direktur RSUD Wonosari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya skrining faktor penyebab kejadian perdarahan postpartum, sehingga dapat diambil langkah efektif untuk mencegah terjadinya komplikasi lain terhadap ibu hamil dan bersalin.

2. Bagi Bidan dan Tenaga Kesehatan yang Terkait di RSUD Wonosari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mewaspadai ibu hamil dan bersalin yang memiliki faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum guna mencegah terjadinya komplikasi dan menentukan perawatan khusus bagi ibu.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan dapat mengembangkan variabel lain dan menggunakan desain yang lebih baik serta mengidentifikasi keterbatasan pada penelitian ini untuk dijadikan pertimbangan.