

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Proposi balita *stunting* yang mempunyai riwayat pemberian ASI Eksklusif sebanyak 46 responden (95,84%) dan tidak ASI Eksklusif sebanyak 2 responden (4,16%).
2. Proposi balita *stunting* dari ibu dan bapak yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi sebanyak 0 responden (0%) dan 2 responden (4,17%). Tingkat pendidikan menengah sebanyak 31 responden (64,58%) dan sebanyak 20 responden (41,67%). Sedangkan tingkat pendidikan dasar sebanyak 17 responden (35.41%) dan 26 responden (54,16%).
3. Proporsi balita *stunting* dari pendapatan orang tua yang mempunyai pendapatan tinggi sebanyak 12 responden (25%) dan pendapatan rendah sebanyak 36 responden (75%).
4. Proposi balita *stunting* yang mempunyai riwayat berat bayi lahir rendah sebanyak 4 responden (8,33%) dan berat badan bayi lahir tidak rendah sebanyak 44 responden (91.67%).
5. Proposi balita *stunting* yang mempunyai riwayat penyakit infeksi diare sebanyak 15 responden (31.25%) dan tidak mempunyai riwayat penyakit infeksi diare sebanyak 33 responden (68.75%).
6. Proposi balita *stunting* yang mendapatkan pola pemberian makan baik sebanyak 18 responden (37.50%) dan pola pemberian makan tidak baik 30 responden (62.50%).

## B. Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan penelitian tentang gambaran balita *stunting*, beberapa saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan adalah :

1. Bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

Bagi pihak Dinas Kesehatan diharapkan untuk memberikan perhatian yang lebih pada balita *stunting* dari berbagai faktor risiko kejadian *stunting* yang ada.

2. Bagi Kepala Puskesmas Pengasih II Kulon Progo

Bagi pihak kepala puskesmas diharapkan untuk lebih memberikan pemantauan pemenuhan gizi melalui PMT untuk balita yang mempunyai faktor risiko penyebab *stunting*.

3. Bagi Bidan Pelaksana

Bagi pihak bidan pelaksana diharapkan untuk bisa menggunakan informasi faktor risiko kejadian *stunting* dalam melakukan skrining atau melakukan pemantauan pada balita.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggambarkan penyebab lain dari *stunting* sehingga dapat diteliti lebih lanjut seperti riwayat genetik dan pola asuh.