

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini responden mengalami perubahan berupa kenaikan nilai tekanan darah yang signifikan setelah diberikan *Passive Leg Raising* (PLR) pada general anestesi yaitu mengalami perubahan berupa kenaikan tekanan darah.

1. Ada pengaruh yang signifikan setelah pemberian *Passive Leg Raising* (PLR) terhadap perubahan berupa kenaikan tekanan darah sistolik pada pasien dengan general anestesi ditandai nilai rata-rata *pre test* kurang dari *post test* dengan nilai $p \text{ value} < 0,05$.
2. Ada pengaruh yang signifikan setelah pemberian *Passive Leg Raising* (PLR) terhadap perubahan berupa kenaikan tekanan darah diastolik pada pasien dengan general anestesi ditandai nilai rata-rata *pre test* kurang dari *post test* dengan nilai $p \text{ value} < 0,05$.
3. Ada perbedaan yang signifikan perubahan berupa kenaikan nilai tekanan darah sistolik antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dibuktikan dengan nilai $p \text{ value} < 0,05$.
4. Ada perbedaan yang signifikan perubahan berupa kenaikan nilai tekanan darah diastolik antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dibuktikan dengan nilai $p \text{ value} < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Agar dapat menjadi referensi untuk pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terutama berkaitan tentang tekanan darah pada pasien dengan general anestesi

2. Bagi manajemen RSUD Dr.Soedirman Kebumen

Agar dapat membuat kebijakan dalam pembuatan SOP dalam pencegahan ketidakstabilan tekanan darah yang memanjang pada pasien general anestesi, dengan demikian akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian mengenai pemberian tindakan non-invasif lain untuk mengatasi ketidakstabilan tekanan darah pasca induksi terutama pada pasien dengan general anestesi