BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 44 sampel, sebesar 4,5% balita yang disusui secara parsial atau pemberian ASI dengan adanya tambahan makanan atau minuman memiliki status gizi pendek.
2. Dari 44 sampel, sebesar 22,7% balita pendek dan sangat memiliki kepala keluarga sebagai buruh. Sebesar 13,6% balita pendek memiliki ibu sebagai IRT.
3. Dari 44 sampel, sebesar 13,7% balita pendek dan sangat pendek memiliki kepala keluarga berpendidikan rendah. Sebesar 9,1% balita pendek dan sangat pendek memiliki ibu berpendidikan rendah.
4. Dari 44 sampel, sebesar 6,8% balita pendek berada pada ekonomi orangtua di bawah UMK Bantul.

B. SARAN

1. Bagi pengelola kesehatan :

   Bagi pihak dinas kesehatan maupun puskesmas untuk terus melakukan program pencegahan masalah gizi stunting pada balita.

2. Bagi peneliti :

   Bagi peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah gizi stunting

3. Bagi orangtua balita :

   Bagi orangtua balita dapat melakukan pencegahan stunting pada 1000 HPK.