

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh pemberian posisi duduk selama 3 menit setelah induksi spinal anestesi terhadap kejadian hipotensi di RSUD dr. Soedriman Kebumen.
2. Ada penurunan presensi kejadian hipotensi pada pasien dengan spinal anestesi kelompok intervensi.
3. Ada perbedaan kejadian hipotensi yang signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi pada responden homogen. Kejadian hipotensi lebih sedikit pada kelompok intervensi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti mengenai berapa lama waktu duduk setelah induksi spinal anestesi yang paling efektif guna mencegah kejadian hipotensi pada spinal anestesi. Diharapkan juga peneliti berikutnya dapat meneliti mengenai efektivitas

pencegahan hipotensi pada spinal anestsesi dengan pemberian posisi duduk setelah induksi selama 5 menit dan 3 menit.

2. RSUD dr. Soedirman Kebumen

Bagi rumah sakit diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai *standar operating prosedur* (SOP) untuk intervensi keperawatan mandiri dalam mencegah kejadian hipotensi pada pasien dengan spinal anestesi.