

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Perbedaan Kadar Protein Total Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Pre dan Post Hemodialisa di Ruang Hemodialisa RS Bethesda Yogyakarta”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan kadar protein total pada pasien gagal ginjal kronis pre dan post hemodialisa di Ruang Hemodialisa RS Bethesda Yogyakarta.
2. Rerata kadar protein total pada sampel serum pasien penderita gagal ginjal kronis *pre* hemodialisa adalah 7,59 g/dL
3. Rerata kadar protein total pada sampel serum pasien penderita gagal ginjal kronis *post* hemodialisa adalah 7,75 g/dL.

#### B. Saran

1. Untuk penelitian lebih lanjut, pemeriksaan parameter protein sebaiknya dilakukan segera setelah sampel dipisahkan dari clot. Apabila tidak memungkinkan, sampel sebaiknya disimpan dalam keadaan beku.
2. Untuk pengembangan penelitian, dapat dilakukan pemeriksaan parameter lain pada pasien gagal ginjal kronis dan dibandingkan sebelum serta sesudah hemodialisa.