

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Ibu hamil di Puskesmas Pleret Bantul tahun 2018 memiliki usia berisiko lebih banyak di banding ibu hamil dengan usia tidak berisiko. Subjek penelitian memiliki paritas tidak berisiko lebih besar di dibandingkan ibu hamil dengan paritas berisiko.
2. Bayi dengan kejadian BBLR banyak terjadi pada ibu yang hamil dengan usia berisiko dan paritas tidak berisiko.
3. Ada hubungan antara Kekurangan Energi Kronik pada ibu hamil dengan kejadian BBLR di Puskesmas Pleret Bantul tahun 2018.
4. Kejadian BBLR pada ibu hamil yang menderita KEK lebih besar dibandingkan dengan kejadian BBLR pada ibu yang tidak menderita KEK saat hamil.
5. Ibu hamil KEK lebih sering 1,125 kali mengalami kejadian BBLR di bandingkan dengan ibu hamil tidak KEK.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bidan pelaksana di Puskesmas Pleret Bantul
Meningkatkan kewaspadaan kejadian BBLR pada ibu yang menderita KEK
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai kejadian BBLR dengan mengambil faktor risiko BBLR selain status KEK pada ibu hamil. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumber informasi. Hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor risiko lain yang menyebabkan BBLR.