

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asfiksia Berat 2 kali lebih sering terjadi pada preeklampsia berat dibandingkan dengan ibu preeklampsia ringan.
2. Kejadian asfiksia berat pada ibu yang mengalami preeklampsia berat lebih besar dibandingkan dengan kejadian asfiksia berat pada ibu yang mengalami preeklampsia ringan
3. Ada hubungan preeklampsia ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya skrining faktor risiko yang mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum, sehingga dapat diambil langkah efektif untuk mencegah terjadinya asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.

2. Bagi Bidan Di RSUD Panembahan Senopati Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mewaspadai ibu bersalin yang didiagnosis preeklampsia dan memiliki faktor risiko asfiksia guna mencegah terjadinya asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai kejadian Asfiksia dengan mengambil faktor risiko lainnya selain preeklampsia ibu bersalin. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumber informasi.