

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hipertensi derajat I merupakan jenis hipertensi yang paling banyak dialami oleh pasien hipertensi yang dilakukan anestesi umum.
2. Pasien dengan hipertensi yang dilakukan anestesi umum sebagian besar tidak mengalami pemanjangan waktu pulih sadar.
3. Terdapat hubungan antara derajat hipertensi dengan pemanjangan waktu pulih sadar. Pasien dengan hipertensi derajat II akan beresiko 4,8 kali lebih besar mengalami pemanjangan waktu pulih sadar dibanding pasien dengan hipertensi derajat I

B. Saran

1. Bagi Perawat Anestesi

Agar menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pemberian asuhan keperawatan mulai dari pre anestesi meliputi pengkajian kondisi pasien, persiapan pasien dan persiapan obat, memantau perubahan hemodinamik pasien hipertensi secara berkala. Dengan ini diharapkan mengurangi salah satu faktor keterlambatan waktu pulih sadar.

2. Bagi Institusi Pendidikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Agar menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan di perpustakaan sehingga dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Melakukan penelitian lanjutan dengan melihat hubungan faktor-faktor gangguan metabolisme yang lain, efek obat-obatan anestesi, maupun cedera neurologis terhadap terjadinya pemanjangan waktu pulih sadar.