

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, N.W., Witari, N., Darmiyanti, N.M.(2018). *Perbedaan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif Sebelum dan Sesudah Pemberian Aromaterapi Lavender pada Ibu Primigravida di BPM Ni Ketut Nuriasih, S.St, MM. The 2018 International Midwifery Scientific Conference.* 348-351.
- Akbarzadeh, M., Nematollahi, A., Farahmand, M., Amooee, A. (2018). *The Effect of Two-Stage Warm Compress on The Pain Duration of First and second Labor Stages an Apgar Acore in Primi Gravida Women: a Randomized Clinical Trial. Journal of Caring Sciences.* 7(1); 21—26.
- Altman, M., Sandstrom, A., Petersson, G., Frisel, T., Cnattingus, S., Stephansson, O., (2015). *Prolonged Second Stage of Labor is Associated with Low Apgar Score. European Journal of Epidemiology.* 30(11); 1209-1215.
- Annida, R.Z., Sisiwi, F., Sulistyaningsih. (2019). *Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lemon terhadap Penurunan Nyeri persalinan Kala 1 Fase Aktif di Klinik Pratama Kusuma Medica.DSpasce, UNISA Yogyakarta.* Diakses dari: <http://digilib2.unisyayoga.ac.id/handle/123456789/758>
- Azizah,N. (2020). *Inhalasi Aromaterapi Lavender (Lavendula angustifolia) dan Neroli (Citrus aurantium) dengan nyeri post partum.* Jurnal Ilmiah Kesehatan. 8(2).
- Azizah, N., Rafhani, R., Evi, D.(2020). *Murotal Al-Qur'an Surat Arrahman dan Inhalasi Aromaterapi Lavender (Lavendula Augustifolia) dalam Nyeri Persalinan kala 1 Fase Aktif .* 12(1).
- Balkam, J. (2014). *Aromaterapi.* Jilid Pertama. Edisi Kedua, Semarang: Dahara Prize.
- Endisupraba.(2017). *Aromaterapi Bagi Kesehatan.* Yogyakarta: Medika Cipta.
- Hetia, E.N., Ridwan, M, & Herlina.(2017). *Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan Kala 1 Aktif.* Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai. 10(1).
- Jaelani.(2009). *Aroma Terapi.* Jakarta : Pustaka Populer Obor.
- Kartika, R., Jatmiko, S., Puji, L.(2015). *Efek Lilin Aromaterapi Lavender terhadap Perubahan Intensitas Nyeri Persalinan Normal Kala I Fase Aktif.* JGK.7(14).
- Kemenkes RI.(2013).*Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013.* Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2013). Survey kesehatan dasar Indonesia.Jakarta: Kemenkes RI

- Kurnia, A., Dasuki, D., Kartini, F. (2017). *Efektivitas Latihan Birth Ball terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif pada Primigravida*. Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia. 5(1) :1-10.
- Lusiana & Suryani.(2014). *Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-isu dalam Software Engineering*. SATIN(Sains and Teknol. Informasi). 3(1).
- Maharani, Y.V., Fatmawati, E., Widyaningrum, R. (2016). *Pengaruh Aromaterapi Bunga Lavender (Lavandula Angustifolia) Terhadap Intensitas Nyeri Haid (Dismenore) Pada Mahasiswa Stikes Madani Yogyakarta*. Jurnal Kesehatan Madani Medika. 7(1).
- Medekawati, D., Dasuki, Melani, H. (2018). *Perbandingan Validitas Skala Ukur Nyeri VAS dan NRS terhadap Penilaian Nyeri di IGD RSUD Raden Mattaher Jambi*. Riset Informasi Kesehatan. 7(2).
- Muchtaridi. (2015). *Aroma Terapi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muchtaridi.(2015). *Tinjauan Aktivitas Farmakologi Aromaterapi*. Garut: Jurusan Farmasi FMIPA,Universitas garut.
- Naristiyant, I., Rusmiyati, Elisa.(2016). *Pengaruh slow deep breathing dengan Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif di BPM Isti Semarang*. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. 8(3).
- Novfrida, Y., & Saharah, P.(2018). *The Effect of Lavender Aromatherapy on The Labour Pain in The Active Phase of Labour*. Jurnal Bina Cendekia Kebidanan. 4(2): 380-384.
- Nugraheny, E., & Sulistyawati. (2014).*Asuhan kebidanan pada ibu bersalim*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursahidah, A.A., Novelia, S., Suciawati, A.(2020). *The Effect of Lavender Aromatherapy on Labor Pain Among Delivery Women in Bandung 2020*. Asian Community Health Nursing Research. 2(1). 13-19.
- Rosalinna.(2018). *Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Pengurangan Rasa Nyeri pada persalinan kala 1 di Wilayah Puskesmas Klego 1 Boyolali*. Jurnal Publikasi Kebidanan. 9(1):1-10.
- Saifuddin, A.(2014).Buku *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*.Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono.
- Sari, D.P., Rufaida, Z., Wardini, S. (2018). *Nyeri Persalinan*. Mojokerto:STIKes Majapahit Mojokerto.

- Sari, P.N., & Sanjaya, R.(2020).*Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Nyeri Persalinan.*1: 45-28.
- Smith, C.A., Collins, C.T., Crowther, C.A.(2011). *Aromatherapy for Pain Management in Labour (Review)* The Cochrane Collaboration. Publishers by John Wiley&Sons, Ltd.
- Snyder, H.(2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines.* 104: 333-339.
- Sumarmi, S.(2017). *Model Sosio Ekologi Perilaku Kesehatan dan Pendekatan Continuum of Care untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu.* The Indonesian Journal of Public Health. 12(1): 129-141.
- Suyani.(2021).*Penatalaksanaan Nyeri Persalinan dengan Non Farmakologi.* Yogyakarta: Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
- Susilarini, S.W., & Idhayanti, R.I.(2017). *Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Pengendalian Nyeri Persalinan Kala 1 pada Ibu Bersalin.* Jurnal Kebidanan. 6(12).
- Syaifuddin, B.(2014). *Ilmu Kebidanan.* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Tarsikah.(2012).*Penurunan Nyeri Persalinan Primigravida Kala I fase Aktif Pascapenghirupan Aromaterapi Lavender.* MKB. 44(1).
- Ulfsdottir, H., Nissen E., Ryding E.L., Lund-Egloff D., Wiberg-Itzel E.(2014). *The association between labour variables and primiparous women's experience of childbirth; a prospective cohort study.* BMC Pregnancy Childbirth.14(1):1–7.
- Vitani, R.A.I.(2019). *Tinjauan Literatur: Alat Ukur Nyeri untuk Pasien Dewasa.* Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan. 3(1) : 1-7.
- Widayani, W.(2016). *Aromaterapi Lavender Dapat Menurunkan Intensitas Nyeri Perineum Pada Ibu Post Partum.* Journal Ners And Midwifery Indonesia. 4(3):123-128.
- Yulizawati, Insani, A.A., Sinta, E.L., Andriani, F.(2019).*Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan.*Sidoardjo.Indomedia Pustaka.

