

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan tingkat kecemasan pasien sebelum dan setelah tindakan odontektomi dengan lokal anestesi di RSGM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penilaian tingkat kecemasan pasien sebelum tindakan odontektomi dengan lokal anestesi terdapat 50% responden mengalami kecemasan sedang, 25% responden mengalami kecemasan ringan dan 25% responden tidak mengalami kecemasan.
2. Berdasarkan penilaian tingkat kecemasan setelah tindakan odontektomi dengan lokal anestesi terdapat 20% responden mengalami kecemasan ringan dan 80% responden tidak mengalami kecemasan.
3. Setelah dilakukan uji statistik menggunakan *Uji Wilcoxon – Test* dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kecemasan sebelum dan setelah tindakan odontektomi dengan lokal anestesi di RSGM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya penelitian perbedaan tingkat kecemasan pasien dapat dikembangkan tidak hanya pada satu kasus tertentu namun dapat mencakup tindakan Bedah Mulut yang dapat dilakukan dengan lokal anestesi lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya jika masih dalam masa pandemi covid-19 sebaiknya dapat memperpanjang waktu pengambilan sampel agar dapat memenuhi seluruh kriteria sampel.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel agar dapat menguatkan hasil penelitian.