

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan tingkat kecemasan pasien anak-anak dengan tindakan ekstraksi gigi susu di Puskesmas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Tingkat kecemasan pada anak-anak lebih banyak pada tingkat kecemasan ringan yaitu pada 27 responden (67,5%).
2. Responden yang dilakukan tindakan ekstraksi gigi susu yaitu 36 responden (90%) dan tidak dilakukan tindakan ekstraksi gigi susu yaitu 4 responden (10%).
3. Terdapat hubungan antara tingkat kecemasan dengan tindakan ekstraksi gigi susu dengan nilai $P.Value = 0,001$ ($\alpha < 0,005$).

B. Saran

Saran sehubungan dengan hasil penelitian tentang hubungan tingkat kecemasan pasien anak-anak dengan tindakan ekstraksi gigi susu di Puskesmas yaitu :

1. Bagi Tenaga Kesehatan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk tenaga kesehatan khususnya perawat gigi yang bekerja di Puskesmas untuk memperhatikan tingkat kecemasan pada pasien yang akan dilakukan tindakan pencabutan gigi susu.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan agar perawat gigi lebih memperhatikan pasien anak-anak sebelum dilakukan tindakan pencabutan gigi susu.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan agar perawat gigi melakukan komunikasi terapeutik untuk membuat pasien menganggap bahwa tindakan pencabutan gigi susu tidak membahayakan sehingga mengurangi rasa cemas pada anak.

2. Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman responden tentang hubungan tingkat kecemasan dengan tindakan ekstaksi gigi susu.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil peneliti ini agar dapat dijadikan tambahan wawasan ilmu mengenai kesehatan gigi dan mulut khususnya tentang hubungan tingkat kecemasan pasien anak-anak dengan tindakan ekstaksi, penelitian ini dapat dikembangkan dengan judul lain yang serupa tetapi dengan variabel-variabel yang berbeda.