

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengkajian data subjektif dan objektif, diperoleh suatu diagnosa Ny. SO usia 30 tahun G₂P₁Ab₀Ah₁ usia kehamilan 36⁺² minggu dengan kehamilan normal. Ny. SO dengan keluhan pinggang terasa pegal-pegal . Tindakan yang dilakukan yaitu KIE mengenai tanda bahaya kehamilan trimester III, tanda-tanda persalinan, serta ketidaknyamanan yang muncul di trimester III.
2. Persalinan Ny. SO berlangsung secara spontan oleh bidan di Rumah Sakit Jogja dengan Ketuban Pecah Dini dan dilakukan induksi.
3. Asuhan kebidanan pada By.Ny.SO lahir secara spontan pada tanggal 09 Februari 2022 pukul 03.15 WIB berjenis kelamin perempuan. By. Ny. SO segera menangis kuat, nilai apgar skor dalam buku KIA adalah 9/10.
4. Selama masa nifas, keadaan Ny. SO baik. Pada nifas hari ke-13 Ny. SO. memiliki masalah dalam mengatur pola istirahat sehingga sering mengalami kelelahan. Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny. SO sesuai dengan keluhan yang dirasakan sehingga masalah dapat teratasi. Selain itu juga dilakukan asuhan kebidanan nifas sesuai dengan kebutuhan ibu nifas meliputi KIE mengenai nutrisi, personal hygiene, pola aktifitas dan pola istirahat, ASI eksklusif, serta perawatan bayi
5. By. Ny. SO dalam keadaan baik dan sehat, berat badan By. Ny SO mengalami peningkatan setiap melakukan kontrol.
6. Saat dilakukan pengkajian data subjektif, Ny SO mengatakan sudah mendiskusikan dengan suami dan akan menggunakan metode kontrasepsi IUD dan pemasangan segera setelah bayi lahir/IUD post plasenta.