

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebanyak 12% (8) balita memiliki riwayat BBLR, 37,5% (3) diantaranya mengalami *stunting*. Sebanyak 88% (55) anak mempunyai berat lahir normal, 16,4% (9) nya mengalami *stunting*.
2. 96,8% anak telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, sehingga imunisasi dasar tidak menjadi faktor resiko kejadian *stunting* pada penelitian ini.
3. Sebanyak 49,2% (31) anak mendapatkan ASI eksklusif, 19,4% (6) memiliki status *stunting*. Sedangkan 50,8% (32) anak tidak mendapatkan ASI eksklusif, 18,75% (6) anak memiliki status *stunting*.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan kejadian *stunting*. Supaya dapat meminimalkan kejadian *stunting*.
2. Bagi pihak Puskesmas Minggir perlu diadakan program khusus untuk memberikan edukasi dan pendampingan pada orang tua balita atau orang tua supaya kejadian *stunting* dapat dicegah dan dideteksi lebih dini.