

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proporsi balita *stunting* di Desa Rejosari Kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo Jawa Tengah adalah 25,6%.
2. Mayoritas balita merupakan balita yang memiliki ibu dengan tinggi badan normal, berstatus gizi normal, umur tidak risiko, jarak kelahiran tidak berisiko dengan kelahiran sebelumnya, mendapatkan ASI eksklusif, memiliki berat lahir normal, dan panjang lahir normal.
3. Faktor yang berhubungan dengan balita *stunting* adalah tinggi badan ibu, status gizi ibu, umur ibu, pemberian ASI eksklusif, dan BBLR. Sedangkan faktor tidak berhubungan adalah jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya dan panjang badan lahir.

B. Saran

1. Bagi Kepala Puskesmas Kemiri
Dapat membuat program kegiatan untuk mengurangi kejadian *stunting* di wilayah Puskesmas Kemiri.
2. Bagi Bidan di wilayah Kemiri
Bidan tetap memberikan konseling dan motivasi kepada masyarakat terutama ibu hamil tentang strategi untuk mencegah *stunting*.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menambah referensi terutama penelitian yang berhubungan dengan *stunting*.