

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kadar TIBC pada Serum Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Segera Diperiksa dan Disimpan Selama 7 Hari pada Suhu 2° – 8° C, dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan kadar TIBC pada serum pasien gagal ginjal kronik yang diperiksa segera dan disimpan selama 7 hari pada suhu 2° C sampai 8° C.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan aspek perlakuan penyimpanan dengan variasi suhu dan waktu penyimpanan darah yang berbeda dan pemilihan responden yang lebih menginterpretasikan untuk semua pasien gagal ginjal kronik.
2. Bagi institusi pendidikan perlu referensi lebih lengkap tentang pengaruh penyimpanan serum pasien gagal ginjal pada pemeriksaan TIBC dan pemeriksaan lain yang dibutuhkan pasien.
3. Bagi teknisi laboratorium medis penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam mengetahui pengaruh lama penyimpanan serum pasien gagal ginjal kronik pada suhu 2° – 8° C terhadap kadar TIBC.