

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat sebanyak 35 responden (81%) dengan hasil CA 15-3 dalam rentang normal ( $\leq 25$  U/mL) dan 8 responden (19%) dengan hasil CA 15-3 diatas normal ( $\geq 25$  U/mL).
2. Terdapat sebanyak 31 responden (72%) dengan nilai NLR rendah ( $< 3,0$ ) dan 12 responden (28%) dengan nilai NLR normal ( $> 3,0$ ).
3. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara hasil pemeriksaan kadar CA 15-3 dengan *Neutrofil Limfosit Rasio* (NLR) pada penderita kanker payudara.

#### **B. Saran**

1. Bagi Jurusan Reknologi Laboratorium Medis, diharapkan dapat menambah menambah referensi pustaka mengenai pemeriksaan kadar CA 15-3 dengan *Neutrofil Limfosit Rasio* (NLR) pada penderita kanker payudara.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan jumlah data yang lebih besar, agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi serta dapat memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap populasi yang diteliti.