

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kadar albumin serum dan kadar albumin plasma *K2EDTA* pada pasien pra hemodialisis.
2. Rerata kadar albumin serum pada pasien pra hemodialisis adalah 3,87 g/dL.
3. Rerata kadar albumin plasma *K2EDTA* pada pasien pra hemodialisis adalah 3,87 g/dL.
4. Selisih rerata kadar albumin serum dan plasma *K2EDTA* pada pasien pra hemodialisis adalah 0,00 g/dL

B. Saran

1. Penelitian lebih lanjut tentang penggunaan plasma *K2EDTA* dengan kriteria sampel yang beragam dari berbagai latar belakang klinis dan demografi pada berbagai parameter pemeriksaan kimia klinik agar memberikan hasil penelitian yang lebih bermakna dan komprehensif.
2. Praktisi laboratorium dapat memberikan masukan kepada pimpinan dan pembuat kebijakan untuk dapat mempertimbangkan penggunaan plasma darah *K2EDTA* sebagai alternatif pengganti serum dalam pemeriksaan kadar albumin pada pasien pra hemodialisis jika sampel darah terbatas, khususnya pada metode *Bromcresol Green (BCG)*.