

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang berjudul hubungan anemia pada ibu hamil trimester III dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Panembahan Senopati 2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang signifikan antara anemia ibu hamil trimester III dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Panembahan Senopati tahun 2018.
2. Karakteristik kejadian anemia, usia ibu, pekerjaan, paritas, dan usia kehamilan yang mengalami ketuban pecah dini lebih banyak dibandingkan yang tidak mengalami ketuban pecah dini di RSUD Panembahan Senopati tahun 2018.
3. Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki risiko 3 kali lebih besar mengalami ketuban pecah dini dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak anemia (OR3,054 CI95% 1,543-6,043).

#### **B. Saran**

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi RSUD Panembahan Senopati

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya skrining faktor risiko anemia yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini, sehingga dapat diambil langkah efektif sehingga dapat

mengeluarkan kebijakan preventif untuk mencegah terjadinya ketuban pecah dini.

2. Bagi bidan pelaksana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk dapat meningkatkan pelayanan untuk mewaspadai ibu hamil yang mengalami anemia guna mencegah terjadinya ketuban pecah dini.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian terhadap faktor risiko lain yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini.