

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG KANKER MULUT DAN KEBIASAAN MEROKOK PADA MASYARAKAT

Titik Oktavia Ningsih¹, Taadi², Hari Wibowo³
^{1,2,3}Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,
Jl. Kyai Mojo No. 56, Pingit, Yogyakarta 55243
Email : titikoktavianingsih@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Kanker mulut, penyakit kedua sebagai penyebab kematian terbanyak di dunia. Pada 2022 tercatat 188.438 kematian akibat kanker mulut di seluruh dunia. Faktor penyebab kanker mulut adalah kebiasaan merokok. Laki-laki yang menghabiskan satu bungkus rokok per hari memiliki risiko terkena kanker sekitar 10 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok, sedangkan mereka yang merokok dua bungkus perhari berisiko lebih dari 25 kali lipat. Studi penelitian pendahuluan di Kasihan menunjukkan 50% laki laki memiliki kebiasaan merokok.

Tujuan : Diketuinya pengetahuan tentang kanker mulut dan kebiasaan merokok pada masyarakat.

Metode : Penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan 35 responden perokok di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner pada bulan Mei 2026 dan dianalisis secara deskriptif. Pengolahan data menggunakan distribusi frekuensi dan tabulasi silang.

Hasil : Seluruh responden memiliki kebiasaan merokok dalam jenis, jumlah dan waktu yang berbeda-beda. Faktor penyebab kebiasaan merokok adalah rendahnya pengetahuan mengenai dampak kebiasaan merokok. Pengetahuan tentang kanker mulut pada responden termasuk kriteria sedang. Kebiasaan merokok paling tinggi pada usia 21-25 tahun dengan kebiasaan merokok kriteria sedang.

Kesimpulan : Pengetahuan masyarakat tentang kanker mulut dan kebiasaan merokok termasuk kriteria sedang dan kebiasaan merokok termasuk dalam kriteria sedang.

Kata Kunci : Pengetahuan, kanker mulut, kebiasaan merokok

OVERVIEW OF KNOWLEDGE ABOUT ORAL CANCER AND SMOKING HABITS IN THE PUBLIC

Titik Oktavia Ningsih¹, Taadi², Hari Wibowo³
^{1,2,3}Departemen Of Dental Health Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,
Jl. Kyai Mojo No. 56, Pingit, Yogyakarta 55243
Email : titikoktavianingsih@gmail.com

ABSTRACT

Background : Oral cancer is the second leading cause of death worldwide. In 2022, 188,438 deaths from oral cancer were recorded worldwide. Smoking is a contributing factor to oral cancer. Men who smoke one pack of cigarettes per day have a risk of developing cancer approximately 10 times higher than nonsmokers, while those who smoke two packs per day have a risk more than 25 times higher. Preliminary research in Kasihan showed that 50% of men smoke.

Objective : Knowledge about oral cancer and smoking habits in the community is known.

Methods : This qualitative descriptive study involved 35 smokers in Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. The sampling technique used was saturated sampling. Data were collected through questionnaires in May 2026 and analyzed descriptively. Data processing used frequency distribution and cross-tabulation.

Result : All respondents smoked in varying amounts, types, and durations. A contributing factor to this smoking habit was a lack of knowledge about the impacts of smoking. Respondents' knowledge of oral cancer was moderate. Smoking rates were highest among those aged 21-25, with moderate smoking rates.

Conclusion : Public knowledge about oral cancer and smoking habits is included in the moderate criteria and smoking habits are included in the moderate criteria.

Keywords : Knowledge, oral cancer, smoking habits.